

人口問題資料
第60号

07/070
10 5to
60 60

人口の資質に関する主要統計摘要

昭和35年6月30日

人口問題研究所資料

財団法人

人口問題研究会

は し が き

本資料は、人口の資質に関する統計資料のうち、きわめて重要なもののみを収集し編集したものである。

おもに全国的な規模の基礎的資料から重要部分を要約したものであつて、人口対策立案の基礎資料としてとりあえず謄写印刷に附したものである。この編集は本会幹事上田正夫、同篠崎信男、山口喜一の担当したものである。

本資料の収集は昭和34年度厚生科学研究費の補助によつたものである。

昭和35年6月30日

財団法人 人口問題研究会

目 次

表 1	国民栄養調査による男女、年齢(各歳)別身長、体重、上腕囲、 胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差(昭和33年)	1
表 2	国民栄養調査による男女、年齢(各歳)別身長、体重、上腕囲、 胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差(昭和32年)	3
表 3	国民栄養調査による男女、年齢(各歳)別身長、体重、上腕囲、 胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差(昭和31年)	5
表 4	国民栄養調査による男女、年齢(各歳)別身長、体重、胸囲お よび座高の平均値ならびに標準偏差(昭和30年)	7
表 5	国民栄養調査による年次別、男女、年齢(各歳)別身長平均 値(昭和22年-29年)	9
表 6	国民栄養調査による年次別、男女、年齢(各歳)別体重平均 値(昭和22年-29年)	11
表 7	国民栄養調査による年次別、男女、年齢(各歳)別胸囲平均 値(昭和25年-29年)	13
表 8	国民栄養調査による年次別、男女、年齢(各歳)別座高平均 値(昭和27年-29年)	14
表 9	日本人の平均体位基準値	15
表 10	学校衛生統計による年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳 学徒の身長平均値(明治33年-昭和33年)	16
表 11	学校衛生統計による年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳 学徒の体重平均値(明治33年-昭和33年)	22
表 12	学校衛生統計による年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳 学徒の胸囲平均値(明治35年-昭和33年)	28
表 13	学校衛生統計による年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳 学徒の座高平均値(昭和12年-35年)	34
表 14	学校衛生統計による学校の種類別、男女、年齢(各歳)別3- 24歳学徒の身長、体重、胸囲および座高の平均値ならびに標 準偏差(昭和33年)	36
表 15	学校衛生統計による学校の種類別、男女、年齢(各歳)別3- 24歳学徒の身長、体重、胸囲および座高の平均値ならびに標 準偏差(昭和32年)	38
表 16	学校衛生統計による特殊教育学校の男女、年齢(各歳)別3- 19歳学徒の身長、体重、胸囲および座高の平均値(昭和32 年)	40
表 17	国民栄養調査による平均1人1日当り栄養摂取量(昭和33年)	42
表 18	国民栄養調査による平均1人1日当り栄養摂取量(昭和32年)	44
表 19	国民栄養調査による年次別平均1人1日当り栄養摂取量(昭和	

	24年-31年)	46
表20	国民栄養調査による平均1人1日当り食品摂取量(昭和33年)	47
表21	国民栄養調査による平均1人1日当り食品摂取量(昭和32年)	48
表22	国民栄養調査による年次別平均1人1日当り食品摂取量(昭和 24年-31年)	48
表23	日本人の1人1日当り栄養基準量	49
表24	日本人の1人1日当り食糧構成(昭和37年の目標値)	52
表25	児童、生徒の1人1日当り所要熱量および推定食費	53
表26	国民栄養調査による男女、年齢(5歳階級)別血圧平均値およ び標準偏差(昭和33年)	54
表27	国民栄養調査による男女、年齢(5歳階級)別血圧平均値およ び標準偏差(昭和32年)	56
表28	国民栄養調査による男女、年齢(5歳階級)別血圧平均値(昭 和31年)	56
表29	学校基本調査による年次別学齢児童、生徒の男女別就学免除お よび就学猶予者(昭和25年-33年)	57
表30	学校基本調査による年次別学齢児童、生徒の男女、理由別就学 免除者(昭和30年-33年)	58
表31	学校基本調査による年次別学齢児童、生徒の男女、理由別就学 猶予者(昭和30年-33年)	59
表32	学校衛生統計調査の一般検診による年次別小学校児童の男女別、 疾病異常別被患率(昭和24年-33年)	60
表33	学校衛生統計調査の一般検診による年次別中学校生徒の男女別、 疾病異常別被患率(昭和24年-33年)	62
表34	学校衛生統計調査の一般検診による年次別高等学校生徒の男女 別、疾病異常別被患率(昭和24年-33年)	64
表35	学校衛生統計調査の一般検診による年次別大学学生の男女別、 疾病異常別被患率(昭和24年-33年)	66
表36	学校衛生統計調査の精密検診による児童、生徒、学生の男女別、 疾病異常別被患率(昭和33年、32年)	68
表37	厚生行政基礎調査による世帯種別、世帯業態および世帯類型別 身体障害件数(昭和29年)	69
表38	国勢調査による男女、年齢(数え年)別4-40歳盲、おしお よびつんぼ数(昭和22年)	70
表39	伝染病簡速統計ならびに人口動態調査による年次別法定伝染病 患者数および死亡者数(明治33年-昭和21年)	72
表40	伝染病簡速統計ならびに人口動態調査による年次別法定伝染病 患者数および死亡者数(昭和22年-33年)	74
表41	伝染病簡速統計ならびに人口動態調査による年次別届出伝染病	

	患者数および死亡者数(昭和22年-33年)	76
表42	厚生行政基礎調査による年次別傷病世帯数および傷病人員(昭和28年-33年)	80
表43	厚生行政基礎調査による年次別、世帯種類別傷病世帯および傷病世帯人員の割合(昭和29年-33年)	81
表44	厚生行政基礎調査による年次別、世帯類型、世帯種別傷病世帯および傷病世帯人員の割合(昭和29年-33年)	82
表45	厚生行政基礎調査による勤労その他の世帯における収入階層別傷病世帯および傷病世帯人員の割合(昭和33年、32年および31年)	83
表46	厚生行政基礎調査による勤労その他の世帯における収入階層別傷病世帯人員の割合(昭和30年、29年)	83
表47	国民健康調査による年次別傷病件数および罹病日数(昭和28年-33年)	84
表48	国民健康調査による年次別、男女、年齢階級別罹患率および罹病日数(昭和28年-32年)	85
表49	国民健康調査による年次別、傷病大分類別有病率および罹患率(昭和30年-33年)	86
表50	国民健康調査による年次別、世帯業態別罹患率および罹病日数(昭和29年-32年)	87
表51	国民健康調査による世帯種別罹患率および罹病日数(昭和32年、31年および30年)	87
表52	国民健康調査による勤労者世帯の現金支出階級別有病率、罹患率および傷病日数(昭和32年)	88
表53	国民健康調査による年次別勤労者世帯の現金支出階級別傷病罹患率および傷病日数(昭和28年-31年)	89
表54	結核実態調査による男女、年齢(5歳階級)別ツ反応陽性率、肺および肺外結核有所見率ならびに要指導者率(昭和28年)	90
表55	伝染病精密調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別結核罹患率(昭和24年-32年)	93
表56	人口問題研究所第12回簡速静止人口表(昭和33年4月-34年3月)	96
表57	各回生命表による死亡率(q_x)および平均余命(e_x)(大正14年-昭和27年)	98
表58	主要国における生命表の死亡率(q_x)(1926年-1955年)	100
表59	主要国における生命表の平均余命(e_x)(1926年-1956年)	102
表60	職業(大分類)および産業(大分類)別生命表による男子死亡率(q_x)(昭和29年-31年)	104
表61	職業(大分類)および産業(大分類)別生命表による男子平均	

	余命(éx)(昭和29年-31年).....	105
表62	人口動態調査による年次別、男女、死因別死亡率順位(明治33年-昭和32年).....	106
表63	主要国における死因別死亡率順位(1954年-1957年).....	108
表64	人口動態調査による男女、年齢(5歳階級)別、死因別死亡率順位(昭和32年).....	110
表65	人口動態調査による男女、年齢(5歳階級)別、死因別死亡率順位(昭和30年).....	112
表66	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別中枢神経系の血管損傷死亡率(大正9年-昭和32年).....	116
表67	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別悪性新生物死亡率(大正9年-昭和32年).....	118
表68	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別心臓の疾患死亡率(大正9年-昭和32年).....	120
表69	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別全結核死亡率(大正9年-昭和32年).....	122
表70	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別肺炎死亡率(大正9年-昭和32年).....	124
表71	人口動態調査による年次別、男女、年齢(5歳階級)別自殺死亡率(大正9年-昭和32年).....	126
表72	人口動態調査による職業(大分類)別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(昭和30年).....	127
表73	人口動態調査による産業(大分類)別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(昭和30年).....	133
表74	主要国における年次別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(1950年-55年).....	140
表75	諸外国における主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(1955年).....	152
表76	優生保護法による年次別、男女、理由別優生手術件数(昭和24年-32年).....	176
表77	優生保護法による男女、年齢(5歳階級)別、理由別優生手術件数(昭和32年、31年).....	177
表78	人口動態調査による年次別妊産婦死亡(明治33年-昭和32年).....	178
表79	人口動態調査による年次別、死因別妊産婦死亡(昭和15年-32年).....	179
表80	精薄児実態調査の児童、生徒における知能指数の分布(昭和28年).....	180
表81	精薄児実態調査における精神科医の診断による精神薄弱児の割合(昭和28年).....	180

表 8 2	精神衛生実態調査による精神障害者(昭和 2 9 年)	1 8 1
表 8 3	在院精神障害者実態調査による在院、退院精神障害者(昭和 3 1 年)	1 8 2
表 8 4	犯罪統計による年次別刑法犯発生、検挙数および青少年犯罪 者の検挙数(昭和 8 年 - 3 3 年)	1 8 4

本資料に引用載録せる調査、統計報告一覧

表1 男女、年齢（各歳）別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和33年）

(1) 男

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		上腕囲 (cm)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	64.9	7.0	7.24	1.85	13.7	1.9	42.6	3.6	40.9	4.6
1	76.9	5.8	10.11	1.50	14.3	1.5	46.9	2.5	47.6	3.7
2	85.4	4.7	12.02	1.89	14.8	1.3	49.6	2.6	51.3	3.0
3	92.2	5.7	13.90	1.83	15.4	1.1	51.6	2.6	54.0	3.1
4	98.4	4.6	15.29	1.83	15.6	1.2	53.6	2.4	56.8	2.9
5	104.5	5.1	16.93	2.08	15.8	1.2	54.8	2.8	59.4	3.1
6	110.3	5.3	18.74	2.15	15.9	1.1	56.6	2.5	62.2	3.0
7	115.8	6.0	20.76	2.50	16.4	1.2	58.6	2.8	64.6	2.8
8	120.9	6.0	22.98	2.82	16.9	1.5	60.2	3.2	67.2	3.8
9	125.4	6.0	25.10	3.56	17.5	1.5	62.2	3.8	69.6	3.8
10	130.2	6.0	27.44	3.80	18.0	1.6	63.8	3.4	71.4	3.4
11	134.4	6.6	29.92	4.22	18.6	1.6	65.6	3.6	73.4	3.2
12	139.2	7.8	33.08	6.02	19.3	1.7	68.0	4.6	75.4	4.0
13	146.4	8.7	38.42	6.44	20.6	2.1	71.8	4.8	79.0	4.6
14	152.7	7.2	43.40	7.10	22.0	2.2	75.2	5.2	82.2	4.8
15	157.5	7.5	48.48	7.06	23.1	2.0	78.8	5.2	85.0	4.8
16	160.8	5.7	52.04	6.10	24.2	2.1	81.4	4.6	87.0	4.4
17	162.0	6.3	53.78	6.18	24.7	2.0	82.8	4.4	88.0	3.8
18	162.0	6.0	55.06	5.66	25.4	1.9	84.0	4.2	88.2	3.2
19	162.9	6.6	55.58	6.14	25.6	2.1	84.8	4.2	89.0	3.2
20	162.3	6.0	55.54	5.80	25.5	1.8	85.0	4.2	88.8	3.6
21	162.6	6.0	55.84	5.74	25.6	2.0	85.2	4.4	88.6	4.2
22	162.0	7.2	55.76	5.88	25.6	2.0	85.4	4.4	88.4	3.2
23	162.9	5.7	56.00	5.32	25.5	1.9	85.4	4.2	88.6	3.4
24	162.3	6.0	56.46	5.58	25.9	1.9	86.4	4.2	88.4	3.8
25	161.4	6.3	55.74	6.36	25.7	2.1	86.2	5.0	87.8	3.6
26-29	162.0	6.0	55.76	6.16	25.8	2.1	86.2	4.6	88.4	3.4
30-39	161.4	6.0	56.04	6.48	26.0	2.2	86.4	4.8	88.2	3.4
40-49	159.9	6.0	55.10	7.02	25.6	2.3	86.4	4.8	87.4	3.8
50-59	158.4	6.0	54.00	7.10	25.2	2.2	86.4	5.2	86.2	3.6
60-69	156.9	6.0	52.32	7.06	24.5	2.2	85.6	5.0	85.0	3.8
70 ≤	153.3	6.9	49.18	6.58	23.6	2.4	84.2	5.2	82.6	4.6

昭和33年度国民栄養調査のうち、5月に実施された体力関係調査による結果
 厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績」昭和
 34年1、2月刊による。この栄養調査は国民全体を対象としているが、実施に当つて
 は標本抽出法によつて抽出された地区の全世帯およびその構成員を調査の客体として
 いる。(次頁につづく)

表 1. 男女、年齢（各歳）別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和33年）

(2) 女

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		上腕囲 (cm)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	63.7	6.5	6.88	1.55	13.4	1.8	41.6	3.1	41.1	4.8
1	75.6	5.1	9.49	1.54	14.1	1.3	45.6	2.6	46.7	3.4
2	83.7	5.0	11.43	1.54	14.6	1.3	48.3	2.6	50.3	3.1
3	91.5	6.0	13.45	1.72	15.4	1.3	50.6	2.9	53.5	3.5
4	97.7	5.0	15.01	1.74	15.6	1.2	52.1	2.6	56.4	3.4
5	103.7	4.7	16.50	1.99	15.7	1.2	53.6	2.6	58.7	3.2
6	109.2	4.7	18.34	2.43	16.0	1.3	55.1	2.8	61.5	3.3
7	114.6	5.7	20.04	2.98	16.3	1.4	56.4	2.2	64.2	3.4
8	119.7	5.4	22.38	2.88	16.9	1.4	58.4	3.2	67.0	3.8
9	125.1	6.3	24.58	3.44	17.5	1.6	60.4	1.6	69.4	3.6
10	129.9	6.6	27.10	3.88	18.0	1.5	62.2	3.4	71.4	4.0
11	136.2	7.2	30.98	5.16	19.0	1.8	65.4	4.8	74.6	4.0
12	141.3	6.6	34.96	5.86	19.8	1.8	68.8	4.8	77.6	4.4
13	146.1	6.6	39.92	6.36	21.1	2.3	72.6	5.2	80.0	4.2
14	149.4	5.7	44.40	5.96	22.4	2.1	76.0	4.8	82.4	3.2
15	150.6	5.7	46.56	5.56	23.1	2.2	77.8	4.4	82.8	3.6
16	151.2	6.3	48.42	5.90	23.8	2.3	79.6	4.8	83.0	4.0
17	151.8	5.7	49.56	5.94	24.3	2.2	80.6	4.8	83.6	3.6
18	151.5	4.8	49.98	6.04	24.3	2.3	81.4	5.0	83.6	2.6
19	152.1	5.7	50.40	5.64	24.9	2.2	81.8	6.4	83.8	3.2
20	151.8	4.8	50.36	6.02	24.7	2.3	82.0	4.8	83.8	3.2
21	151.5	5.7	50.76	6.42	24.7	2.2	82.6	5.2	83.8	3.0
22	152.1	4.5	50.82	5.60	24.9	2.2	83.0	5.0	83.8	2.8
23	150.9	5.7	49.04	6.34	24.4	2.2	82.0	5.4	83.4	3.2
24	150.6	5.4	48.96	5.66	24.5	2.3	82.0	4.8	83.4	3.4
25	150.9	4.8	49.00	5.76	24.5	2.2	82.2	4.8	83.6	3.2
26-29	150.6	5.4	48.74	5.96	24.4	2.2	81.6	5.0	83.4	3.2
30-39	150.0	5.4	48.90	6.36	24.6	2.4	80.8	5.4	83.2	3.2
40-49	148.5	5.7	49.28	7.34	25.0	2.6	81.6	6.4	82.6	3.6
50-59	146.4	5.7	47.76	7.44	24.7	2.7	82.0	6.8	80.6	3.8
60-69	143.7	5.7	45.30	7.20	24.0	2.7	81.2	6.8	78.4	4.0
70≤	140.7	6.0	41.86	6.40	22.7	2.8	79.6	6.4	75.6	4.2

標本抽出は、昭和32年4月15日において実施された厚生行政基礎調査の標本を親標本として全国で180地区を無作為抽出したもの。調査世帯は原則として一年間変更しないものとし、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠とし、新たに転入してきた世帯については対象外としている。

表2 男女、年齢（各歳）別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和32年）

(1) 男

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		上腕囲 (cm)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	65.2	6.1	7.39	1.70	13.9	1.6	42.8	3.4	41.6	4.5
1	76.8	4.9	10.04	1.47	14.4	1.3	46.8	2.6	47.4	3.1
2	85.4	4.8	12.09	1.72	14.8	1.3	49.4	2.9	51.1	3.2
3	92.2	5.1	13.85	1.73	15.3	1.2	51.7	2.6	54.2	3.5
4	98.6	5.1	15.42	1.89	15.5	1.1	53.4	2.8	56.7	3.3
5	104.2	5.2	16.81	1.95	15.5	1.2	54.7	3.0	59.3	3.1
6	110.0	5.5	18.46	2.08	15.8	1.1	56.3	2.8	62.1	3.1
7	115.5	5.4	20.80	2.40	16.3	1.2	58.2	2.6	64.8	3.4
8	120.6	6.0	22.82	2.70	16.8	1.3	60.0	2.2	67.0	3.2
9	125.4	5.7	25.26	3.30	17.4	1.4	62.2	3.6	69.4	3.6
10	129.0	6.3	26.90	4.12	17.8	1.5	63.6	3.6	71.0	3.8
11	134.1	6.3	30.16	4.10	18.6	1.4	65.8	3.4	73.2	3.4
12	140.1	7.5	33.60	5.08	19.5	1.7	68.4	3.8	75.8	4.0
13	145.5	8.4	38.22	6.98	20.5	2.2	71.4	5.0	78.6	4.6
14	151.5	8.4	42.80	7.04	21.5	2.2	74.8	5.2	81.8	4.8
15	157.2	7.5	48.12	6.72	23.1	2.1	78.6	4.8	84.8	4.6
16	160.2	6.3	51.58	6.18	24.1	2.0	81.4	4.6	86.6	4.0
17	161.1	7.5	52.94	7.24	24.6	2.1	82.6	4.8	87.2	4.4
18	162.6	6.3	55.44	6.06	25.2	2.0	84.6	4.6	88.4	3.8
19	162.6	6.3	55.98	6.44	25.5	2.1	84.8	4.4	88.2	4.2
20	162.0	6.6	55.54	5.78	25.2	2.1	84.8	4.6	88.0	3.8
21	161.7	6.0	55.36	5.30	25.5	1.9	85.4	4.2	88.4	3.8
22	162.0	5.7	55.56	6.12	25.8	2.1	85.6	4.4	88.4	3.8
23	162.6	6.0	56.50	6.08	25.7	1.8	86.4	4.6	88.6	3.4
24	162.0	5.4	55.26	5.52	25.6	2.0	86.0	4.8	88.0	4.2
25	161.1	5.7	55.88	5.94	25.6	2.0	86.4	4.6	87.8	3.0
26-29	162.0	6.6	55.68	6.20	25.7	2.1	86.4	4.6	88.2	3.6
30-39	161.4	6.3	55.78	6.44	25.7	2.1	86.4	4.8	88.0	3.4
40-49	159.9	6.0	55.34	6.56	25.5	2.1	86.4	5.0	87.4	3.0
50-59	158.7	5.7	54.48	6.74	25.2	2.2	86.8	5.0	86.4	3.2
60-69	156.6	5.7	51.98	6.76	24.4	2.2	85.8	5.0	84.8	3.4
70≤	153.9	6.6	49.58	6.70	23.5	2.2	84.6	4.8	82.6	4.4

昭和32年度国民栄養調査のうち、5月に実施された体力関係調査の結果
厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和32年度国民栄養調査成績」昭和
33年11月刊による。

(次頁につづく)

表2. 男女、年齢(各歳)別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差(昭和32年)

(2) 女

年 齢	身長(cm)		体重(kg)		上腕囲(cm)		胸囲(cm)		座高(cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	64.0	6.7	6.93	1.61	13.3	1.7	41.8	3.8	41.0	4.9
1	75.1	4.7	9.28	1.41	14.1	1.3	45.4	2.4	46.0	3.3
2	83.7	4.9	11.48	1.67	14.7	1.2	48.3	2.6	50.0	3.1
3	90.8	4.8	13.26	1.77	15.1	1.3	50.2	3.1	53.3	3.1
4	97.6	5.1	14.79	1.93	15.5	1.4	52.1	2.7	56.1	3.1
5	103.4	4.9	16.40	2.08	15.6	1.1	53.4	2.8	58.9	3.5
6	108.6	5.2	17.82	2.19	15.8	1.3	54.6	2.7	61.3	2.9
7	114.3	6.0	19.98	2.64	16.2	1.3	56.6	2.8	64.2	3.2
8	119.7	6.0	22.14	3.06	16.7	1.5	58.2	2.6	66.8	3.6
9	124.8	6.3	24.62	3.42	17.3	1.5	60.2	3.2	69.2	3.4
10	129.6	6.6	27.02	4.22	17.9	1.6	62.4	3.6	71.2	3.6
11	134.7	6.9	30.20	5.14	18.7	1.9	64.8	4.6	74.0	3.8
12	141.3	7.2	35.24	6.40	19.7	2.0	68.8	5.0	77.4	4.4
13	145.8	6.0	40.14	6.44	21.2	2.1	73.0	5.4	80.0	4.0
14	148.2	5.4	42.80	6.14	22.0	2.2	75.2	5.0	81.6	3.8
15	150.6	5.7	45.70	6.02	22.8	2.2	77.2	5.0	82.8	3.4
16	151.2	5.1	48.28	6.02	23.8	2.2	79.6	5.0	83.2	3.6
17	151.2	5.4	49.44	6.38	24.0	2.1	80.2	4.6	83.4	3.8
18	151.5	6.0	50.26	5.88	24.3	2.2	81.4	5.0	83.8	3.2
19	151.8	5.4	50.22	5.98	24.4	2.1	81.4	4.6	83.8	3.2
20	151.5	5.4	50.38	6.04	24.6	2.1	81.6	5.2	83.6	2.8
21	151.2	5.7	49.84	5.64	24.4	2.0	81.4	4.6	83.4	3.0
22	151.2	5.4	49.68	6.12	24.4	2.2	81.8	5.0	83.4	3.0
23	151.5	5.7	49.38	5.66	24.2	2.1	81.6	4.6	83.8	3.4
24	150.9	6.0	48.86	5.70	24.1	2.1	81.4	4.8	83.6	3.2
25	150.9	5.4	48.96	6.12	24.2	2.2	82.0	5.0	83.0	4.0
26-29	150.9	5.1	49.24	5.88	24.4	2.2	81.4	5.0	83.8	3.2
30-39	149.7	5.4	48.90	6.24	24.5	2.3	80.8	5.4	83.2	3.4
40-49	148.5	5.4	48.86	7.08	24.7	2.5	81.2	6.2	82.4	3.4
50-59	146.1	5.4	47.28	7.36	24.4	2.7	81.4	6.6	80.8	3.6
60-69	143.7	6.0	45.16	7.12	23.8	2.8	80.8	6.4	78.4	3.8
70 ≤	140.4	6.9	42.06	7.06	22.6	2.8	79.6	6.0	75.8	4.8

この調査は、厚生行政基礎調査の標本を親標本とし、全国で180地区を層化無作為抽出してその地区の全世帯およびその構成員について調査を行った標本抽出法によるもの。なお調査世帯は原則として一年間変更しないものとし、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠とし、新たに転入してきた世帯については対象外としている。

表3 男女、年齢（各歳）別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和31年）

(1) 男

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		上腕囲 (cm)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	65.6	7.2	7.40	1.69	13.8	1.6	43.0	3.6	41.5	5.6
1	77.3	4.7	9.91	1.45	14.3	1.3	46.8	2.5	47.8	3.1
2	85.8	4.9	12.23	1.51	14.9	1.2	49.7	2.8	51.1	3.4
3	92.6	5.0	13.91	1.80	15.3	1.2	51.7	2.8	54.1	3.5
4	98.8	5.3	15.36	1.84	15.6	1.1	53.4	3.1	56.6	3.6
5	104.7	4.8	16.88	1.95	15.7	1.2	54.7	2.7	59.4	3.1
6	110.0	5.8	18.58	2.05	15.8	1.3	56.5	3.0	62.2	3.1
7	115.5	6.0	20.62	2.26	16.2	1.3	58.6	3.6	64.8	3.0
8	120.6	5.4	22.74	2.70	16.7	1.3	60.2	3.2	67.2	3.6
9	124.8	5.1	24.58	3.08	17.3	1.5	61.8	2.8	69.0	3.0
10	129.0	6.3	26.94	3.68	17.8	1.7	63.8	3.4	71.2	3.6
11	134.4	6.3	29.76	4.42	18.6	1.6	66.0	4.0	73.4	3.4
12	139.5	7.5	33.06	5.16	19.3	1.6	68.2	4.4	75.4	4.2
13	144.6	8.4	36.80	6.50	20.3	2.1	70.4	4.6	78.2	4.4
14	152.1	8.4	43.20	7.54	21.7	2.2	75.4	5.6	82.0	5.0
15	157.8	7.5	48.64	6.98	23.2	2.1	79.0	4.8	85.2	4.2
16	160.2	6.9	51.84	6.82	24.1	2.2	81.4	5.2	86.6	4.4
17	161.7	6.3	53.60	6.32	24.6	2.1	82.8	4.6	87.6	3.8
18	162.6	6.3	54.22	6.50	25.0	2.0	83.8	4.6	88.4	3.4
19	162.0	5.7	54.94	5.58	25.2	2.2	84.8	4.4	88.6	3.8
20	162.3	6.3	55.44	5.86	25.2	2.0	84.8	4.6	88.4	3.6
21	162.9	5.4	55.72	5.68	25.4	2.1	85.6	5.0	88.0	3.8
22	162.6	6.3	55.86	5.76	25.6	2.0	85.4	4.8	88.4	3.4
23	162.9	6.0	56.86	6.36	25.5	2.2	86.2	5.0	88.8	3.2
24	162.0	5.4	54.94	5.44	25.7	1.5	85.4	4.4	88.6	3.0
25	162.3	5.7	54.90	6.02	25.4	2.1	85.4	5.0	88.4	3.4
26-29	161.7	6.0	55.00	6.18	25.6	2.0	85.8	4.6	88.2	3.6
30-39	161.4	5.7	55.50	6.40	25.7	2.1	86.2	4.6	88.0	3.6
40-49	159.9	6.0	55.32	6.90	25.6	2.2	86.2	5.4	87.2	3.6
50-59	158.7	5.7	54.08	6.70	25.2	2.2	86.4	4.8	86.4	3.6
60-69	156.6	6.0	51.52	6.46	24.3	2.2	85.4	4.8	84.6	3.6
70 ≦	154.2	6.6	58.78	7.02	23.5	2.3	84.2	5.2	82.8	4.2

昭和31年度国民栄養調査のうち、5月に実施された体力関係調査の結果、厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和31年度国民栄養調査成績」昭和昭和32年12月刊による。

(次頁に)

表3 男女、年齢（各歳）別身長、体重、上腕囲、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和31年）

(2) 女

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		上腕囲 (cm)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	63.6	6.7	6.91	1.69	13.6	1.5	42.0	3.6	40.5	5.0
1	75.9	5.1	9.58	1.53	14.0	1.1	45.7	2.2	46.5	3.7
2	83.9	5.6	11.58	1.62	14.6	1.2	48.3	2.6	50.1	3.3
3	91.1	4.5	13.40	1.70	15.2	1.1	50.5	2.6	53.3	3.0
4	97.5	5.3	14.90	1.65	15.4	1.2	52.0	2.8	56.3	2.9
5	103.7	5.5	14.46	2.07	15.6	1.1	53.3	2.7	50.2	3.5
6	109.0	4.9	17.83	2.01	15.7	1.1	54.8	2.5	61.4	3.0
7	114.6	6.0	19.92	2.72	16.1	1.4	56.6	3.6	64.2	3.4
8	119.7	6.0	22.06	3.08	16.8	1.5	58.4	2.6	66.8	3.4
9	124.5	6.6	24.12	3.34	17.2	1.4	60.2	3.8	69.0	3.8
10	129.6	6.9	27.18	4.54	18.0	1.8	62.8	4.2	71.4	3.8
11	135.9	7.2	30.70	4.84	18.8	1.8	65.2	4.6	74.6	3.8
12	140.7	7.5	35.12	6.00	19.9	2.0	68.8	5.0	77.0	4.0
13	144.9	6.3	38.94	6.04	20.8	2.0	72.0	4.8	79.4	4.0
14	149.1	5.7	43.32	6.00	21.9	2.0	75.2	4.6	81.8	3.6
15	150.9	6.0	45.68	6.20	22.7	2.1	77.2	4.6	82.6	3.6
16	151.5	4.8	47.68	5.82	23.7	2.2	78.8	4.8	83.4	2.8
17	151.2	5.7	49.50	6.42	24.3	2.2	81.0	5.2	83.4	3.6
18	151.8	5.1	49.78	5.92	24.5	2.2	81.0	5.0	83.6	3.4
19	151.8	4.5	49.84	5.50	24.4	2.0	81.2	4.6	83.6	3.0
20	151.8	5.7	49.38	6.46	24.5	2.1	81.4	5.0	84.0	2.8
21	151.8	5.4	49.80	5.72	24.4	2.0	81.6	4.8	83.6	3.2
22	150.9	5.1	49.16	5.78	24.4	2.0	82.0	5.0	83.2	2.8
23	151.2	5.4	49.60	5.88	24.6	2.2	82.2	4.8	83.4	3.0
24	150.6	5.4	48.72	5.80	24.3	2.3	81.6	4.6	83.4	3.0
25	150.9	5.4	48.96	5.88	24.4	1.9	81.8	4.6	83.6	3.0
26-29	150.9	5.4	48.82	5.80	24.4	2.1	81.4	4.8	83.6	3.0
30-39	149.7	5.4	48.70	6.34	24.6	2.4	80.6	5.4	83.0	3.4
40-49	148.5	5.4	49.02	7.04	25.0	2.6	81.6	6.2	82.4	3.2
50-59	146.7	5.7	47.64	7.62	24.7	2.8	82.0	6.8	80.8	3.4
60-69	143.2	5.4	44.38	7.00	23.7	2.7	80.2	6.6	78.6	3.8
70≤	140.7	6.3	41.60	7.02	22.6	2.8	79.4	6.4	76.0	4.2

この調査は、厚生行政基礎調査被調査地区の中から全国で180地区を無作為に抽出し、抽出された地区の全世帯およびその構成員を調査対象としている。調査世帯は一年間変更しないが、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠とし、新たに転入してきた世帯については対象外としている。

表4 男女、年齢（各歳）別身長、体重、胸囲および座高の平均値
ならびに標準偏差（昭和30年）

(1) 男

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	65.2	6.8	7.17	1.67	42.1	3.7	41.4	5.3
1	76.4	5.1	9.76	1.44	46.5	2.6	47.5	3.2
2	84.8	5.1	11.82	1.55	49.4	2.6	51.1	2.9
3	92.0	4.5	13.74	1.65	51.6	2.5	54.3	2.8
4	97.9	4.7	15.22	1.88	53.2	2.5	56.3	3.0
5	104.0	4.6	16.76	1.84	54.8	3.5	59.2	3.0
6	109.8	5.1	18.52	2.06	56.5	2.6	62.0	3.3
7	114.9	5.6	20.41	2.62	58.4	3.1	64.3	3.3
8	120.2	5.9	22.63	3.08	60.2	3.2	67.0	3.2
9	124.2	5.4	24.58	3.06	61.6	2.9	68.9	3.7
10	129.4	6.1	26.91	3.40	63.6	3.6	71.3	3.4
11	134.4	6.2	29.51	4.02	65.5	3.4	72.9	3.4
12	138.1	7.1	32.34	4.75	67.7	3.9	74.8	3.9
13	145.3	8.1	37.55	6.55	71.2	4.9	78.4	4.5
14	151.2	8.5	42.27	7.10	74.4	4.9	81.6	5.2
15	155.3	8.1	46.36	7.15	77.2	5.0	83.8	4.8
16	159.5	6.3	50.52	5.94	80.5	4.6	86.0	4.2
17	160.5	5.7	52.36	5.58	81.9	4.9	87.2	3.6
18	162.1	6.1	54.60	5.74	83.9	4.7	88.0	4.2
19	163.3	6.2	55.44	5.81	84.6	4.3	88.3	3.8
20	162.2	6.0	55.58	6.04	85.2	4.4	88.2	3.1
21	162.2	5.9	55.85	6.43	85.5	4.6	88.0	3.2
22	162.2	6.1	55.16	5.83	85.3	4.6	88.4	3.5
23	162.1	5.9	55.83	5.89	85.7	4.6	88.3	3.4
24	162.3	5.5	55.76	5.61	86.0	4.3	88.1	3.3
25	162.6	6.2	55.85	6.04	85.9	4.4	88.2	3.7
26-30	162.4	5.6	55.72	5.99	86.0	4.6	88.5	3.6
31-40	160.7	6.1	55.26	6.36	86.0	4.7	87.8	3.5
41-50	159.6	6.2	55.42	6.42	86.0	4.6	87.0	3.6
51-60	158.1	6.1	53.44	6.83	85.8	5.3	86.3	3.7
61-70	156.3	6.1	51.30	6.67	85.1	4.8	84.7	3.5
71 ≦	154.5	6.2	49.64	6.87	83.8	5.5	83.2	4.0

昭和30年度国民栄養調査のうち、5月に実施された体力関係調査の結果。
厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和30年度国民栄養調査成績」昭和
31年8月刊による。前掲の昭和31-33年と26歳以上の年齢階級区分が異なるの
で、比較の際は注意を要する。

(次頁に)

表 4. 男女、年齢（各歳）別身長、体重、胸囲および座高の平均値
ならびに標準偏差（昭和30年）

(2) 女

年 齢	身長 (cm)		体重 (kg)		胸囲 (cm)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
0	64.2	6.7	6.77	1.58	41.6	3.3	40.8	4.7
1	75.2	4.6	9.28	1.36	45.3	2.5	46.3	3.1
2	84.1	4.6	11.48	1.43	48.3	2.5	50.2	2.8
3	90.2	4.8	12.97	1.48	50.1	2.7	53.2	2.8
4	97.2	5.0	14.69	1.86	52.0	3.0	56.3	3.3
5	102.6	5.2	16.17	1.87	53.5	2.6	58.6	3.3
6	108.5	5.2	17.68	2.16	54.8	2.6	61.4	3.0
7	113.9	5.3	19.82	2.50	56.6	2.9	64.0	3.2
8	118.9	5.5	21.88	3.02	58.2	3.1	66.4	3.3
9	123.2	6.3	24.07	3.10	60.2	3.8	68.7	3.4
10	128.4	6.4	26.71	4.00	62.3	3.7	71.0	3.4
11	133.6	7.1	29.77	5.20	64.8	4.4	73.4	4.8
12	140.6	6.9	34.58	5.70	68.3	4.8	77.0	4.2
13	144.8	6.8	39.01	6.57	71.8	5.3	79.5	4.0
14	148.3	5.8	42.72	6.21	74.9	5.0	81.5	3.4
15	150.0	6.3	45.38	6.19	77.0	5.1	82.8	3.3
16	151.2	6.0	47.70	5.89	79.4	4.6	83.2	3.3
17	151.4	5.0	49.17	5.63	80.5	4.9	83.5	2.8
18	152.2	5.6	50.92	5.46	82.0	4.7	83.8	3.4
19	151.4	5.6	50.38	6.07	82.1	5.1	83.6	2.8
20	151.7	5.0	50.30	5.99	82.2	5.0	83.5	3.0
21	151.6	5.3	50.10	5.92	82.1	5.1	83.5	3.3
22	151.1	5.3	49.54	5.95	82.2	4.6	83.6	3.0
23	150.9	5.4	48.53	5.55	81.9	5.0	83.7	3.1
24	151.0	5.0	48.39	5.51	81.6	4.9	83.8	2.8
25	150.5	6.1	48.34	5.21	81.8	5.0	83.4	3.0
26-30	150.6	5.4	48.25	5.70	81.0	5.0	83.2	3.6
31-40	149.3	5.2	48.39	6.34	80.6	5.3	82.8	3.2
41-50	148.1	5.4	48.49	7.03	81.1	6.2	82.0	3.2
51-60	145.1	5.7	46.62	7.20	81.1	6.8	80.3	3.5
61-70	143.4	6.0	44.32	7.30	80.1	6.9	78.2	4.0
71≤	140.0	6.0	40.93	6.36	78.5	5.9	75.2	4.6

国民栄養調査は、厚生行政基礎調査被調査地区の中から全国で180地区を無作為に抽出し、抽出された地区の全世帯およびその構成員を調査対象としている。調査世帯は一年間変更しないが、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠とし、新たに転入してきた世帯については対象に入れていない。

表5 年次別、男女、年齢（各歳）別身長の平均値（昭和22年-29年）

(1) 男

(cm)

年 齢	昭和22年	昭和23年	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	昭和29年
0	64.4	65.4	64.9	65.8	66.0	64.8	64.4	64.3
1	75.4	74.5	74.4	75.1	75.4	76.5	76.4	76.4
2	83.5	82.4	83.2	83.3	83.8	84.5	84.9	84.5
3	90.2	89.8	90.3	90.8	91.4	90.9	91.1	91.5
4	96.2	96.0	96.4	96.7	97.2	97.6	97.7	98.3
5	101.7	101.8	102.7	102.6	103.0	103.5	103.6	104.0
6	107.1	107.3	108.2	108.4	108.5	108.7	108.8	109.3
7	111.8	112.3	113.2	113.7	113.9	113.6	114.3	114.4
8	116.2	116.9	117.5	118.1	118.9	118.9	118.2	118.5
9	121.5	121.6	122.0	122.7	123.3	123.4	123.4	124.1
10	125.5	125.9	126.0	126.9	127.6	127.3	128.5	128.9
11	129.7	130.3	130.2	131.1	132.1	132.9	133.0	132.9
12	133.6	135.0	134.5	136.1	136.8	137.0	137.4	137.7
13	138.6	139.7	139.8	141.7	142.3	142.5	143.1	142.6
14	143.8	144.9	145.3	147.3	148.4	149.5	149.8	149.7
15	150.3	150.2	151.3	152.7	153.7	154.7	155.8	155.3
16	155.6	154.6	155.7	156.5	157.7	157.4	158.4	158.9
17	158.9	158.2	158.4	158.9	159.8	159.2	160.1	160.4
18	160.1	160.3	160.0	160.3	160.8	160.8	161.3	161.2
19	160.9	160.9	160.8	161.0	161.1	161.4	162.5	161.5
20	161.5	161.2	161.2	161.5	161.7	162.1	162.1	160.9
21	161.0	161.5	161.6	161.9	162.1	162.0	161.8	161.1
22	161.3	161.6	161.5	161.8	162.3	162.5	161.8	160.7
23	161.4	161.6	161.6	162.0	162.3	162.1	162.2	161.1
24	161.0	161.6	161.8	161.8	162.2	162.4	162.4	161.9
25	161.1	161.3	161.6	161.5	161.8	161.9	161.8	161.9
26-30	160.3	160.7	161.2	161.1	161.4	161.5	162.3	162.1
31-40	160.1	160.0	160.3	160.3	160.5	160.5	160.6	160.4
41-50	158.7	158.8	159.1	159.1	159.3	159.7	159.8	159.2
51-60	157.9	157.4	157.5	157.8	157.8	157.8	158.2	157.8
61-70	155.6	155.8	155.7	156.1	156.1	156.4	156.3	156.5
71 ≤	154.2	154.2	153.6	154.3	154.1	153.8	153.5	154.2

各年とも国民栄養調査の結果で、表1の引用書（国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績）による。

前掲の昭和31-33年と26歳以上の年齢階級が異なる。

（次頁に）

表5 年次別、男女、年齢（各歳）別身長の平均値（昭和22年-29年）

(2) 女

年 齢	昭和22年	昭和23年	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	昭和29年
0	63.3	63.8	64.2	64.9	64.3	64.2	63.5	63.8
1	72.9	73.4	73.6	74.0	73.9	75.0	74.8	75.6
2	82.3	81.9	82.0	82.2	82.4	83.6	83.3	83.7
3	88.7	89.3	89.2	89.6	90.0	89.7	90.7	90.8
4	95.0	95.2	95.5	95.9	96.0	96.8	96.6	97.1
5	101.0	100.5	101.4	101.6	102.0	102.6	102.9	103.3
6	106.0	105.6	107.1	107.2	107.7	107.9	107.8	108.3
7	110.8	110.7	112.5	112.7	112.8	113.3	114.0	113.5
8	115.7	115.8	117.2	117.5	117.8	118.4	118.8	118.6
9	120.5	121.0	121.3	122.1	122.4	122.7	123.5	123.6
10	125.5	126.0	125.8	126.8	127.3	127.7	128.5	128.6
11	129.9	130.9	130.8	131.6	132.5	132.3	134.0	134.0
12	134.8	136.0	136.1	136.8	137.6	138.2	139.0	139.5
13	139.6	140.7	141.1	142.0	142.8	142.9	143.5	144.4
14	144.0	144.5	145.0	145.8	146.7	147.7	147.1	147.5
15	147.9	147.3	147.7	148.5	148.9	149.2	149.7	149.6
16	149.3	149.2	149.1	150.0	150.3	150.5	150.4	150.7
17	150.2	150.1	150.2	150.6	150.7	151.5	151.7	150.9
18	150.3	150.7	150.7	150.8	150.8	150.7	151.5	151.7
19	150.6	151.1	151.0	150.9	150.7	151.6	150.8	150.8
20	150.4	150.9	151.1	150.8	150.5	151.5	151.4	150.8
21	150.2	150.6	151.0	151.0	150.2	150.8	151.4	150.7
22	150.3	150.5	150.9	150.8	150.2	151.4	150.9	150.8
23	149.4	150.4	150.5	150.8	150.3	151.4	151.3	150.3
24	150.1	150.6	150.3	150.7	150.4	151.0	150.3	150.0
25	150.0	150.5	150.1	150.4	150.4	150.8	150.6	150.6
26-30	149.4	149.8	149.5	149.7	149.7	150.4	150.2	150.4
31-40	148.7	148.8	148.6	148.9	148.9	149.5	149.2	149.3
41-50	147.0	147.4	147.3	147.7	147.3	148.0	147.9	147.8
51-60	145.5	145.6	145.5	146.0	145.6	146.1	145.9	145.6
61-70	143.3	143.2	143.3	143.8	143.3	143.0	143.5	143.5
71 ≤	140.5	140.4	140.6	141.7	140.7	140.3	140.6	139.4

なお、この調査における標本抽出法は昭和23年以降は無作為抽出法によるが、22年は有意抽出法によっている。
 (表8まで共通)

表6 年次別、男女、年齢（各歳）別体重の平均値
（昭和22年-29年）

(1) 男

(Kg)

年 齢	昭和22年	昭和23年	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	昭和29年
0	6.97	7.15	6.82	7.18	7.24	6.98	7.08	7.11
1	9.34	9.41	9.22	9.56	9.53	9.72	9.71	9.68
2	11.40	11.36	11.27	11.61	11.53	11.70	11.88	11.69
3	13.11	13.28	13.18	13.48	13.45	13.53	13.57	13.58
4	14.69	14.63	14.78	14.87	15.03	15.02	15.15	15.26
5	16.09	16.04	16.26	16.68	16.69	16.54	16.69	16.67
6	17.58	17.79	17.72	18.79	18.43	18.05	18.24	18.39
7	19.37	19.55	19.41	20.71	20.42	20.27	20.49	20.33
8	21.20	21.46	21.27	22.55	22.41	22.48	22.52	22.28
9	23.28	23.63	23.52	24.36	24.35	24.29	24.80	24.74
10	24.99	26.13	25.51	26.07	26.42	26.54	27.08	26.87
11	27.39	28.04	27.79	28.46	28.77	29.14	29.40	29.29
12	30.24	30.84	30.52	31.51	31.75	31.86	32.43	32.00
13	34.00	34.32	34.17	35.36	35.75	35.29	36.18	35.65
14	37.92	38.63	38.65	39.88	40.48	41.04	41.24	41.14
15	43.12	43.38	43.80	44.63	45.21	46.17	46.81	46.00
16	48.01	47.38	47.61	48.57	49.09	48.97	50.65	49.90
17	51.81	50.79	50.65	51.58	51.90	51.19	52.80	52.47
18	53.01	53.02	52.69	53.53	53.69	53.18	54.42	53.49
19	54.88	54.11	53.85	54.66	54.66	54.02	54.97	54.35
20	55.56	55.09	54.57	55.27	55.46	55.18	54.74	54.59
21	55.75	55.81	55.09	55.62	55.91	55.47	55.36	55.12
22	55.83	55.68	55.28	55.59	56.08	56.07	56.02	54.35
23	55.93	55.94	55.38	55.78	56.24	55.72	55.40	55.07
24	55.49	55.76	55.38	55.77	56.02	55.58	56.21	55.35
25	55.44	55.45	55.13	55.78	55.59	55.07	55.73	55.33
26-30	55.50	55.00	54.70	55.61	55.48	55.15	55.81	55.10
31-40	55.00	55.08	54.56	55.29	55.27	54.95	55.29	54.72
41-50	54.23	54.48	54.06	54.50	54.87	54.90	55.35	54.56
51-60	52.69	53.11	52.82	53.14	53.63	53.48	53.97	53.21
61-70	50.69	51.14	50.83	51.20	51.85	51.15	51.65	51.06
71≤	48.48	48.56	48.80	48.97	49.50	48.57	49.42	48.47

前表と同様

表 6 年次別、男女、年齢（各歳）別体重の平均値
（昭和22年 - 29年）

(2) 女

(kg)

年 齢	昭和22年	昭和23年	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	昭和29年
0	6.58	7.10	6.77	6.92	6.90	6.59	6.71	6.81
1	8.99	9.02	8.73	9.04	9.09	9.08	9.18	9.26
2	10.97	10.84	10.61	10.98	11.11	11.30	11.22	11.16
3	12.58	12.57	12.44	12.87	12.96	12.88	13.21	13.22
4	14.06	13.80	14.07	14.50	14.50	14.55	14.73	14.75
5	15.72	15.70	15.76	16.05	16.06	16.02	16.22	16.25
6	16.90	17.23	17.60	17.73	17.79	17.64	17.70	17.55
7	18.95	18.91	19.38	19.63	19.63	19.70	19.88	19.58
8	20.76	20.74	21.29	21.57	21.63	21.89	22.14	21.90
9	22.85	22.79	23.27	23.52	23.67	23.93	24.34	23.84
10	25.00	25.21	25.53	25.79	26.13	26.12	26.57	26.50
11	27.49	28.10	28.38	28.61	29.21	29.02	30.02	29.83
12	30.90	31.51	32.06	32.20	33.02	32.70	33.71	33.64
13	35.06	35.53	36.27	36.43	37.13	36.99	37.95	38.23
14	39.37	39.67	40.51	40.60	41.18	41.47	42.03	41.50
15	43.90	43.57	44.25	44.24	44.64	44.29	45.97	45.47
16	47.73	46.50	47.09	47.04	47.23	47.51	47.68	47.74
17	49.03	49.04	49.10	48.73	48.77	48.81	50.10	48.72
18	50.14	50.48	50.25	49.92	49.85	49.35	50.13	49.58
19	50.49	51.08	50.76	49.52	50.19	49.93	50.02	49.99
20	50.89	51.17	51.02	50.67	50.23	50.51	49.40	49.74
21	50.74	50.82	50.80	50.63	49.97	49.43	50.22	49.58
22	50.30	50.34	50.46	50.13	49.70	49.33	50.25	49.32
23	50.04	50.06	50.33	49.68	49.39	48.99	49.27	48.19
24	49.88	49.91	50.16	49.46	49.37	49.24	48.98	49.09
25	49.93	49.70	49.93	49.29	49.27	48.97	48.51	48.76
26-30	49.20	49.14	49.99	49.37	49.28	48.39	48.62	48.33
31-40	49.11	48.49	48.53	49.20	49.03	48.76	48.70	48.24
41-50	47.65	47.39	48.32	48.25	48.19	48.80	48.91	48.00
51-60	45.22	46.35	46.66	46.69	46.71	47.03	47.47	46.60
61-70	43.22	44.02	44.45	44.53	45.03	44.02	44.59	44.43
71≤	40.89	41.07	41.70	41.78	41.98	41.99	41.45	40.93

表7 年次別、男女、年齢（各歳）別胸囲の平均値
（昭和25年-29年）

(cm)

年 齢	男					女				
	昭和 25年	昭和 26年	昭和 27年	昭和 28年	昭和 29年	昭和 25年	昭和 26年	昭和 27年	昭和 28年	昭和 29年
0	42.6	42.7	41.8	42.1	42.4	41.7	41.8	41.1	41.0	41.4
1	46.1	46.1	46.6	46.8	46.6	45.0	45.1	45.4	45.3	45.5
2	49.0	49.0	49.5	49.3	49.3	47.7	47.9	48.1	48.1	48.1
3	51.5	51.5	51.7	51.6	51.7	50.1	50.3	49.9	50.4	50.4
4	53.2	53.2	53.4	53.5	53.4	51.9	51.7	52.1	52.1	52.0
5	54.8	54.9	54.8	54.8	54.7	53.4	53.3	53.3	53.4	53.2
6	56.7	56.5	56.3	56.3	56.3	54.9	55.0	54.8	55.1	54.8
7	58.2	58.3	58.5	58.9	58.3	56.5	56.6	56.3	56.9	56.4
8	59.9	60.0	60.1	60.2	59.6	58.1	58.2	58.3	58.7	58.5
9	61.6	61.7	61.6	61.9	61.9	59.8	59.7	59.6	60.6	59.9
10	63.2	63.2	63.4	63.6	63.7	61.8	61.5	61.2	62.1	62.1
11	64.9	65.0	65.3	65.6	65.3	64.0	64.0	63.8	64.8	65.0
12	67.0	67.0	66.9	67.8	67.0	66.6	66.8	66.6	67.6	67.7
13	69.6	69.8	70.0	70.4	70.2	69.8	70.2	69.6	70.6	71.4
14	72.8	72.9	73.5	74.1	73.8	73.1	73.4	73.8	74.7	74.2
15	76.2	76.5	77.2	77.8	77.8	76.2	76.3	76.1	77.8	77.6
16	79.1	79.3	79.4	80.6	80.0	78.4	78.7	78.7	79.1	79.1
17	81.4	81.4	81.4	81.9	82.1	80.1	80.1	79.6	81.2	80.0
18	82.8	82.9	83.0	83.3	83.2	81.1	81.2	81.0	81.2	81.3
19	83.7	83.8	83.8	83.7	83.6	81.6	81.7	81.1	81.8	81.1
20	84.3	84.5	84.9	84.3	84.5	82.1	81.9	82.0	81.4	81.6
21	84.8	85.0	85.2	84.0	84.6	82.0	82.0	81.7	81.8	81.4
22	85.0	85.2	85.5	85.6	84.7	81.9	81.9	81.8	82.1	81.7
23	85.3	85.3	85.4	85.5	85.3	81.7	81.7	81.3	81.7	81.2
24	85.2	85.1	85.3	85.6	85.6	81.6	81.7	81.8	81.3	82.1
25	85.4	85.0	85.6	85.8	85.6	81.4	81.5	81.3	81.2	81.5
26-30	85.4	85.3	85.7	85.9	85.6	81.3	81.5	80.6	81.0	80.8
31-40	85.6	85.7	85.5	85.8	85.7	81.2	81.3	80.7	80.7	80.5
41-50	85.2	85.8	86.1	86.3	85.9	81.2	81.3	81.2	81.3	80.7
51-60	84.6	85.3	85.8	86.3	85.5	80.6	80.8	81.2	81.7	81.2
61-70	83.8	84.7	85.1	85.4	84.8	79.7	80.1	80.1	80.6	80.7
71 ≤	82.8	83.5	83.3	84.1	83.8	78.6	79.2	79.0	79.0	78.8

表5と同様。ただし、昭和24年以前の結果は省く。

表 8. 年次別、男女、年齢（各歳）別座高の平均値
（昭和 27 年 - 29 年）

(〇〇)

年 齢	男			女		
	昭和 27 年	昭和 28 年	昭和 29 年	昭和 27 年	昭和 28 年	昭和 29 年
0	41.1	40.7	41.3	40.7	40.2	41.0
1	47.2	47.4	47.1	46.1	46.4	46.7
2	50.9	51.0	50.8	49.9	49.9	50.0
3	53.9	53.9	53.9	52.8	53.5	53.2
4	56.4	56.7	57.0	56.2	56.4	56.2
5	59.2	59.3	59.2	58.5	58.7	59.0
6	61.5	61.6	62.0	61.0	61.2	61.1
7	63.7	64.2	64.3	63.8	63.8	63.7
8	66.4	66.6	66.2	66.2	66.8	66.3
9	68.6	68.7	68.8	68.3	68.9	68.8
10	70.3	71.0	70.9	70.5	71.1	70.6
11	72.4	72.8	72.6	72.9	73.8	73.5
12	74.2	74.9	74.4	75.5	76.6	76.5
13	76.7	77.4	77.2	78.2	78.5	79.0
14	80.4	80.5	80.6	80.7	80.4	81.0
15	83.3	83.8	83.7	81.6	82.5	82.1
16	84.7	85.8	86.0	82.6	83.0	83.4
17	86.5	86.5	86.9	83.2	83.5	83.3
18	87.2	87.6	87.5	82.9	83.7	83.3
19	87.3	88.1	87.4	83.5	83.7	83.2
20	87.8	88.0	87.5	83.7	84.0	83.2
21	88.0	87.9	87.7	83.9	84.1	83.1
22	87.9	88.5	87.3	83.5	83.6	83.6
23	88.4	88.1	87.5	83.3	84.0	82.7
24	88.5	88.5	87.8	83.6	83.3	83.6
25	88.1	88.6	88.1	83.4	83.7	83.4
26-30	87.9	88.4	88.0	83.2	83.6	83.2
31-40	87.6	87.9	87.4	83.0	83.1	82.9
41-50	87.0	87.3	87.0	81.9	82.3	82.0
51-60	86.0	86.3	85.9	80.4	80.7	80.2
61-70	84.6	84.9	84.8	78.0	78.5	78.4
71 ≤	82.9	82.7	82.6	76.0	75.5	75.1

表 5 と同様。ただし、昭和 26 年以前の結果は省く。

表 9 日本人の平均体位基準値

年 齢	男		女		年 齢	男		女	
	身長 (cm)	体重 (kg)	身長 (cm)	体重 (kg)		身長 (cm)	体重 (kg)	身長 (cm)	体重 (kg)
新生児	50.2	3.05	49.3	2.97	13	143.9	36.5	143.8	38.3
0	64.7	6.7	63.7	6.4	14	152.4	43.3	148.4	42.0
1	75.9	9.2	74.7	8.8	15	157.0	47.5	150.0	44.5
2	84.5	11.5	83.3	11.0	16	159.5	50.5	150.4	46.5
3	91.3	13.3	90.2	12.8	17	161.0	52.7	150.5	47.5
4	97.5	15.0	96.3	14.3	18	161.7	53.8	151.0	48.0
5	103.1	16.2	102.2	15.8	19	161.8	54.3	151.0	48.2
6	108.8	18.2	107.9	17.6	20	161.9	54.8	150.8	48.3
7	114.2	20.0	112.9	19.4	21-30	161.8	55.5	150.1	48.5
8	119.1	22.1	118.0	21.4	31-40	160.8	56.4	149.0	49.0
9	123.6	24.3	122.7	23.6	41-50	160.0	56.7	148.2	50.0
10	128.2	26.5	128.1	26.1	51-60	159.0	55.7	147.0	48.7
11	132.8	29.0	132.8	29.4	61以上	156.5	52.5	144.0	45.5
12	137.7	32.2	139.7	33.7					

日本人の体位を判定する上の暫定的統一基準を得るために設定されたもので、厚生省衛生統計委員会の体力および栄養に関する第八専門部会において承認採決されたもの。

資料は、満 5 歳以下を斎藤潔氏の昭和 15-17 年全部調査 24,709 人の平均を用い、満 6 歳より 13 歳は文部省の昭和 12 年度全国学童統計の平均値、14-60 歳は一色綱武氏の昭和 2-10 年帝国生命保険会社の保険申込者(男 103,870、女 28,981)の平均値を保険年齢より満年齢に換算したもの、61 歳以上は厚生省全国栄養調査の昭和 23 年 11 月分調査の集計値に補正を加えたものを用いて作成されたもの。
厚生省「国民栄養の現状、昭和 32 年度国民栄養調査成績」昭和 33 年 11 月刊による。

表10 年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳学徒の身長平均値
(明治33年-昭和33年)

(1) 男		(男)									
年次	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳		
明治	33	107.0	110.9	116.1	120.0	123.9	127.9	133.9	140.0	147.0	
	34	107.0	111.2	116.1	120.3	125.2	128.8	133.6	138.8	146.7	
	35	107.0	111.5	116.1	120.6	124.5	129.1	133.6	139.1	145.5	
	36	107.0	111.5	115.5	120.3	125.2	128.8	133.9	139.4	146.7	
	37	106.7	110.6	115.2	119.7	124.5	127.9	133.3	139.7	147.9	
	38	106.4	110.9	115.2	120.0	124.5	128.5	133.6	139.4	146.4	
	39	106.4	110.9	115.4	120.0	124.8	128.8	133.9	140.0	146.7	
	40	106.4	110.3	115.2	120.0	124.5	128.5	133.3	139.7	146.7	
	41	106.7	111.2	116.1	120.3	124.2	128.5	133.6	139.4	146.1	
	42	106.7	111.2	115.8	120.0	124.5	128.5	133.6	139.1	146.7	
	43	107.0	111.2	115.8	120.3	124.5	128.5	133.6	139.1	146.4	
	44	106.7	111.5	116.1	120.6	124.8	128.8	134.2	139.7	146.7	
	45	107.0	111.2	116.4	120.6	125.2	129.4	134.2	140.0	147.3	
大正	2	106.7	111.2	116.1	120.3	125.2	129.1	133.9	140.0	147.3	
	3	106.7	111.2	115.8	120.6	125.2	129.1	134.2	139.7	146.7	
	4	107.0	111.5	116.1	120.6	125.2	129.1	134.2	139.7	147.0	
	5	107.0	111.5	116.1	120.6	124.8	129.4	134.5	140.0	147.3	
	6	107.0	111.8	116.4	121.2	125.2	129.7	134.5	140.6	147.6	
	7	107.0	111.5	116.4	120.9	125.5	129.7	134.8	141.2	148.2	
	8	107.0	111.5	116.4	120.9	125.2	129.7	134.8	140.6	147.9	
年次	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	
明治	33	152.1	156.1	157.9	160.0	160.0	160.9	160.0	160.0	160.9	160.9
	34	152.4	157.0	159.1	159.7	160.0	160.0	160.6	159.7	160.9	161.2
	35	151.8	156.4	158.2	159.4	160.3	160.6	160.6	160.9	161.8	160.9
	36	152.1	156.4	158.2	159.7	160.3	160.9	160.6	160.6	160.9	160.6
	37	152.4	157.0	158.5	159.7	160.3	160.9	160.9	160.9	160.6	160.6
	38	152.4	157.0	159.1	160.0	160.6	162.1	160.9	161.2	160.9	160.9
	39	152.7	156.7	159.1	160.3	161.5	160.9	161.5	160.6	161.8	161.8
	40	153.0	156.4	158.8	160.0	160.6	160.6	161.2	160.6	160.3	161.2
	41	152.4	157.3	159.1	159.7	160.6	160.6	160.9	161.2	161.2	161.2
	42	153.0	157.0	159.4	160.0	160.9	161.2	161.2	161.2	161.2	161.5
	43	152.7	157.3	159.1	160.0	160.9	161.5	161.2	161.5	161.2	161.2
	44	153.0	157.0	159.4	160.3	160.9	161.5	161.8	161.8	161.5	161.2
	45	153.3	157.6	159.4	160.6	161.2	161.5	161.8	161.8	161.8	161.2
大正	2	153.6	157.6	159.4	160.6	161.2	161.2	161.8	161.8	161.8	162.1
	3	153.3	157.9	159.7	160.6	161.2	161.2	161.8	162.1	161.8	161.8
	4	153.6	157.9	159.7	160.9	161.2	161.5	161.8	161.8	162.4	162.1
	5	153.9	158.2	160.0	160.9	161.5	161.8	162.7	162.4	162.4	162.4
	6	154.5	158.5	160.0	160.9	161.2	161.8	162.7	162.4	162.4	162.4
	7	153.9	158.5	160.0	160.9	161.8	160.9	162.1	162.4	162.4	162.7
	8	154.2	157.9	160.0	160.9	161.8	162.1	162.1	162.1	162.1	162.4

表 10 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の身長平均値

(1) 男(つづき)

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
大正 9	107.0	112.1	116.4	120.9	125.5	129.4	134.8	140.6	148.2
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	107.3	112.1	116.7	121.5	125.8	130.0	135.2	140.9	148.8
12	107.3	112.1	117.0	121.5	126.1	130.3	136.1	141.8	148.8
13	107.3	112.1	117.0	121.8	126.1	130.3	135.5	142.4	149.4
14	107.6	112.1	117.3	121.8	126.4	130.3	135.8	142.1	149.7
15	107.5	112.3	117.3	122.1	126.1	130.7	136.4	143.0	149.8
昭和 2	108.0	112.8	117.8	122.4	126.8	131.1	136.8	143.4	150.1
3	108.1	113.1	117.8	122.5	126.8	131.1	136.7	143.3	150.2
4	108.1	113.1	117.9	122.5	127.0	131.2	136.9	143.2	150.6
5	108.1	113.2	118.0	122.6	127.0	131.4	137.1	143.3	150.7
6	108.3	113.4	118.2	122.8	127.2	131.6	137.3	143.6	151.1
7	108.5	113.5	118.3	123.0	127.4	131.8	137.5	143.8	151.3
8	108.7	113.7	118.5	123.1	127.6	131.6	137.8	144.0	151.8
9	108.8	113.9	118.8	123.3	127.6	132.2	138.2	144.7	152.2
10	108.9	114.0	118.9	123.5	127.9	132.3	138.2	144.7	152.4
11	109.0	114.0	119.0	123.7	128.2	132.5	138.2	144.8	152.6
12	108.8	114.2	119.1	123.6	128.2	132.8	137.7	143.9	152.0
13	108.3	114.2	119.1	124.1	128.3	133.0	137.4	144.7	151.8
14	109.1	113.9	119.3	125.0	128.2	132.9	137.8	144.0	152.1

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正 9	154.2	158.2	160.0	161.2	161.8	162.4	162.4	162.7	161.5	162.7
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	154.5	158.5	160.3	161.5	162.1	162.7	162.7	162.7	163.0	162.7
12	154.8	158.2	160.6	161.2	162.1	163.0	162.7	163.0	162.7	162.7
13	155.2	158.8	160.3	161.5	161.8	162.4	162.7	163.0	163.0	162.7
14	155.2	158.8	160.6	161.5	162.1	162.4	162.4	162.4	162.4	163.0
15	155.5	159.0	160.6	161.6	162.5	162.7	162.8	162.7	162.6	162.8
昭和 2	155.5	158.4	160.7	161.4	162.5	162.7	163.2	163.1	163.1	163.5
3	155.5	159.3	160.8	161.8	162.5	162.9	163.0	162.9	162.6	162.9
4	157.0	159.6	160.1	162.1	162.7	163.0	163.1	163.2	163.1	162.4
5	156.2	159.5	161.0	161.8	162.3	162.5	163.0	162.9	163.1	164.0
6	156.6	159.9	161.3	162.5	163.2	163.5	163.4	163.5	163.5	163.2
7	156.8	160.1	161.7	162.6	163.2	163.4	163.3	163.3	163.4	163.3
8	156.0	160.3	161.7	162.7	163.8	162.8	163.7	163.7	163.7	163.2
9	157.5	160.6	162.1	162.9	163.4	163.7	164.0	163.8	163.9	163.7
10	157.6	160.6	161.8	162.9	163.4	163.9	164.1	164.2	164.4	164.2
11	157.9	160.7	162.0	163.2	163.6	164.1	164.1	164.3	164.2	164.2
12	157.2	160.1	161.0	161.8	162.6	163.7	164.0	164.1	164.8	164.3
13	158.2	160.4	162.3	163.5	163.6	164.3	164.4	164.7	164.9	164.6
14	158.1	160.9	162.5	163.8	164.3	164.5	164.7	164.8	164.7	164.5

表 10 年次別、男女、年齢別 6・24 歳学徒の身長平均値

(1) 男(つづき)

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
昭和 23	106.1	112.1	117.4	121.9	126.1	130.4	135.0	139.8	146.0
24	108.6	113.5	118.1	122.4	126.6	130.6	135.6	140.7	146.7
25	108.6	113.6	118.4	122.9	127.1	131.1	136.0	141.2	147.3
26	109.1	114.1	118.9	123.4	127.7	131.8	136.2	142.2	148.4
27	109.3	114.2	119.2	123.9	128.3	132.5	137.4	142.9	148.8
28	109.5	114.8	119.7	124.2	128.7	133.1	137.9	143.5	149.9
29	110.0	115.1	120.1	124.7	129.1	133.6	138.5	144.4	150.6
30	110.3	115.6	120.3	125.1	129.6	133.9	139.2	145.3	151.7
31	110.6	115.8	120.8	125.4	130.0	134.5	139.5	145.8	152.3
32	110.7	116.0	121.0	125.8	130.1	135.0	140.2	146.3	153.0
33	110.9	116.2	121.4	126.1	130.7	135.1	140.8	147.1	153.6

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
昭 23	152.7	157.9	160.6	162.1	163.0	163.7	164.3	164.1	164.1	164.0
24	154.2	158.7	161.2	162.3	163.1	163.5	163.8	163.9	163.8	163.7
25	154.8	159.3	161.8	162.6	163.3	163.7	163.7	164.0	164.0	163.9
26	156.1	159.8	162.2	163.8	164.4	164.7	164.8	164.9	164.8	164.8
27	156.8	160.3	162.6	163.0	163.9	164.7	164.9	164.9	164.7	164.7
28	157.6	160.9	162.9	164.5	164.6	164.9	165.0	164.5	164.5	164.5
29	158.1	161.3	163.2	164.9	165.3	165.2	165.3	165.1	164.8	164.5
30	158.5	161.6	163.4	165.0	165.4	165.5	165.6	165.3	165.0	164.5
31	159.2	162.0	163.7	165.3	165.5	165.7	165.9	165.5	165.3	164.9
32	159.8	162.4	163.9	165.5	165.7	165.9	165.9	165.9	165.4	165.2
33	160.3	162.9	164.3	165.6	165.8	166.0	166.1	166.1	165.9	165.4

昭和 14 年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公私立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。昭和 23 年以降は文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第 15 号)の全国集計結果。

調査は、23 年から 25 年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26 年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園については、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも 4 月現在の平均値。

年齢は、4 月 1 日現在において満 6 年 1 日以上満 7 年に達するまでの者を 6 歳とし、その他の年齢もこれに準じている。

昭和 28 年以降の 18 歳以上の数字は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告昭和 33 年度」による。

表 10 年次別、男女、年齢（各歳）別 6 - 24 歳学徒の身長平均値
 (明治 33 年 - 昭和 33 年)

(2) 女

(mm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
明治 33	104.8	110.0	113.9	119.1	123.9	127.9	133.0	137.9	143.0	
34	105.8	110.3	114.2	118.5	123.6	128.5	133.6	139.1	142.7	
35	105.8	110.0	114.5	119.1	123.9	128.8	133.9	138.5	142.7	
36	105.8	110.3	114.5	118.8	123.6	128.2	133.9	139.1	143.3	
37	105.5	109.7	114.2	118.5	123.3	128.5	133.6	139.1	143.3	
38	105.2	109.7	113.9	118.8	123.9	128.2	133.9	138.8	143.6	
39	105.2	109.4	114.2	118.5	123.3	128.2	133.6	138.8	143.3	
40	105.5	109.7	114.2	118.5	123.3	128.2	133.9	139.1	143.6	
41	105.5	110.0	114.5	118.8	123.3	128.5	133.9	139.1	143.6	
42	105.5	110.0	113.9	118.8	123.3	127.9	133.9	139.4	143.6	
43	105.8	110.0	114.5	118.8	123.6	128.5	133.6	139.1	143.6	
44	105.5	110.3	114.8	119.1	123.6	128.5	134.8	139.7	143.9	
45	105.5	110.3	114.8	119.4	123.9	128.8	135.2	140.3	144.5	
大正 2	105.2	110.0	114.5	119.1	123.6	128.8	134.8	140.0	144.5	
3	105.2	110.0	114.5	119.1	123.6	128.8	134.8	140.0	144.5	
4	105.5	110.3	114.5	119.4	123.9	128.8	135.2	140.3	145.8	
5	105.5	110.3	114.8	119.4	123.9	129.1	135.2	140.6	145.8	
6	105.5	110.3	114.8	120.0	123.0	129.4	135.5	141.2	145.2	
7	105.8	110.0	114.8	119.7	124.2	129.1	135.5	141.5	144.8	
8	105.8	110.3	114.8	119.4	124.2	129.1	135.2	141.2	144.8	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
明治 33	144.8	146.1	147.0	147.0	147.0	147.9	147.9	147.9	147.9	146.1
34	145.8	146.4	146.4	147.0	147.0	148.2	148.2	147.9	147.0	150.6
35	145.5	146.7	147.6	147.3	147.6	147.9	147.9	148.5	147.0	150.0
36	145.8	146.7	147.6	147.9	147.0	147.3	147.9	149.4	148.8	148.2
37	146.1	147.3	147.9	147.9	148.5	148.2	148.2	147.5	147.9	147.0
38	146.4	147.9	147.9	147.9	148.2	150.0	147.9	148.8	148.2	151.2
39	146.7	147.3	147.6	147.6	148.5	148.8	149.4	148.8	150.3	147.9
40	146.4	147.9	148.5	148.5	147.9	149.7	149.4	149.1	148.8	149.1
41	146.7	147.9	149.1	149.1	148.8	148.8	149.4	149.4	149.4	148.8
42	146.7	147.3	148.5	148.2	148.5	149.1	148.8	148.5	149.7	151.5
43	147.0	148.2	148.8	148.5	148.2	149.1	149.1	149.4	149.1	147.9
44	146.7	148.5	149.1	148.8	149.1	148.8	149.4	149.4	150.0	149.1
45	147.3	148.2	148.5	148.8	148.8	149.4	149.7	149.7	150.0	148.5
大正 2	147.0	148.2	148.5	148.8	149.4	149.4	150.3	150.0	150.3	148.2
3	147.6	148.5	149.1	149.1	149.7	150.0	150.9	150.9	150.0	149.1
4	147.6	148.5	149.1	149.4	149.4	149.4	150.6	150.0	150.6	149.7
5	147.6	148.8	149.1	149.4	149.4	150.3	150.3	150.0	149.4	150.6
6	147.9	149.1	149.1	149.7	149.7	150.0	150.3	149.1	153.3	148.5
7	147.9	149.1	149.4	150.0	149.7	149.7	149.1	151.2	152.1	149.7
8	148.5	149.1	149.4	150.0	150.6	150.0	150.6	150.0	150.6	150.0

表 10. 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の身長平均値

(2) 女(つづき)

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
大正 9	105.8	110.3	115.2	119.7	124.2	129.7	136.1	141.5	146.4
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	105.8	110.6	115.5	120.0	124.5	130.0	131.1	141.2	145.5
12	106.1	110.6	115.5	120.3	125.2	130.0	136.7	140.9	146.4
13	106.1	110.9	115.8	120.6	125.2	130.3	137.6	142.7	146.7
14	106.1	110.9	116.1	120.3	125.2	130.6	137.3	142.7	146.7
15	106.2	111.1	115.8	120.5	125.2	130.6	137.6	142.8	147.5
昭和 2	106.9	111.3	116.3	120.9	125.7	131.1	138.0	143.3	147.1
3	106.7	111.7	116.4	121.1	125.7	131.1	138.2	143.4	147.3
4	106.8	111.7	116.5	121.2	125.8	131.2	138.2	143.5	147.5
5	106.9	111.9	116.7	121.3	126.0	131.3	138.4	143.5	147.7
6	107.1	112.1	116.9	121.5	126.3	131.7	138.7	143.6	147.9
7	107.3	112.4	117.3	121.8	126.5	131.9	138.7	144.0	148.0
8	107.6	112.4	117.3	121.9	126.6	132.1	139.5	144.1	148.2
9	107.7	112.7	117.5	122.3	127.0	132.3	139.4	144.6	148.6
10	108.0	112.9	117.8	122.5	127.3	132.7	139.5	144.8	148.7
11	108.0	113.0	117.9	122.6	127.4	132.8	139.7	144.7	148.9
12	107.9	112.9	118.0	122.7	128.1	132.8	139.7	143.8	148.4
13	107.9	112.8	117.8	122.4	127.8	133.2	139.2	143.8	148.3
14	108.1	112.9	117.7	123.0	127.7	132.7	138.8	144.0	148.7

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正 9	1482	1491	1497	1503	1509	1509	1506	1512	1503	1485
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1482	1491	1491	1497	1500	1509	1503	1497	1533	1515
12	1488	1494	1497	1500	1503	1503	1506	1485	1491	1485
13	1488	1494	1500	1503	1503	1509	1509	1488	1488	1494
14	1482	1497	1503	1509	1509	1515	1515	1512	1500	1518
15	1490	1496	1503	1505	1507	1511	1506	1517	1500	1491
昭和 2	1489	1498	1506	1502	1511	1508	1511	1497	1502	1504
3	1494	1503	1506	1508	1517	1522	1518	1514	1503	1509
4	1495	1508	1506	1507	1503	1512	1513	1506	1513	1524
5	1496	1506	1507	1512	1510	1505	1511	1511	1501	1492
6	1497	1507	1512	1514	1515	1518	1518	1506	1498	1513
7	1499	1509	1512	1514	1512	1523	1518	1515	1510	1523
8	1501	1509	1511	1516	1518	1522	1520	1518	1515	1531
9	1503	1512	1512	1517	1516	1517	1531	1522	1506	1516
10	1507	1516	1512	1520	1522	1525	1522	1515	1520	1532
11	1506	1516	1518	1522	1527	1523	1524	1525	1512	1524
12	1502	1510	1509	1516	1512	1523	1522	1534	1538	1516
13	1502	1513	1526	1527	1529	1530	1526	1527	1528	1509
14	1507	1521	1525	1530	1541	1527	1525	1518	1526	1525

表 10. 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の身長平均値

(2) 女(つづき)

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
昭和 23	107.3	111.9	116.4	121.1	125.7	130.8	136.1	141.1	145.6
24	107.7	112.7	117.3	121.8	126.2	131.0	136.8	141.8	146.0
25	107.8	112.8	117.6	122.1	126.6	131.7	137.3	142.5	146.6
26	108.8	113.0	118.0	122.7	127.3	132.4	138.2	143.3	147.3
27	108.6	113.6	118.3	123.3	128.0	133.1	138.4	143.8	147.7
28	108.6	114.0	118.8	123.5	128.3	133.6	139.4	144.2	148.0
29	109.1	114.1	119.2	124.0	128.9	134.5	140.2	145.0	148.3
30	109.3	114.6	119.4	124.5	129.5	134.9	141.0	145.7	148.9
31	109.6	114.7	119.9	124.7	130.1	135.8	141.6	146.1	149.3
32	109.7	115.0	120.1	125.2	130.2	136.3	142.2	146.6	149.6
33	109.9	115.2	120.4	125.5	131.0	136.6	142.8	147.1	149.9

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
昭和 23	149.1	151.3	152.1	152.8	153.4	154.0	153.7	153.3	152.4	153.5
24	149.8	151.5	152.3	152.8	153.2	153.6	153.7	154.4	154.5	153.8
25	150.2	151.8	152.7	152.7	153.4	153.7	153.3	153.4	153.0	152.5
26	151.0	151.9	152.5	153.2	153.6	153.8	153.9	153.8	154.3	153.9
27	151.1	152.1	152.8	152.9	153.4	153.7	154.0	154.0	153.5	153.2
28	151.3	152.3	153.0	153.8	153.8	153.8	153.9	153.9	153.6	153.8
29	151.5	152.4	153.0	154.0	154.1	154.1	154.2	153.9	153.6	153.2
30	151.7	152.6	153.2	154.2	154.3	154.3	154.3	154.1	154.1	153.7
31	151.9	152.7	153.2	154.3	154.4	154.5	154.6	154.6	154.5	154.3
32	152.1	152.8	153.3	154.4	154.6	154.6	154.6	154.4	154.2	154.1
33	152.3	153.1	153.5	154.4	154.6	154.6	154.6	154.6	154.5	154.3

昭和 14 年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公私立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。昭和 23 年以降は、文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第 15 号)の全国集計結果。調査は 23 年から 25 年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26 年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園については、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも 4 月現在の平均値。

年齢は、4 月 1 日現在において満 6 年 1 日以上満 7 年に達するまでの者を 6 歳とし、その他の年齢もこれに準じている。昭和 28 年以降の 18 歳以上の数字は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書昭和 33 年度」による。

表 11 年次別、男女、年齢（各歳）別 6 - 24 歳学徒の体重平均値
（明治 33 年 - 昭和 33 年）

(1) 男

(Kg)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
明治 33	1.7.0	2.0.0	2.1.0	2.3.0	2.5.0	2.7.0	2.9.0	3.3.0	3.8.0	
34	1.7.5	1.9.0	2.1.0	2.3.9	2.5.3	2.7.2	3.0.1	3.3.8	3.9.1	
35	1.7.6	1.9.0	2.1.0	2.3.0	2.5.0	2.7.1	2.9.8	3.3.3	3.8.0	
36	1.7.5	1.9.4	2.0.9	2.2.8	2.5.0	2.7.0	2.9.8	3.3.6	3.8.5	
37	1.7.4	1.8.9	2.0.7	2.2.7	2.4.8	2.7.0	2.9.7	3.3.5	3.8.5	
38	1.7.5	1.9.0	2.0.8	2.2.7	2.4.7	2.6.9	2.9.6	3.3.4	3.8.6	
39	1.7.6	1.9.1	2.1.1	2.2.8	2.5.0	2.7.0	2.9.7	3.3.7	3.8.6	
40	1.7.4	1.9.0	2.0.9	2.2.9	2.4.7	2.7.0	2.9.8	3.3.6	3.9.0	
41	1.7.5	1.9.2	2.0.9	2.2.8	2.5.1	2.7.1	2.9.9	3.3.6	3.8.7	
42	1.7.6	1.9.2	2.1.0	2.2.9	2.4.5	2.7.0	2.9.9	3.3.4	3.8.5	
43	1.7.5	1.9.2	2.1.1	2.2.9	2.4.9	2.7.1	2.9.8	3.3.5	3.8.6	
44	1.7.6	1.9.2	2.0.8	2.3.0	2.4.7	2.7.1	2.7.8	3.3.8	3.8.8	
45	1.7.6	1.9.3	2.1.0	2.3.0	2.5.0	2.7.1	3.0.3	3.4.1	3.9.2	
大正 2	1.7.5	1.9.1	2.0.9	2.2.9	2.4.9	2.7.1	2.9.7	3.3.9	3.9.0	
3	1.7.5	1.9.2	2.1.0	2.2.9	2.5.0	2.7.1	3.0.1	3.3.7	3.8.9	
4	1.7.5	1.9.2	2.1.1	2.3.1	2.5.0	2.7.3	3.0.3	3.4.0	3.9.1	
5	1.7.6	1.9.3	2.1.2	2.3.2	2.5.1	2.7.5	3.0.3	3.4.1	3.9.4	
6	1.7.6	1.9.4	2.1.1	2.3.7	2.5.2	2.8.0	3.0.5	3.4.4	3.9.8	
7	1.7.5	1.9.3	2.1.1	2.3.2	2.5.2	2.7.5	3.0.5	3.4.6	4.0.7	
8	1.7.5	1.9.3	2.1.2	2.3.1	2.5.1	2.7.6	3.0.2	3.4.1	3.9.6	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
明治 33	4.3.0	4.7.0	5.0.0	5.2.0	5.3.0	5.4.0	5.3.0	5.3.0	5.3.0	5.2.0
34	4.3.6	4.7.7	4.9.8	5.2.2	5.3.0	5.3.8	5.4.7	5.4.7	5.2.8	5.2.4
35	4.2.8	4.7.7	4.9.7	5.2.2	5.3.3	5.3.9	5.3.9	5.4.0	5.4.2	5.2.9
36	4.3.4	4.7.6	5.0.6	5.1.9	5.3.7	5.3.8	5.3.8	5.3.7	5.2.9	5.3.0
37	4.2.5	4.7.5	5.0.3	5.2.0	5.3.1	5.3.6	5.3.8	5.3.4	5.3.2	5.2.7
38	4.3.6	4.7.9	5.0.3	5.2.3	5.3.4	5.3.9	5.3.9	5.3.8	5.3.6	5.3.4
39	4.3.6	4.7.8	4.9.2	5.1.9	5.3.7	5.4.1	5.4.5	5.3.8	5.3.7	5.3.5
40	4.4.0	4.7.9	5.0.5	5.2.4	5.3.6	5.3.6	5.4.1	5.4.0	5.3.9	5.3.7
41	4.4.1	4.8.0	5.0.7	5.2.5	5.3.4	5.3.1	5.4.1	5.4.2	5.3.8	5.3.6
42	4.4.0	4.8.3	5.0.9	5.2.4	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.1	5.4.0	5.4.0
43	4.4.6	4.8.5	5.1.4	5.2.7	5.3.6	5.4.3	5.4.5	5.4.4	5.4.5	5.4.0
44	4.4.3	4.8.3	5.0.9	5.2.6	5.3.6	5.4.1	5.4.5	5.4.2	5.3.9	5.4.0
45	4.4.6	4.8.5	5.0.9	5.2.8	5.3.9	5.4.2	5.4.3	5.3.8	5.4.0	5.4.0
大正 2	4.4.6	4.8.7	5.1.1	5.2.8	5.3.8	5.3.8	5.4.2	5.4.3	5.4.1	5.4.4
3	4.4.7	4.8.8	5.1.3	5.3.1	5.4.0	5.4.4	5.4.4	5.4.5	5.4.2	5.4.3
4	4.5.1	4.8.9	5.1.7	5.3.3	5.4.2	5.4.2	5.3.9	5.4.7	5.4.4	5.4.3
5	4.5.8	4.9.2	5.1.8	5.3.3	5.4.5	5.4.8	5.4.6	5.4.6	5.4.5	5.4.2
6	4.4.5	5.0.5	5.1.5	5.3.3	5.4.2	5.4.8	5.4.9	5.5.4	5.4.7	5.3.5
7	4.5.2	4.9.2	5.1.9	5.3.4	5.4.3	5.4.7	5.4.8	5.4.9	5.4.3	5.4.3
8	4.5.6	4.9.1	5.1.5	5.3.1	5.3.9	5.4.3	5.4.4	5.4.3	5.4.4	5.4.2

表 11 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の体重平均値

(1) 男(つづき)		(kg)								
年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
大正	9	17.6	19.4	21.2	23.2	25.3	27.5	30.5	34.6	39.9
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	17.6	19.4	21.3	23.4	25.4	27.7	30.6	34.8	40.1
	12	17.7	19.5	21.5	23.5	25.6	28.0	30.9	35.2	40.6
	13	17.7	19.5	21.4	23.5	25.6	27.9	31.1	35.3	41.0
昭和	14	17.7	19.6	21.6	24.1	25.7	28.1	31.7	35.2	40.9
	15	17.7	19.6	21.6	23.6	25.7	27.7	31.7	35.6	41.5
	2	17.8	19.6	21.7	23.7	26.0	28.3	31.7	36.3	41.4
	3	17.8	19.7	21.6	23.7	25.9	28.3	31.7	36.1	41.6
	4	17.9	19.7	21.8	23.7	26.0	28.2	31.8	36.2	41.9
	5	17.9	19.8	21.8	23.8	25.9	28.4	31.8	36.2	42.0
	6	17.9	19.7	21.8	23.9	26.0	28.5	31.9	36.4	42.5
	7	18.0	19.8	21.9	24.0	26.1	28.6	32.2	36.7	42.7
	8	18.1	19.9	21.9	24.0	26.2	28.7	32.5	36.7	42.9
	9	18.2	20.1	22.1	24.1	26.4	28.9	32.5	37.2	43.4
	10	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	28.8	32.6	37.1	43.4
	11	18.1	20.0	22.1	24.3	26.5	29.0	32.5	37.2	43.5
	12	18.2	20.0	22.1	24.3	26.5	29.0	32.2	36.5	43.0
	13	18.5	20.1	22.3	24.5	26.8	29.2	32.5	37.0	43.7
14	18.5	20.3	22.5	24.6	26.9	29.3	32.5	36.9	43.6	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正	9	45.2	49.1	51.8	53.4	54.1	54.4	54.5	54.3	54.6
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	45.2	49.3	51.7	53.4	54.2	54.4	54.5	54.5	55.0
	12	45.6	49.5	52.1	53.6	54.4	54.7	54.9	55.3	54.9
	13	46.2	49.8	52.2	53.5	54.1	54.6	54.8	54.8	54.9
昭和	14	46.3	49.8	52.4	54.0	54.3	54.8	54.9	54.8	54.7
	15	46.6	50.2	52.5	53.9	54.5	54.6	54.9	54.2	54.8
	2	46.8	50.0	52.5	54.0	54.9	55.1	54.8	55.5	55.2
	3	46.8	50.3	52.7	54.0	54.8	55.4	55.0	55.9	55.6
	4	47.1	50.6	52.8	54.3	54.9	55.3	55.9	55.5	55.3
	5	47.1	50.6	53.0	54.3	54.8	54.8	54.7	54.8	54.9
	6	47.4	51.0	53.2	54.5	55.1	55.2	55.2	55.4	55.7
	7	47.6	51.2	53.3	54.8	55.4	55.4	55.4	55.2	55.4
	8	48.3	51.4	53.3	54.8	55.3	55.7	55.4	55.2	55.3
	9	48.4	51.9	53.8	55.1	55.9	55.8	55.7	55.6	55.4
	10	48.3	51.7	53.7	55.0	55.5	55.7	55.7	55.7	55.5
	11	48.5	51.7	53.6	55.1	55.6	55.5	55.8	55.8	55.5
	12	48.4	51.5	53.1	54.6	55.5	55.6	55.6	55.7	56.0
	13	48.5	52.3	54.5	55.4	55.7	56.2	56.2	56.0	56.4
14	48.6	51.8	53.9	55.2	55.6	55.7	57.3	55.7	55.7	

11 年次別、男女、年齢別6-24歳学徒の体重平均値

(1) 男(つづき)

(kg)

年次	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
昭和23	18.4	20.1	22.0	24.0	26.0	28.2	31.4	34.5	38.9	
24	18.5	20.3	22.3	24.2	26.3	28.5	31.4	34.8	39.3	
25	18.5	20.4	22.4	24.4	26.4	28.7	31.5	35.1	39.7	
26	18.5	20.5	22.5	24.6	26.7	28.8	32.0	35.6	40.7	
27	18.6	20.6	22.6	24.7	26.9	29.2	32.0	36.1	41.1	
28	18.6	20.6	22.8	24.8	27.1	29.5	32.5	36.5	41.6	
29	18.6	20.5	22.7	24.8	27.0	29.5	32.8	36.9	41.9	
30	18.7	20.6	22.7	25.0	27.3	29.7	33.2	37.6	42.7	
31	18.8	20.7	22.8	25.0	27.4	30.0	33.5	38.1	43.5	
32	18.8	20.8	22.8	25.0	27.4	30.2	33.8	38.5	43.8	
33	18.9	20.9	23.1	25.3	27.6	30.2	34.0	38.8	44.2	
年次	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳
昭和23	44.0	48.7	51.7	53.4	54.7	55.3	55.7	55.9	55.9	55.8
24	45.4	49.6	52.4	53.8	54.6	55.0	55.3	55.6	55.6	55.5
25	45.7	49.9	52.6	53.9	54.6	55.0	55.3	55.5	55.5	55.7
26	47.0	50.7	53.4	54.7	55.2	55.1	55.4	55.4	55.6	55.8
27	47.4	51.0	53.6	54.5	55.0	55.3	55.4	55.3	55.3	55.2
28	48.1	51.6	54.0	55.1	55.3	55.6	55.7	55.5	55.8	55.7
29	48.2	51.7	54.0	55.0	55.5	55.5	55.7	55.6	55.5	55.4
30	48.8	52.2	54.5	55.4	55.8	56.0	55.9	55.9	55.8	55.5
31	49.7	52.9	55.1	56.0	56.2	56.4	56.6	56.4	56.2	56.0
32	50.1	53.3	55.3	56.3	56.5	56.6	56.5	56.9	56.2	56.1
33	50.4	53.6	55.7	56.6	56.6	56.7	56.9	56.7	56.7	56.4

昭和14年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公私立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。昭和23年以降は文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第15号)の全国集計結果。

調査は23年から25年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園については、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも4月現在の平均値。

年齢は、4月1日現在において満6年1日以上満7年に達するまでの者を6歳とし、その他の年齢もこれに準じている。

昭和28年以降の18歳以上の数字は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書昭和33年度」による。

表 11 年次別、男女、年齢（各歳）別 6 - 24 歳学徒の
体重平均値（明治 33 年 - 昭和 33 年）

(2) 女

(kg)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
明治 33	17.0	19.0	20.0	22.0	25.0	27.0	30.0	33.0	39.0	
34	16.9	18.5	20.3	22.2	24.6	27.2	30.5	34.5	39.8	
35	16.9	18.4	20.2	22.3	24.4	27.1	30.4	34.1	38.4	
36	16.9	18.4	20.2	22.2	24.2	26.6	30.4	34.3	38.5	
37	16.7	18.0	19.9	21.9	24.1	26.7	30.0	34.2	38.8	
38	16.8	18.2	20.0	21.9	24.0	26.6	29.8	34.2	38.6	
39	16.7	18.4	20.0	21.9	24.5	26.8	30.3	34.1	38.3	
40	16.8	18.4	20.1	21.9	24.2	26.8	30.5	34.3	38.2	
41	16.8	18.1	20.1	22.1	24.0	26.9	30.4	34.4	38.6	
42	16.9	18.4	20.3	22.1	24.2	26.7	30.1	34.4	38.6	
43	17.0	18.4	20.3	22.2	24.3	27.0	31.2	34.2	38.9	
44	17.1	18.5	20.3	22.2	24.4	27.0	30.6	34.5	38.6	
45	16.9	18.5	20.1	22.2	24.4	27.2	30.9	35.3	39.3	
大正 2	16.8	18.4	20.1	22.2	24.3	27.0	30.7	35.2	39.3	
3	16.9	18.4	20.2	22.2	24.4	27.1	30.8	35.1	39.4	
4	17.1	18.5	19.7	22.3	24.5	27.2	31.0	35.4	39.8	
5	17.0	18.6	20.4	22.4	24.6	27.4	31.2	35.6	39.9	
6	16.6	18.5	20.0	21.9	24.3	27.3	31.5	36.1	40.2	
7	17.0	18.5	20.3	22.3	24.6	27.2	31.4	35.9	40.2	
8	16.9	18.5	20.3	22.2	24.4	27.2	31.0	35.6	39.9	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
明治 33	42.0	45.0	47.0	47.0	49.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.0
34	42.5	44.8	46.2	47.2	47.4	49.3	46.4	45.1	47.3	46.1
35	42.1	44.4	46.4	47.3	47.5	51.5	48.0	48.5	46.7	48.8
36	42.3	44.4	46.2	47.0	47.2	47.3	46.4	48.8	47.4	45.8
37	43.3	44.8	46.7	47.9	48.1	47.6	48.5	46.7	47.5	46.3
38	42.6	44.8	46.7	46.9	48.3	48.6	47.4	47.6	48.4	50.8
39	42.5	45.5	46.9	48.1	48.4	47.8	48.8	47.5	48.0	46.1
40	42.5	45.0	46.7	48.0	48.4	47.1	47.7	46.6	47.9	45.0
41	42.3	45.1	46.8	47.7	48.3	48.5	47.6	47.2	48.0	47.6
42	42.4	45.0	47.0	47.3	48.1	49.0	47.5	47.1	47.6	46.3
43	42.9	45.1	46.8	47.8	48.4	48.3	48.6	47.7	46.6	46.6
44	42.6	45.0	46.2	48.0	48.7	48.7	48.3	48.1	48.2	47.6
45	43.2	45.2	47.0	48.2	49.1	48.7	48.8	48.5	47.9	47.1
大正 2	42.9	45.1	46.3	48.0	48.7	48.6	49.4	48.9	48.4	50.5
3	43.2	45.4	47.1	48.2	48.9	49.3	49.1	49.2	48.3	48.4
4	43.2	45.4	47.1	48.8	49.3	49.0	49.0	49.3	47.7	46.5
5	43.1	45.5	47.3	48.5	48.8	50.1	48.8	48.9	47.6	47.9
6	42.8	45.7	47.7	48.7	49.4	49.3	49.5	48.0	50.3	46.7
7	44.0	45.5	47.3	48.6	50.2	49.7	48.8	49.5	49.4	50.9
8	43.3	45.3	47.0	48.4	49.1	48.9	48.7	47.9	48.3	47.3

表 11 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の体重平均値

(2) 女(つづき)

(kg)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
大正 9	17.0	18.6	20.0	22.4	24.6	27.4	31.3	35.7	40.1	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	17.0	18.7	20.6	22.5	24.7	27.5	31.4	36.1	40.3	
12	17.1	18.8	20.7	22.7	25.0	27.8	32.1	36.7	41.2	
13	17.1	18.9	20.7	22.7	25.0	27.9	31.9	36.9	41.0	
14	17.3	18.9	20.7	22.8	25.0	27.9	32.1	36.8	40.8	
15	17.2	18.8	20.8	23.0	25.0	28.1	32.3	37.2	41.5	
昭和 2	17.2	18.9	20.8	23.0	25.2	28.3	32.6	37.5	41.7	
3	17.2	19.4	20.8	22.9	25.3	28.3	32.9	37.9	41.8	
4	17.3	18.9	20.9	23.0	25.4	28.5	33.1	37.9	42.1	
5	17.3	19.0	20.9	23.0	25.4	28.5	33.2	37.7	42.1	
6	17.2	19.0	21.0	23.2	25.6	28.6	33.4	38.0	42.4	
7	17.4	19.1	21.1	23.2	25.6	28.8	33.6	38.3	42.7	
8	17.4	19.2	21.2	23.3	25.8	28.9	33.9	38.5	42.7	
9	17.5	19.3	21.4	23.5	26.0	29.1	33.9	38.8	43.1	
10	17.5	19.3	21.4	23.5	26.0	29.2	33.9	38.7	43.2	
11	17.6	19.4	21.4	23.5	26.0	29.2	34.0	38.7	43.2	
12	17.6	19.4	21.4	23.6	26.1	29.4	33.7	38.3	43.2	
13	17.9	19.5	21.6	23.7	26.0	29.5	32.9	38.2	42.8	
14	17.7	19.4	21.7	23.7	26.5	29.5	33.7	38.2	43.3	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正 9	43.4	45.8	47.4	48.9	49.4	49.3	48.8	48.9	47.5	45.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	43.7	45.5	47.3	48.9	49.7	48.9	48.8	50.6	51.7	54.2
12	44.2	46.2	47.5	49.0	49.3	50.3	49.2	48.7	49.0	51.4
13	43.9	46.1	47.6	48.3	49.0	49.0	49.0	48.3	47.2	47.0
14	43.8	46.4	47.3	48.5	48.8	48.4	48.4	48.7	48.2	47.1
15	44.4	46.5	48.0	48.9	48.8	48.6	48.0	49.1	48.3	46.4
昭和 2	44.8	46.7	48.5	48.8	49.2	48.6	48.7	48.8	47.3	48.8
3	44.9	46.6	48.1	49.2	49.0	48.7	48.5	48.9	48.1	47.8
4	45.0	46.8	48.5	49.3	48.0	49.0	49.0	48.0	48.7	50.9
5	45.0	46.7	48.1	49.3	49.0	48.9	48.6	48.3	48.7	48.0
6	45.2	46.9	48.4	49.3	49.1	49.0	49.0	48.4	47.9	48.1
7	45.5	47.2	48.6	49.6	49.1	49.2	49.1	48.2	48.2	47.8
8	44.8	47.3	48.4	49.6	49.6	49.2	49.0	48.7	48.5	49.5
9	45.8	47.8	48.9	49.8	49.7	50.6	49.6	48.3	47.8	47.9
10	45.9	47.4	48.5	49.6	49.6	49.5	48.7	48.4	48.8	50.3
11	45.8	47.3	48.9	49.7	50.1	49.8	49.7	50.5	48.3	49.0
12	45.6	47.2	48.5	49.4	49.3	49.5	48.9	48.6	49.3	47.8
13	45.7	47.4	49.1	50.1	49.7	49.7	49.6	48.9	48.8	47.9
14	45.0	47.5	48.8	50.0	49.7	49.6	49.3	49.1	49.6	48.3

表11 年次別、男女、年齢別6-24歳学徒の体重平均値

(2) 女(つづき)

(kg)

年次	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
昭和23	17.9	19.5	21.3	23.4	25.6	28.2	32.2	35.9	40.1
24	17.9	19.7	21.5	23.6	25.8	28.6	32.4	36.5	40.8
25	17.9	19.8	21.8	23.8	26.0	28.8	32.6	36.9	41.2
26	18.0	19.8	21.9	24.0	26.2	29.2	33.3	37.7	41.9
27	18.1	20.0	22.0	24.1	26.6	29.6	33.5	38.0	42.1
28	18.0	20.1	22.1	24.3	26.8	29.9	34.1	38.3	42.5
29	18.1	19.9	22.1	24.3	26.8	30.1	34.4	38.7	42.6
30	18.1	20.0	22.1	24.5	27.1	30.5	34.9	39.4	43.2
31	18.2	20.1	22.3	24.6	27.5	31.1	35.6	40.2	44.1
32	18.2	20.2	22.4	24.7	27.4	31.3	36.0	40.4	44.3
33	18.4	20.3	22.5	24.9	27.7	31.3	36.4	40.9	44.6

年次	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳
昭和23	43.9	47.2	49.1	50.5	51.2	51.4	51.4	51.1	51.0	50.5
24	45.0	47.6	49.2	50.3	51.0	51.1	51.2	51.3	51.2	50.6
25	45.2	47.7	49.1	49.8	50.5	50.7	50.6	50.6	50.2	50.3
26	45.9	48.1	49.4	49.7	50.0	50.0	50.4	49.7	50.7	50.2
27	46.0	48.3	49.6	49.5	49.8	49.8	49.6	49.7	49.2	48.6
28	46.3	48.4	49.5	49.7	49.9	49.6	49.6	49.4	49.6	49.2
29	46.2	48.3	49.4	49.4	49.7	49.6	49.2	49.3	48.6	49.0
30	46.8	48.7	49.8	49.8	50.2	49.9	49.5	49.4	49.4	49.2
31	47.3	49.1	50.2	49.9	50.3	50.2	49.8	49.6	49.7	49.2
32	47.3	49.1	50.1	50.0	50.2	50.2	49.8	49.4	49.2	49.2
33	47.6	49.4	50.3	49.8	50.3	50.0	49.8	49.6	49.3	49.3

昭和14年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。昭和23年以降は文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第15号)の全国集計結果。

調査は、23年から25年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園について、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも4月現在の平均値。

年齢は、4月1日現在において満6年1日以上満7年に達するまでの者を6歳とし、その他の年齢もこれに準じている。

昭和28年以降の18歳以上の数字は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書昭和33年度」による。

表 1 2 年次別、男女、年齢（各歳）別 6 - 24 歳学徒の
胸囲平均値（明治 33 年 - 昭和 33 年）

(1) 男

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
明治 33	53.9	56.1	57.9	60.0	60.9	63.0	64.8	67.0	70.9	
34	53.9	55.8	57.9	59.7	61.5	63.3	65.2	67.6	71.2	
35	54.2	56.1	57.0	59.7	61.5	63.3	65.2	67.6	70.6	
36	53.9	55.8	57.9	59.7	61.5	63.3	65.5	67.9	70.9	
37	54.2	55.8	57.6	59.4	61.2	63.0	65.2	67.6	71.2	
38	53.9	55.8	57.6	59.7	61.5	63.0	64.8	67.6	70.9	
39	53.6	56.1	57.6	59.7	61.5	63.0	65.5	67.9	70.6	
40	53.9	55.5	57.6	59.4	61.5	63.3	65.2	67.9	70.6	
41	54.2	56.1	57.9	59.4	61.2	63.0	65.5	67.9	71.2	
42	54.2	56.1	57.6	59.1	61.2	63.0	66.1	67.6	70.3	
43	54.2	56.1	57.9	59.7	61.5	63.3	65.5	68.2	71.2	
44	53.9	55.8	57.9	59.7	61.5	63.0	65.5	67.9	71.2	
45	53.9	56.1	57.6	59.7	61.5	63.3	65.5	68.2	71.5	
大正 2	53.9	56.1	57.9	60.0	61.8	63.6	65.8	68.5	71.5	
3	54.2	56.4	57.9	60.0	61.8	63.6	65.8	68.5	71.2	
4	54.2	56.1	58.2	60.0	61.8	63.9	66.1	68.5	71.5	
5	54.2	56.4	58.2	60.3	62.1	63.9	66.4	68.8	71.8	
6	54.5	56.4	58.2	60.3	62.1	63.9	66.4	68.8	72.1	
7	54.2	56.4	58.2	60.0	62.1	63.9	65.8	68.5	71.8	
8	54.2	56.1	58.2	60.0	62.1	63.9	66.1	68.5	71.8	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
明治 33	73.9	77.0	77.9	80.0	80.9	80.9	80.9	82.1	80.9	80.9
34	73.9	77.0	78.8	80.3	81.2	81.8	81.5	81.5	81.5	80.0
35	74.2	77.0	79.4	80.6	81.5	81.8	81.5	81.5	79.1	80.6
36	74.2	76.7	79.1	80.6	81.5	81.8	81.5	81.5	80.9	81.2
37	74.2	77.0	79.1	80.6	81.2	81.8	81.2	81.2	80.9	80.9
38	73.9	77.3	79.4	80.6	81.5	81.5	81.5	81.8	80.9	80.9
39	74.5	77.3	79.4	80.6	80.6	81.8	82.1	82.1	81.5	80.9
40	74.2	77.0	78.8	80.0	81.5	81.2	81.8	81.5	81.2	81.5
41	74.5	77.3	79.1	80.6	81.5	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
42	74.2	77.0	79.1	80.6	81.5	82.1	82.1	82.1	82.1	81.8
43	74.8	77.6	79.1	80.3	81.2	81.8	81.8	81.8	81.5	82.1
44	74.8	77.3	79.4	80.6	81.2	81.8	82.4	81.8	83.1	81.5
45	74.8	77.9	79.7	80.9	81.8	81.8	82.4	82.4	82.1	82.4
大正 2	74.8	77.6	79.4	80.9	81.8	82.4	82.7	82.4	82.1	82.4
3	74.8	77.9	79.7	81.2	82.1	82.4	82.7	82.7	83.0	82.4
4	75.2	78.2	80.0	81.5	82.1	82.7	82.7	82.7	82.4	82.1
5	75.5	78.2	80.3	81.5	82.4	82.7	83.0	82.7	82.4	82.4
6	75.8	78.5	80.3	81.5	82.1	82.4	82.7	83.3	82.4	82.4
7	75.5	78.2	80.3	81.5	82.4	82.4	82.7	83.0	82.7	82.7
8	75.8	78.2	80.0	81.5	82.1	82.4	82.4	82.4	82.4	82.1

表 1 2 年次別、男女、年齢別 6 - 2 4 歳学徒の胸囲平均値

(1) 男(つづき)

(cm)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	
大正 9	54.2	56.4	58.5	60.3	61.8	63.9	65.8	68.5	72.1	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	54.5	56.4	58.5	60.3	62.1	64.2	66.1	69.1	72.7	
12	54.5	56.4	58.5	60.6	62.1	64.2	66.1	69.1	72.7	
13	54.5	56.7	58.2	60.3	62.1	64.2	66.4	69.7	73.0	
14	54.2	56.4	58.5	60.3	62.1	64.2	66.4	69.1	72.7	
15	54.4	56.3	58.2	60.4	62.1	64.3	66.2	69.2	73.2	
昭和 2	54.1	56.1	58.1	60.1	61.9	64.0	66.2	69.4	72.7	
3	54.3	56.3	58.2	60.2	62.1	64.1	66.0	69.2	72.9	
4	54.3	56.4	58.3	60.2	62.1	64.1	66.2	69.3	73.3	
5	54.4	56.4	58.4	60.3	62.1	64.1	66.2	69.4	73.3	
6	54.4	56.4	58.3	60.2	62.1	64.2	66.3	69.5	73.5	
7	54.5	56.5	58.4	60.3	62.2	64.2	66.4	69.8	73.8	
8	54.5	56.5	58.4	60.3	62.3	64.2	66.4	70.2	74.5	
9	54.7	56.7	58.6	60.5	62.3	64.4	66.8	70.2	74.7	
10	54.7	56.7	58.6	60.5	62.5	64.5	66.8	70.2	74.6	
11	54.8	56.8	58.6	60.6	62.4	64.5	66.9	70.2	74.5	
12	54.8	56.8	58.7	60.6	62.5	64.5	66.9	70.0	74.5	
13	54.6	56.8	58.7	60.9	62.9	65.0	67.3	70.9	74.4	
14	55.1	56.9	58.9	60.7	62.8	64.8	67.2	70.6	74.6	
年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正 9	75.5	78.2	80.3	81.1	82.4	82.4	83.0	82.7	82.4	83.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	76.1	79.1	80.9	82.1	82.4	82.7	82.7	83.0	83.0	83.3
12	76.7	79.4	80.9	82.1	82.7	83.0	83.0	83.3	83.3	83.3
13	76.7	79.1	80.6	82.4	82.7	83.0	83.3	83.3	83.3	83.9
14	76.7	79.1	81.2	82.1	83.3	83.0	83.3	83.6	83.6	83.9
15	76.3	79.5	81.3	82.2	82.7	83.1	83.3	83.9	83.6	83.3
昭和 2	76.5	79.0	80.9	82.0	82.7	82.9	83.4	83.5	83.4	83.3
3	76.5	79.1	80.9	82.2	82.6	83.0	83.1	83.2	83.1	83.2
4	76.7	79.3	81.2	82.3	82.9	83.3	83.3	83.6	83.6	83.7
5	76.8	79.5	81.2	82.4	82.9	83.1	83.2	83.6	83.5	83.6
6	77.1	79.7	81.4	82.6	83.0	83.2	83.4	83.6	83.8	83.9
7	77.3	80.0	80.9	82.7	83.4	83.4	83.5	83.7	83.8	83.9
8	77.3	80.3	81.7	82.9	83.0	83.7	83.6	83.5	83.8	84.0
9	78.0	80.8	82.2	83.3	83.9	83.7	83.8	83.9	83.9	84.6
10	78.1	80.8	82.3	83.3	83.8	83.9	83.7	83.7	83.8	83.8
11	78.1	80.7	82.2	83.0	83.9	84.0	84.0	84.1	84.0	84.4
12	78.1	80.7	82.4	83.4	84.2	83.7	83.5	83.7	83.8	83.8
13	78.4	81.0	82.8	83.5	84.0	83.9	84.2	84.2	84.4	84.4
14	78.0	80.8	82.4	83.6	84.0	84.0	84.0	84.1	84.0	84.0

表 12 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の胸囲平均値

(1) 男(つづき)

(kg)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
昭和 23	56.1	57.9	59.5	61.3	62.9	64.6	66.9	69.1	72.4
24	56.3	58.2	60.0	61.7	63.4	65.1	67.0	69.4	72.4
25	56.3	58.2	60.0	61.8	63.4	65.2	67.0	69.5	72.8
26	56.3	58.2	60.1	61.9	63.6	65.3	67.3	70.0	73.4
27	56.4	58.3	60.1	61.8	63.6	65.6	67.6	70.0	73.8
28	56.2	58.3	60.2	61.9	63.8	65.7	67.9	70.6	74.2
29	56.2	58.1	60.1	62.0	63.8	65.7	67.8	70.9	74.4
30	56.2	58.2	60.1	61.8	63.9	65.8	68.2	71.3	75.0
31	56.3	58.1	60.1	61.9	64.0	66.0	68.3	71.6	75.5
32	56.3	58.2	60.1	62.0	63.8	66.0	68.5	71.7	75.6
33	56.4	58.3	60.2	62.0	64.0	65.9	68.3	72.1	75.8

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
昭和 23	75.4	78.8	80.9	82.2	83.0	83.5	83.8	84.0	83.9	84.0
24	76.3	79.1	81.3	82.4	83.2	83.5	83.6	84.0	84.1	84.1
25	76.3	79.5	81.5	82.6	83.1	83.5	83.7	84.0	84.1	84.2
26	77.7	80.3	82.3	82.7	83.2	83.6	83.7	83.7	84.0	84.2
27	77.3	80.1	82.2	82.8	83.1	83.4	83.7	83.7	83.8	83.7
28	78.2	80.6	82.4	82.7	83.1	83.5	83.8	83.9	84.0	84.1
29	78.3	80.9	82.6	82.8	83.3	83.6	83.9	83.9	83.9	84.1
30	78.8	81.3	83.0	83.1	83.5	83.8	84.1	84.0	84.2	84.1
31	79.4	81.8	83.6	83.6	84.0	84.2	84.5	84.5	84.5	84.6
32	79.6	82.1	83.7	84.2	84.4	84.5	84.7	84.8	84.7	84.7
33	79.9	82.3	84.1	84.0	84.5	84.8	85.0	85.0	85.0	85.0

昭和 14 年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公私立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。昭和 23 年以降は文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第 15 号)の全国集計結果。

調査は、23 年から 25 年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26 年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園については、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも 4 月現在の平均値。

年齢は、4 月 1 日現在において満 6 年 1 日以上満 7 年に達するまでの者を 6 歳とし、その他の年齢もこれに準じている。

昭和 28 年以降の 18 歳以上の数字は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書 昭和 33 年度」による。

表12 年次別、男女、年齢(各歳)別6-24歳学徒の胸囲平均値
(明治33年-昭和33年)

(2) 女

(cm)

年次	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
明治33	53.0	53.9	56.1	57.9	60.5	60.9	63.9	67.0	70.0	
34	52.7	54.2	55.8	57.3	59.4	61.5	63.9	67.0	69.7	
35	52.7	53.9	55.8	57.6	59.4	61.5	63.6	66.7	69.7	
36	52.4	54.2	55.8	57.6	59.4	61.2	63.6	67.0	70.0	
37	52.7	53.9	55.8	57.3	58.8	61.2	63.6	66.7	69.7	
38	52.7	53.9	55.5	57.6	58.8	60.9	63.9	66.7	70.3	
39	52.1	53.0	55.8	57.3	59.1	60.3	63.3	66.1	70.0	
40	52.4	53.9	55.8	57.6	59.1	61.2	63.6	67.0	70.3	
41	52.4	53.9	55.8	57.3	58.8	61.2	63.6	66.7	70.0	
42	52.4	53.9	55.8	57.3	59.1	60.9	63.6	67.0	70.3	
43	52.4	54.2	55.8	57.3	59.1	61.2	63.9	67.0	70.3	
44	52.4	53.9	55.8	57.3	59.1	61.2	63.6	66.7	70.3	
45	52.1	53.9	55.5	57.3	59.1	61.2	63.9	67.9	71.2	
大正2	52.1	54.2	55.8	57.6	59.4	61.8	64.2	67.6	70.6	
3	52.4	54.2	56.1	57.6	59.7	61.8	64.5	67.9	70.9	
4	52.4	54.2	55.8	57.9	59.7	61.8	64.8	68.5	71.2	
5	52.4	54.2	56.1	57.9	60.0	62.1	65.2	68.5	71.2	
6	52.4	54.2	56.1	57.9	60.0	62.1	65.2	68.5	71.2	
7	52.4	54.2	56.1	57.9	59.7	62.4	64.8	68.5	71.5	
8	52.4	54.5	56.1	57.9	59.7	62.1	64.5	68.2	71.5	
年次	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳
明治33	73.0	73.9	76.1	77.9	79.1	79.1	80.0	80.0	77.9	77.9
34	72.7	74.8	76.1	77.0	77.3	77.0	75.5	75.8	78.8	74.8
35	72.7	74.2	76.4	77.3	77.0	76.4	75.2	74.8	73.3	73.6
36	72.7	74.5	76.1	75.8	76.4	75.5	74.5	75.1	78.5	74.8
37	73.3	75.2	76.1	77.3	77.0	76.4	76.4	74.8	74.8	73.6
38	73.0	75.5	77.0	77.6	78.2	77.3	76.7	75.8	75.2	78.2
39	73.3	75.0	77.3	78.2	78.5	76.7	78.2	79.7	77.9	76.4
40	73.3	75.5	77.3	77.9	78.2	76.4	76.7	76.1	77.6	73.9
41	72.7	75.8	77.0	77.6	78.5	77.6	76.7	77.0	76.7	76.7
42	73.0	75.2	76.7	77.6	78.8	78.5	77.0	77.0	76.7	75.8
43	73.9	75.5	77.0	78.5	78.5	78.5	79.4	78.5	77.6	78.8
44	73.3	75.5	77.0	77.9	78.2	77.9	77.6	77.3	77.6	76.1
45	73.9	76.1	77.0	78.5	79.1	79.4	79.4	79.4	80.0	79.4
大正2	73.6	75.8	77.0	78.2	78.8	78.5	79.1	78.8	78.2	80.9
3	73.9	75.5	77.3	78.5	78.8	79.1	78.2	77.6	77.6	77.9
4	74.2	76.1	77.3	78.8	79.4	78.8	78.8	78.2	78.8	77.3
5	73.9	75.8	77.6	79.1	79.1	79.4	78.5	78.8	78.5	79.4
6	73.9	75.2	77.3	79.4	79.4	79.1	79.1	77.3	79.4	76.7
7	73.9	75.8	77.9	79.1	79.4	78.8	78.5	78.8	79.4	78.5
8	74.2	76.1	76.1	78.5	78.8	78.5	79.1	78.5	78.5	79.7

表 12 年次別、男女、年齢別 6 - 24 歳学徒の胸囲平均値

(2) 女(つづき)

(四)

年次	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳
大正 9	52.4	54.5	56.1	58.2	59.7	62.1	64.5	68.8	72.1
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	52.4	54.5	56.4	58.2	60.0	62.4	65.2	68.8	72.7
12	52.7	54.5	56.4	58.2	60.3	62.4	60.1	68.8	72.4
13	53.0	54.5	56.4	58.2	60.3	62.4	65.5	69.4	72.4
14	52.7	54.5	56.4	58.2	60.0	62.4	65.5	69.1	72.4
15	52.7	54.6	56.2	57.9	60.0	62.5	65.6	69.3	72.3
昭和 2	52.5	54.2	56.0	58.6	59.8	62.2	65.3	69.0	72.1
3	52.5	54.3	56.1	58.2	60.0	62.4	65.2	69.3	72.4
4	52.6	54.5	56.3	58.3	60.1	62.6	65.8	69.3	72.6
5	52.6	54.5	56.3	58.1	60.1	62.6	65.8	69.3	72.5
6	52.7	54.5	56.2	58.1	60.1	62.5	65.9	69.5	72.8
7	52.7	54.6	56.4	58.1	60.2	62.8	66.1	69.8	73.0
8	52.8	54.6	56.4	58.2	60.2	62.8	66.5	69.8	73.1
9	53.0	54.9	56.6	58.4	60.5	63.0	66.8	70.4	73.7
10	53.0	54.9	56.7	58.5	60.5	63.1	66.5	70.3	73.5
11	53.1	54.9	56.7	58.6	60.6	63.1	66.7	70.4	73.6
12	53.2	55.0	56.9	58.7	60.8	63.6	66.7	70.2	73.7
13	53.2	55.1	57.1	58.8	61.1	63.8	66.9	70.4	74.1
14	53.3	55.3	57.1	59.0	61.3	63.9	66.8	70.0	73.9

年次	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳	20 歳	21 歳	22 歳	23 歳	24 歳
大正 9	74.8	76.4	77.6	79.1	80.0	81.2	79.4	80.3	79.7	77.9
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	74.8	76.4	78.2	78.8	80.9	80.0	80.6	82.4	81.2	85.2
12	74.5	77.0	77.9	79.4	79.7	80.3	80.3	80.3	80.9	82.7
13	74.5	76.4	77.9	78.5	79.1	79.4	79.1	80.0	79.4	78.2
14	73.9	76.4	77.6	78.2	78.2	78.5	77.9	78.2	77.3	76.1
15	74.3	76.1	77.6	78.0	78.2	77.9	78.1	78.5	77.8	77.5
昭和 2	74.4	75.8	77.0	77.9	79.0	79.0	78.9	79.0	78.7	78.9
3	74.5	76.0	77.1	78.1	77.3	77.5	77.5	77.9	77.4	76.5
4	74.8	76.2	77.3	78.1	76.9	77.9	78.2	77.9	78.2	79.6
5	74.7	76.1	77.4	78.3	77.7	77.4	77.4	76.9	77.9	77.9
6	74.9	76.0	77.3	78.0	77.6	78.0	77.1	77.5	77.3	77.9
7	75.2	76.3	77.3	78.1	77.8	77.9	77.5	77.4	76.7	77.8
8	75.2	76.3	77.2	78.1	78.3	78.1	77.7	77.8	77.8	77.8
9	75.5	76.6	77.7	78.6	78.6	78.3	77.8	78.1	77.2	76.1
10	75.3	77.0	77.6	78.5	78.3	78.2	77.5	77.3	77.7	79.5
11	75.6	77.0	77.9	78.7	78.9	78.8	78.8	79.6	78.2	79.4
12	75.8	77.0	78.2	79.0	78.8	78.3	78.0	77.9	79.1	79.1
13	75.8	77.1	78.5	79.0	78.8	78.5	78.6	78.4	78.4	77.5
14	75.8	77.3	78.5	79.2	78.6	78.5	78.7	79.2	79.2	78.9

表12 年次別、男女、年齢別6-24歳学徒の胸囲平均値

(2) 女(つづき)

(28)

年次	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
昭和23	54.6	56.2	57.8	59.5	61.3	63.4	66.6	69.5	72.9
24	54.7	56.4	58.0	59.6	61.5	63.7	66.7	69.9	73.3
25	54.7	56.4	58.0	59.7	61.5	63.8	66.8	70.3	73.6
26	54.7	56.3	58.2	59.9	61.7	64.2	67.3	71.0	74.2
27	54.8	56.6	58.3	60.2	62.1	64.5	67.6	71.1	74.5
28	54.7	56.5	58.4	60.2	62.1	64.7	68.1	71.6	74.9
29	54.6	56.3	58.3	60.2	62.3	64.9	68.3	71.8	75.1
30	54.6	56.4	58.2	60.2	62.5	65.2	68.9	72.5	75.6
31	54.7	56.4	58.3	60.4	62.7	65.6	69.2	72.9	76.0
32	54.7	56.5	58.3	60.2	62.5	65.8	69.5	73.1	76.1
33	54.8	56.6	58.4	60.4	62.7	65.7	69.8	73.5	76.2

年次	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳
昭和23	75.7	78.2	79.7	80.7	81.1	81.2	81.4	81.1	80.7	80.2
24	76.3	78.5	79.7	80.7	81.3	81.6	81.5	81.4	80.9	80.8
25	76.4	78.6	79.8	80.4	81.1	81.4	81.2	81.5	81.2	81.2
26	77.1	78.8	79.8	80.0	80.6	80.9	81.4	80.7	81.4	80.7
27	77.3	78.8	80.0	80.5	80.9	80.9	80.7	80.9	80.8	79.6
28	77.4	79.1	80.1	80.0	80.6	80.7	80.6	80.5	80.7	80.4
29	77.6	79.1	80.2	80.0	80.5	80.7	80.6	80.8	80.8	80.8
30	77.9	79.6	80.5	80.2	80.7	80.6	80.9	80.7	80.8	80.9
31	78.2	79.7	80.6	80.2	80.8	80.7	80.7	80.8	80.9	80.8
32	78.3	79.8	80.7	80.5	80.9	81.0	80.8	80.7	81.1	81.1
33	78.4	79.9	80.7	80.3	80.9	80.7	80.8	80.8	81.1	81.4

昭和14年以前は、文部省体育局「学校身体検査統計」により、全国公私立学校生徒の身体検査成績を集計整理したもの。

昭和23年以降は、文部省が毎年実施する学校衛生統計調査(指定統計第15号)の全国集計結果。調査は23年から25年までは全国の学校について全部調査が行われたが、26年以降は小学校、中学校、高等学校および幼稚園については、一部の学校を標本抽出して調査されている。各年とも4月現在の平均値。

年齢は、4月1日現在において満6年1日以上満7年に達するまでの者を6歳とし、その他の年齢もこれに準じている。昭和28年以降の18歳以上の数値は、大学学生の平均値である。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書 昭和33年度」による。

表 13 年次別、男女、年齢（各歳）別 6-24 歳学徒の座高平均値（昭和 12 年 - 33 年）

(cm)

(1) 男

年齢	昭和12年	昭和13年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	昭和29年	昭和30年	昭和31年	昭和32年	昭和33年
6	62.4	62.3	62.0	62.5	62.4	62.5	62.6	62.8	62.9	62.9	63.1
7	64.6	64.6	64.4	64.7	64.8	65.0	65.0	65.2	65.4	65.5	65.7
8	66.8	67.0	66.6	66.9	67.0	67.2	67.3	67.4	67.7	67.8	68.0
9	69.0	69.0	68.6	69.0	69.0	69.2	69.3	69.5	69.7	69.9	70.0
10	70.8	71.0	70.3	70.8	71.0	71.2	71.2	71.4	71.6	71.7	72.0
11	72.8	72.7	72.1	72.5	72.7	73.0	73.1	73.2	73.5	73.6	73.8
12	75.0	75.1	74.2	74.6	74.8	75.1	75.3	75.7	75.9	76.1	76.4
13	77.9	78.0	76.5	77.0	77.5	77.8	78.2	78.7	78.9	79.1	79.6
14	82.0	82.2	79.6	80.2	80.7	81.0	81.4	82.0	82.4	82.7	83.0
15	85.1	86.0	83.5	84.5	84.8	85.3	85.6	86.0	86.4	86.7	87.0
16	87.0	87.5	86.1	86.8	87.0	87.3	87.6	87.9	88.1	88.4	88.7
17	87.8	88.6	87.7	88.3	88.4	88.8	88.8	89.0	89.2	89.4	89.7
18	88.4	89.4	88.4	89.3	89.9	89.4	89.7	89.3	90.0	90.2	90.4
19	88.9	89.8	88.9	89.6	89.4	89.6	89.8	90.1	90.2	90.4	90.5
20	89.5	90.0	89.1	89.7	89.6	89.7	89.8	90.0	90.2	90.3	90.5
21	89.9	90.1	89.0	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.4
22	90.3	90.2	89.1	89.5	89.6	89.6	89.7	89.9	89.9	90.0	90.4
23	90.0	90.3	89.1	89.3	89.4	89.4	89.6	89.7	89.9	90.0	90.4
24	89.9	90.2	89.0	89.3	89.3	89.2	89.3	89.6	89.8	89.9	90.2

表 13 年次別、男女、年齢（各歳）別 6-24 歳生徒の座高平均値（昭和 12 年 - 33 年）

(cm)

(2) 女

年 齢	昭和12年	昭和13年	昭和15年	昭和16年	昭和17年	昭和18年	昭和19年	昭和30年	昭和31年	昭和32年	昭和33年
6	61.8	61.3	61.6	61.9	62.0	62.0	62.2	62.3	62.5	62.5	62.6
7	64.2	64.0	64.0	64.2	64.3	64.6	64.6	64.8	65.0	65.0	65.2
8	66.4	66.3	66.2	66.5	66.6	66.8	67.0	67.1	67.3	67.4	67.6
9	68.4	68.4	68.2	68.7	68.8	68.9	69.1	69.4	69.5	69.7	69.9
10	70.6	70.6	70.2	70.6	70.9	71.1	71.3	71.5	72.0	71.9	72.3
11	73.3	73.2	72.7	73.0	73.2	73.6	73.9	74.1	74.6	74.8	75.0
12	76.0	76.1	75.1	75.8	76.0	76.5	76.9	77.4	77.8	78.0	78.5
13	79.0	78.4	78.0	78.7	78.8	79.1	79.5	80.0	80.4	80.6	80.9
14	81.8	82.2	80.4	80.9	81.1	81.3	81.5	82.0	82.3	82.5	82.7
15	82.9	82.7	82.4	83.1	83.2	83.3	83.3	83.7	83.8	84.0	84.1
16	83.5	83.8	83.5	83.7	83.8	84.0	84.0	84.2	84.0	84.4	84.5
17	83.8	84.2	84.0	84.0	84.2	84.4	84.3	84.3	84.4	84.6	84.7
18	84.2	84.3	84.1	84.0	83.9	84.1	84.0	84.3	84.3	84.3	84.4
19	84.0	84.3	84.2	84.2	83.8	84.1	84.0	84.1	84.1	84.3	84.5
20	84.0	84.3	84.5	84.2	84.0	84.3	83.9	84.0	84.1	84.2	84.4
21	84.0	84.2	84.1	84.3	84.3	83.9	84.2	84.0	84.1	84.0	84.4
22	84.5	84.1	84.3	84.5	84.4	84.9	83.8	83.9	83.9	84.1	84.5
23	85.2	84.8	84.1	84.1	84.1	84.6	83.9	83.7	83.9	83.9	84.5
24	84.6	84.0	83.6	84.3	84.3	84.1	84.0	83.6	84.0	83.9	84.4

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書、昭和 33 年度」による。
昭和 28 年以降の 18 歳以上の教値は、大学学生の平均値。その他前表の注を参照。

表14 学校の種類別、男女、年齢（各歳）別3-24歳学徒の身長、体重、胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和33年）

(1) 男

学校の種類	年齢	身長(cm)		体重(kg)		胸囲(cm)		座高(cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
幼稚園	3	96.5	4.2	14.9	1.7	52.7	2.5	55.9	2.8
	4	101.7	4.3	16.3	1.7	53.8	2.4	58.6	2.8
	5	106.9	4.5	17.6	1.9	55.2	2.5	61.0	2.8
小学校	6	110.9	4.7	18.9	2.1	56.4	2.5	63.1	2.8
	7	116.2	4.9	20.9	2.3	58.3	2.6	65.7	2.8
	8	121.4	5.1	23.1	2.6	60.2	2.8	68.0	2.8
	9	126.1	5.3	25.3	2.9	62.0	2.9	70.0	2.9
	10	130.7	5.5	27.6	3.3	64.0	3.1	72.0	3.0
	11	135.1	5.9	30.2	3.9	65.9	3.4	73.8	3.1
中学校	12	140.8	7.1	34.0	5.2	68.3	4.1	76.4	3.8
	13	147.1	8.0	38.8	6.4	72.1	4.8	79.6	4.5
	14	153.6	7.9	44.2	7.0	75.8	5.1	83.0	4.5
高等学校	15	160.3	6.4	50.4	6.5	79.9	4.8	87.0	3.9
	16	162.9	5.8	53.6	6.1	82.3	4.6	88.7	3.5
	17	164.3	5.5	55.7	5.9	84.1	4.4	89.7	3.2
	18	163.7	5.6	56.1	5.7	84.5	4.4	89.6	3.3
	19	163.6	5.5	56.2	5.6	84.6	4.4	89.5	3.0
大学	18	165.6	5.4	56.6	6.5	84.0	4.4	90.4	3.2
	19	165.8	5.4	56.6	6.0	84.5	4.4	90.5	3.1
	20	166.0	5.4	56.7	5.9	84.8	4.4	90.5	3.2
	21	166.1	5.4	56.9	6.0	85.0	4.4	90.5	3.2
	22	166.1	5.4	56.7	5.7	85.0	4.3	90.4	3.1
	23	165.9	5.5	56.7	5.9	85.0	4.4	90.4	3.1
	24	165.4	5.5	56.4	6.0	85.0	4.4	90.2	3.3

昭和33年度学校衛生統計調査（指定統計第15号）の結果。

大学については、国公立を問わず全学生を調査対象としているが、その他は無作為抽出法によって抽出した学校の生徒児童幼児を対象としている。（次頁に）

表14 学校の種類別、男女、年齢（各歳）別3 - 24歳学徒の身長、体重
胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和33年）

(2) 女

学校の種類	年 齢	身長 (cm)		体 重 (Kg)		胸 囲 (cm)		座 高 (cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
幼稚園	3	95.0	4.0	14.3	1.6	51.3	2.4	55.0	2.7
	4	100.8	4.2	15.8	1.7	52.5	2.5	57.8	2.7
	5	105.5	4.4	17.1	1.9	53.7	2.4	60.4	2.9
小学校	6	109.9	4.7	18.4	2.1	54.8	2.5	62.6	2.7
	7	115.2	4.9	20.3	2.3	56.6	2.6	65.2	2.8
	8	120.4	5.1	22.5	2.7	58.4	2.8	67.6	2.8
	9	125.5	5.5	24.9	3.1	60.4	3.1	69.9	3.0
	10	131.0	6.1	27.7	4.1	62.7	3.8	72.3	3.4
	11	136.6	6.7	31.3	4.9	65.7	4.3	75.0	3.7
中学校	12	142.8	6.8	36.4	6.0	69.8	5.0	78.5	4.0
	13	147.1	6.1	40.9	6.0	73.5	5.0	80.9	3.7
	14	149.9	5.5	44.6	5.9	76.2	4.8	82.7	3.3
高等学校	15	152.3	4.9	47.6	5.6	78.4	4.5	84.1	2.9
	16	153.1	4.9	49.4	5.5	79.9	4.5	84.5	2.8
	17	153.5	4.9	50.3	5.5	80.7	4.4	84.7	2.7
	18	153.5	5.0	50.5	5.5	81.5	4.5	84.5	2.8
	19	153.6	5.2	50.7	5.5	81.9	4.6	84.4	2.9
大 学	18	154.4	4.8	49.8	5.5	80.3	4.5	84.4	2.9
	19	154.6	4.8	50.3	5.4	80.9	4.5	84.5	2.8
	20	154.6	4.8	50.0	5.3	80.7	4.5	84.4	2.9
	21	154.6	4.8	49.8	5.4	80.8	4.4	84.4	2.9
	22	154.6	4.9	49.6	5.5	80.8	4.5	84.5	3.1
	23	154.5	4.9	49.3	5.6	81.1	4.7	84.5	3.3
	24	154.3	4.7	49.3	5.5	81.4	4.6	84.4	3.0

調査単位は学校で、それぞれ4月中に実施される身体検査の終了の日を調査期日としている。

文部省調査局統計課編「学校衛生統計報告書、昭和33年度」による。

表 15 学校の種別、男女、年齢（各歳）別 3 - 24 歳学徒の身長、体重
胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和 32 年）

(1) 男

学校の種類	年 齢	身 長 (cm)		体 重 (kg)		胸 囲 (cm)		座 高 (cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
幼稚園	3	96.3	4.3	14.9	1.7	52.7	2.5	55.9	2.7
	4	101.6	4.3	16.1	1.7	53.8	2.4	58.4	2.9
	5	106.4	4.5	17.4	1.9	55.0	2.5	60.8	2.9
小学校	6	110.7	4.7	18.8	2.0	56.3	2.5	62.9	2.8
	7	116.0	4.8	20.8	2.3	58.2	2.6	65.5	2.8
	8	121.0	5.1	22.8	2.6	60.1	2.7	67.8	2.8
	9	125.8	5.3	25.0	2.8	62.0	2.9	69.9	2.9
	10	130.1	5.3	27.4	3.2	63.8	3.0	71.7	2.9
	11	135.0	6.0	30.2	3.8	66.0	3.3	73.6	3.1
中学校	12	140.2	6.9	33.8	5.1	68.5	4.0	76.1	3.9
	13	146.3	7.9	38.5	6.3	71.7	4.7	79.1	4.4
	14	153.0	7.9	43.8	6.9	75.6	5.1	82.7	4.6
高等学校	15	159.8	6.5	50.1	6.4	79.6	4.8	86.7	3.9
	16	162.4	5.8	53.3	6.1	82.1	4.5	88.4	3.5
	17	163.9	5.6	55.3	5.8	83.7	4.4	89.4	3.3
	18	163.5	5.6	55.8	5.7	84.4	4.4	89.3	3.3
	19	163.5	5.5	56.2	5.6	84.4	4.3	89.2	3.4
大 学	18	165.5	5.4	56.3	5.9	84.2	4.5	90.2	3.1
	19	165.7	5.4	56.5	5.8	84.4	4.5	90.4	3.1
	20	165.9	5.4	56.6	5.8	84.5	4.3	90.4	3.1
	21	165.9	5.3	56.5	5.8	84.7	4.3	90.3	3.1
	22	165.9	5.4	56.9	5.9	84.8	4.3	90.2	3.2
	23	165.4	5.2	56.2	5.8	84.7	4.3	90.0	3.3
	24	165.2	5.5	56.1	5.9	84.7	4.4	89.9	3.2

昭和 32 年度学校衛生統計調査（指定統計第 15 号）の結果、大学については、国公私立を問わず全学生を調査対象としているが、その他は無作為抽出法によって抽出した学校の生徒児童幼児を対象としている。（次頁に）

表15 学校の種類別、男女、年齢（各歳）別3-24歳学徒の身長、体重
胸囲および座高の平均値ならびに標準偏差（昭和32年）

(2) 女

学校の種類	年 齢	身 長 (cm)		体 重 (kg)		胸 囲 (cm)		座 高 (cm)	
		平均 値	標準 偏差	平均 値	標準 偏差	平均 値	標準 偏差	平均 値	標準 偏差
幼 稚 園	3	95.0	4.2	14.4	1.7	51.4	2.5	55.1	2.6
	4	100.6	4.3	15.6	1.7	52.4	2.5	57.7	3.1
	5	105.3	4.4	16.9	1.9	53.6	2.5	60.2	2.9
小 学 校	6	109.7	4.6	18.2	1.9	54.7	2.5	62.5	2.7
	7	115.0	4.8	20.2	2.4	56.5	2.6	65.0	2.8
	8	120.1	5.1	22.4	2.6	58.3	2.8	67.4	2.9
	9	125.2	5.4	24.7	3.1	60.2	3.1	69.7	3.0
	10	130.2	5.8	27.4	3.8	62.5	3.6	71.9	3.3
	11	136.3	6.7	31.3	4.9	65.8	4.3	74.8	3.8
中 学 校	12	142.2	6.7	36.0	5.7	69.5	5.0	78.0	4.0
	13	146.6	6.1	40.4	6.0	73.1	5.0	80.6	3.8
	14	149.6	5.5	44.3	5.8	76.1	4.8	82.5	3.4
高 等 学 校	15	152.1	4.9	47.3	5.5	78.3	4.5	84.0	3.0
	16	152.8	4.9	49.1	5.5	79.8	4.5	84.4	2.9
	17	153.3	4.8	50.1	5.4	80.7	4.4	84.6	2.8
	18	152.9	4.9	50.4	5.4	81.5	4.4	84.3	2.8
	19	152.9	4.9	50.7	5.4	82.0	4.5	84.1	2.9
大 学	18	154.4	4.8	50.0	5.4	80.5	4.6	84.3	2.9
	19	154.6	4.8	50.2	5.3	80.9	4.4	84.3	2.8
	20	154.6	4.8	50.2	5.4	81.0	4.4	84.2	2.8
	21	154.6	4.7	49.8	5.3	80.8	4.4	84.0	3.0
	22	154.4	4.9	49.4	5.4	80.7	4.6	84.1	3.0
	23	154.2	4.8	49.2	5.4	81.1	4.8	83.9	3.0
	24	154.1	4.8	49.2	5.5	81.1	4.8	83.9	3.2

調査単位は学校で、それぞれ4月中に実施される身体検査の終了の日を調査期日として
いる。

文部省「学校衛生統計報告書、昭和32年度」による。

表16 特殊教育学校の男女、年齢（各歳）別3-19歳学徒の身長、体重、胸囲および座高平均値（昭和32年）

学校の種類	年齢	男				女				
		身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	座高 (cm)	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	座高 (cm)	
盲学校	4	98.5	15.5	52.3	56.5	-	-	-	-	
	5	104.7	16.7	54.5	58.1	101.0	17.0	53.0	57.0	
	6	109.0	18.4	56.2	61.4	108.6	18.8	54.6	60.0	
	7	113.1	19.7	57.8	63.7	111.2	19.6	56.0	62.2	
	8	117.3	21.6	59.4	65.8	116.8	22.4	58.0	64.4	
	9	122.6	24.2	61.8	68.7	121.9	23.9	60.6	66.7	
	10	126.5	26.1	63.4	70.2	126.3	26.7	63.4	69.4	
	11	130.1	27.7	65.0	71.7	131.6	29.8	65.9	71.5	
	12	135.3	31.8	67.9	74.2	137.1	33.5	69.7	75.0	
	13	142.7	36.2	70.7	77.8	142.2	37.5	72.9	77.8	
	14	148.6	41.0	74.7	81.0	143.8	40.7	75.1	79.0	
	15	154.0	45.1	77.6	83.0	146.9	44.3	78.1	80.8	
	16	157.6	46.4	80.2	86.7	147.9	45.8	79.0	81.4	
	17	158.1	49.0	81.4	87.3	147.9	47.0	80.1	82.1	
	18	159.2	51.5	82.3	88.0	148.8	47.2	80.7	82.4	
	19	159.8	52.2	82.9	88.4	148.9	47.9	80.6	82.6	
	ろう学校	3	95.3	13.8	50.0	55.1	93.4	13.4	49.5	53.5
		4	100.9	15.7	52.1	58.1	99.1	15.7	51.7	56.9
		5	105.6	17.5	55.0	60.3	102.9	16.2	53.2	58.7
6		109.3	18.5	56.6	62.2	108.4	18.0	55.0	61.4	
7		114.3	20.3	58.1	64.6	113.4	19.8	56.6	64.0	
8		118.6	22.2	59.9	66.8	118.3	22.1	58.7	66.5	
9		123.4	25.2	61.7	68.9	123.3	24.3	60.7	68.7	
10		127.3	26.3	63.4	70.5	128.0	26.7	62.6	71.0	
11		132.4	29.2	65.7	72.4	133.6	30.4	65.3	73.6	
12		136.9	32.0	67.9	74.7	139.8	34.8	69.1	76.8	
13		142.9	35.8	70.0	77.6	144.1	39.0	72.2	79.3	
14		149.3	40.6	74.2	80.8	146.4	42.3	74.8	81.0	
15		154.6	45.3	77.7	84.1	148.5	45.1	77.3	82.2	
16		158.2	49.1	80.6	86.3	150.1	47.1	78.8	83.4	
17		160.6	51.1	81.9	87.3	149.8	48.4	79.8	83.4	
18		160.4	53.0	83.5	87.9	150.1	48.8	80.0	84.2	
19		161.9	53.9	84.1	88.6	150.7	49.1	80.7	84.3	

表16 特殊教育学校の男女、年齢別3-19歳学徒の身長、体重、胸囲
および座高平均値(つづき)

学校の種類	年齢	男				女			
		身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	座高 (cm)	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	座高 (cm)
養護学校	3	93.5	15.1	53.5	53.0	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	93.5	12.5	47.5	52.5
	5	102.5	17.5	56.0	57.0	102.4	15.4	52.0	56.5
	6	107.3	18.0	56.6	60.7	105.3	17.0	54.9	58.9
	7	112.4	19.5	58.6	63.8	111.7	19.5	56.6	63.0
	8	117.8	21.4	59.5	66.2	116.8	21.5	58.0	65.7
	9	122.1	23.0	60.3	68.0	120.7	23.0	59.5	67.4
	10	125.8	25.2	62.3	69.9	125.6	25.1	61.5	69.5
	11	130.6	27.3	63.9	71.9	130.1	28.2	64.5	72.1
	12	134.5	29.7	66.3	74.1	136.0	32.4	67.5	74.3
	13	141.8	36.3	69.4	76.4	142.5	37.3	71.9	77.9
	14	148.7	39.5	72.8	80.9	145.6	40.5	74.1	79.2
	15	150.6	41.5	74.8	82.3	147.7	43.4	75.5	81.5
	16	155.5	44.8	77.5	85.2	147.9	45.9	77.2	82.0
	17	156.5	45.7	78.5	85.6	148.6	48.2	80.9	83.2
	18	160.5	45.0	78.8	87.0	150.5	48.4	81.5	84.0
	19	159.5	44.0	76.0	85.5	160.0	48.6	81.5	84.5

前表と同様、昭和32年度学校衛生統計調査の結果で、国公立を問わず全部の生徒児童を調査の対象としている。

調査の期日は、昭和32年4月中、すなわち学校身体検査規程により実施される学校身体検査の終了の日。

文部省「学校衛生統計報告書 昭和32年度」による。

表17 平均1人1日当り栄養摂取量(昭和33年)

栄養の種類		昭和33年			昭和34年2月	平均	
		5月	8月	11月			
全 国	成人換算率	熱量	0.878	0.874	0.882	0.905	0.885
		蛋白質	0.919	0.909	0.920	0.947	0.924
	熱量(Cal)	総量	2,108.0	2,056.7	2,172.3	2,135.2	2,118.1
		購入物	1,374.0	1,334.1	1,382.5	1,375.5	1,366.5
	蛋白質(g)	自家生産	734.0	722.6	789.8	759.7	751.5
		総量	70.5	66.1	72.4	71.5	70.1
	脂肪素(g)	動物性	23.9	21.6	25.7	23.8	23.8
		植物性	46.7	44.5	46.7	47.7	46.4
	炭素(g)	脂肪素	23.3	23.0	24.4	24.0	23.7
		水炭素	404.1	396.3	415.8	408.5	406.2
	カルシウム(mg)	カルシウム	394	360	395	401	388
		磷	1,364	1,305	1,419	1,389	1,369
	鉄(mg)	鉄	15	13	15	15	15
		ビタミン	A (IU)	1,740	1,007	1,729	2,525
価格	1人1日当り(円)	B1 (mg)	1.05	1.06	1.12	1.05	1.07
		B2 (mg)	0.83	0.63	0.74	0.73	0.73
		C (mg)	72	62	93	81	77
価格	1人1日当り(円)	価格	104.68	103.95	100.82	103.02	103.12
		1カロリー当り(銭)	5.0	5.1	4.6	4.8	4.9
生 産 者 世 帯 (1)	成人換算率	熱量	0.946	0.930	0.952	0.904	0.933
		蛋白質	0.973	0.956	0.975	0.937	0.960
	熱量(Cal)	総量	2,220.9	2,179.1	2,328.7	2,198.3	2,231.8
		購入物	489.6	512.1	526.9	478.4	501.8
	蛋白質(g)	自家生産	1,731.3	1,667.0	1,801.8	1,719.8	1,730.0
		総量	70.2	65.6	73.0	69.3	69.5
	脂肪素(g)	動物性	20.0	17.2	22.1	19.1	19.6
		植物性	50.2	48.4	50.9	50.2	49.9
	炭素(g)	脂肪素	20.8	20.1	22.3	20.8	21.0
		水炭素	432.2	433.8	459.4	433.6	441.3
	カルシウム(mg)	カルシウム	408	367	395	386	389
		磷	1,405	1,385	1,535	1,427	1,438
	鉄(mg)	鉄	16	13	15	15	15
		ビタミン	A (IU)	1,946	922	1,567	2,378
価格	1人1日当り(円)	B1 (mg)	1.06	1.10	1.17	1.05	1.10
		B2 (mg)	0.92	0.61	0.74	0.70	0.74
		C (mg)	75	65	104	81	81
価格	1人1日当り(円)	価格	97.80	92.98	89.25	91.04	92.77
		1カロリー当り(銭)	4.4	4.3	3.8	4.1	4.2

昭和33年度国民栄養調査のうち、5月、8月、11月および翌34年2月の4回にわたり実施された栄養摂取状況調査の結果。調査期日は定められた月の中で上旬を選ぶことが原則とされ、また、その選定に際しては祝祭日等特別に食物の摂取に変化のある日を選び、なるべく普通の摂取状態にある連続した3日間を選んで調べられたもの。(次頁に)

表17 平均1人1日当り栄養摂取量(つづき)

栄養の種類	昭和33年			昭和34年	平均	
	5月	8月	11月	2月		
成人 換算率 熱量 (Cal)	熱量	0.835	0.837	0.837	0.907	0.854
	蛋白質	0.886	0.879	0.884	0.956	0.901
	総購入量	2,041.8	1,976.0	2,064.7	2,094.7	2,044.3
	自家生産量	1,950.4	1,887.5	1,969.3	2,001.2	1,952.1
	動物性	91.4	88.4	95.4	93.4	92.2
	植物性	70.9	66.4	71.9	73.0	70.6
	脂肪	26.5	24.5	28.2	27.0	26.6
	炭素	44.5	41.8	43.8	46.0	44.0
	カルシウム	25.1	25.0	26.0	26.2	25.6
	鉄	383.2	371.2	385.6	391.8	383.0
消費者 世帯 (2)	カルシウム	383	355	394	409	385
	磷	1,340	1,245	1,341	1,361	1,322
	鉄	14	13	15	15	14
	ビタミンA (IU)	1,615	1,063	1,855	2,637	1,793
	B1 (mg)	1.05	1.04	1.09	1.05	1.06
	B2 (mg)	0.77	0.65	0.75	0.76	0.73
	C (mg)	69	60	85	82	74
	1人1日当り(円)	110.57	112.32	109.31	111.53	110.93
	1カロリー当り(銭)	5.4	5.7	5.3	5.3	5.4
	その他 世帯	熱量	0.892	0.890	0.898	0.879
蛋白質		0.918	0.917	0.929	0.918	0.921
総購入量		2,033.4	2,049.0	2,197.3	2,107.1	2,096.7
自家生産量		1,197.3	1,239.8	1,271.3	1,147.4	1,214.0
動物性		83.60	80.92	92.60	95.97	88.27
植物性		67.7	66.0	72.4	71.2	69.3
脂肪		21.8	21.0	25.0	23.5	22.8
炭素		45.8	45.0	47.4	47.7	46.5
カルシウム		21.1	21.1	22.7	22.8	21.9
鉄		393.7	398.9	426.1	403.6	405.6
世帯	カルシウム	423	366	416	414	405
	磷	1,340	1,394	1,405	1,418	1,389
	鉄	14	13	14	15	14
	ビタミンA (IU)	1,661	1,017	1,519	2,365	1,641
	B1 (mg)	1.03	1.02	1.10	1.07	1.06
	B2 (mg)	0.77	0.58	0.69	0.69	0.68
	C (mg)	73	63	104	81	80
	1人1日当り(円)	84.81	90.34	92.16	97.95	91.32
	1カロリー当り(銭)	4.2	4.4	4.2	4.6	4.4

国民栄養調査は、厚生行政基礎調査の標本を親標本とし、全国で180地区を無作為抽出してその地区の全世帯および構成員について調査を行った標本抽出法による。
 厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績」昭和34年12月刊による。

(1)耕地面積3反(北海道のみ5反)以上の世帯、(2)耕地面積を全く有しない世帯

表18 平均1人1日当り栄養摂取量(昭和32年)

栄養の種類	昭和32年			昭和33年	平均		
	5月	8月	11月	2月			
全 国	成人換算率	熱量	0.867	0.878	0.884	0.873	0.876
		蛋白質	0.912	0.917	0.920	0.907	0.914
	熱量(Cal)	総量	2,080.0	2,019.1	2,129.5	2,126.4	2,088.8
		購入量	1,371.9	1,319.6	1,374.4	1,377.7	1,360.9
	蛋白質(g)	自家生産量	708.1	699.5	755.0	748.8	727.8
		総動物性	69.2	65.8	71.2	72.3	69.6
	脂 肪 質 (g)	植物性	2.2	2.3	2.47	2.40	2.32
		動物性	4.6	4.5	4.65	4.85	4.65
	炭 水 化 物 (g)	植物性	2.15	2.10	2.24	2.28	2.19
		動物性	40.27	39.21	41.10	40.83	40.35
	カルシウム (mg)	植物性	396	345	389	407	384
		動物性	1,339	1,285	1,376	1,403	1,351
	鉄 (mg)	植物性	15	13	14	15	14
		動物性	1,639	976	1,976	2,539	1,783
ビタミン	A (IU)	1.07	1.09	1.12	1.09	1.09	
	B1 (mg)	0.74	0.62	0.73	0.73	0.71	
	B2 (mg)	68	59	97	84	77	
価格	1人1日当り(円)	94.60	99.15	96.45	97.23	96.86	
	1カロリー当り(銭)	4.5	4.9	4.5	4.6	4.6	
生 産 者 世 帯 (1)	成人換算率	熱量	0.943	0.942	0.954	0.920	0.940
		蛋白質	0.977	0.967	0.976	0.950	0.967
	熱量(Cal)	総量	2,153.0	2,112.2	2,218.3	2,159.8	2,160.0
		購入量	514.2	526.0	523.1	490.3	513.4
	蛋白質(g)	自家生産量	1,638.9	1,586.2	1,695.2	1,669.5	1,647.5
		総動物性	68.5	65.2	70.5	69.8	68.5
	脂 肪 質 (g)	植物性	19.1	17.5	21.5	19.8	19.5
		動物性	49.4	47.0	49.0	50.0	49.1
	炭 水 化 物 (g)	植物性	18.4	18.2	19.8	19.6	19.0
		動物性	428.8	422.2	440.1	426.1	429.3
	カルシウム (mg)	植物性	398	340	375	367	375
		動物性	1,385	1,354	1,418	1,404	1,390
	鉄 (mg)	植物性	15	12	14	14	14
		動物性	1,795	893	1,792	2,327	1,702
ビタミン	A (IU)	1.11	1.09	1.16	1.09	1.11	
	B1 (mg)	0.74	0.61	0.70	0.69	0.69	
	B2 (mg)	68	60	104	87	80	
価格	1人1日当り(円)	84.39	92.49	88.48	85.29	87.66	
	1カロリー当り(銭)	3.9	4.4	4.6	3.9	4.1	

昭和32年度国民栄養調査のうち、5月、8月、11月および翌33年2月の4回にわたって実施された栄養摂取状況調査の結果。調査期日の選定に当っては祝祭日等、特別に食物の摂取に変化のある日を選び、なるべく普通の摂取状態にある3日間を選び調査されたもの。(次頁に)

表 18 平均 1 人 1 日 当り 栄 養 取 入 量 (つ づ き)

栄 養 の 種 類	昭 和 3 2 年			昭 和 3 3 年	平 均		
	5 月	8 月	1 1 月	2 月			
消 費 者 世 帯 (2)	成 換 算 率	0.317	0.838	0.836	0.839	0.833	
	熱 量 (Cal)	2,033.7	1,951.7	2,065.0	2,100.2	2,037.7	
	白 質 (g)	総 量	1,953.2	1,874.3	1,982.6	2,008.2	1,954.6
		自 家 生 産 量	80.5	77.3	82.4	92.0	83.1
	脂 含 水 炭 素 (g)	総 量	69.7	66.2	71.7	73.9	70.4
		自 家 生 産 量	25.0	24.1	27.0	26.8	25.7
	カル シ ウ ム (mg)	総 量	44.7	42.1	44.7	47.0	44.6
		自 家 生 産 量	23.8	23.0	24.4	25.2	24.1
	ビ タ ミ ン	A (IU)	385.2	370.2	390.0	395.0	385.1
		B1 (mg)	39.3	34.8	39.6	41.9	38.9
	価 格	1 人 1 日 当 り (円)	1,309	1,233	1,341	1,393	1,319
		1 カ ロ リ ー 当 り (銭)	15	13	14	15	14
	そ の 他 の 世 帯	B2 (mg)	1,549	1,030	2,137	2,706	1,856
		C (mg)	103	107	108	108	107
	1 人 1 日 当 り (円)	10.226	10.420	10.306	10.629	10.395	
5.0		5.3	5.0	5.1	5.1		
そ の 他 の 世 帯	成 換 算 率	0.878	0.856	0.898	0.885	0.879	
	熱 量 (Cal)	2,049.3	2,041.6	2,146.5	2,153.4	2,097.7	
	白 質 (g)	総 量	1,378.6	1,302.3	1,305.1	1,304.0	1,322.5
		自 家 生 産 量	67.0	73.3	64.1	64.9	77.5
	脂 含 水 炭 素 (g)	総 量	68.6	65.5	71.7	74.6	70.1
		自 家 生 産 量	21.6	20.2	24.7	25.1	22.9
	カル シ ウ ム (mg)	総 量	47.0	45.3	47.0	49.5	47.2
		自 家 生 産 量	19.0	20.1	21.7	20.8	20.4
	ビ タ ミ ン	A (IU)	401.1	399.9	413.0	417.2	408.6
		B1 (mg)	41.6	34.6	40.8	42.2	39.8
	1 人 1 日 当 り (円)	1,326	1,329	1,421	1,490	1,392	
		15	15	16	16	16	
	1 人 1 日 当 り (円)	1,477	1,019	1,673	2,369	1,635	
		10.6	1.14	1.25	1.16	1.15	
	1 人 1 日 当 り (円)	0.73	0.66	0.71	0.74	0.71	
67		59	101	93	80		
1 人 1 日 当 り (円)	87.51	95.42	87.00	90.78	90.16		
	4.3	4.7	4.1	4.2	4.4		

この調査は、厚生行政基礎調査の標本を親標本とし、全国で180地区を層化無作為抽出してその地区の全世帯および構成員について調査を行った標本抽出法によるもの。

厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和32年度国民栄養調査成績」昭和33年11月刊による。

(1)耕地面積3反以上の世帯。(2)耕地を全く有しない世帯。

表 19 年次別平均 1 人 1 日当り栄養摂取量 (昭和 24 年 - 31 年)

栄 養 の 種 類	昭和 24年	昭和 25年	昭和 26年	昭和 27年	昭和 28年	昭和 29年	昭和 30年	昭和 31年	
成人 { 蛋白質 換算率 { 熱量	0855 0836	0853 0829	0903 0854	0891 0857	0891 0848	0895 0853	0902 0861	0901 0863	
蛋白質 (g) { 動物性 植物性 計	14 51 65	17 51 68	19 49 68	226 473 699	224 466 687	221 468 689	223 474 697	226 465 691	
	脂肪 (g) 16	18	18	204	204	209	203	218	
	含水炭素 (g) 423	418	424	412	403	403	411	405	
熱 量 (Cal) 2097	2098	2125	2109	2068	2074	2104	2092		
無機質 { カルシウム (mg) 磷 (mg) 鉄 (mg)	020 (g) 180 47	027 (g) 182 46	027 (g) 182 49	373 179 65	370 184 61	362 182 60	338 137 14	379 135 16	
	ビタミン { A (IU) B1 (mg) B2 (mg) C (mg)	2416 160 070 115	2459 152 072 107	2262 158 076 99	2700 114 066 77	2721 107 065 72	2814 112 066 75	1536 (2904) 116 067 76	1686 (3189) 113 070 77

各年とも国民栄養調査の結果(この調査は、国民全体を対象としているが、実施に当っては標本抽出法によっている。各年とも全国の年平均値)、栄養量はすべて調理による損耗を考慮していない。

栄養量個々の数値は、昭和 29 年 3 月食品成分表の改訂が行われたので昭和 30 年度の成績からその影響が現われているが、特に鉄とビタミン A の数値が急減しているのはそのためである。なお、ビタミン A の 30 年以降の()内数値は、24-29 年の数値との比較に便のため、同年間の計算と同様にカロチンの力価をビタミン A の半分としない数値である。

厚生省公衆衛生局編「国民栄養の現状、昭和 33 年度国民栄養調査成績」昭和 34 年 12 月刊による。

表20 平均1人1日当り食品摂取量(昭和33年)

(単位g)

食 品	昭和33年			昭和34年	平 均
	5 月	8 月	1 月	2 月	
総動植物性食品	1,051.3	1,178.6	1,155.9	1,097.5	1,120.8
穀類	132.2	122.9	140.4	131.5	131.8
米	919.1	1,055.7	1,015.5	966.0	989.1
米加工品	461.5	445.0	462.6	475.4	461.1
小麦	353.4	333.1	354.6	377.7	354.7
小麦粉	346.8	330.3	351.2	359.7	347.0
パン	6.6	2.8	3.4	18.0	7.7
菓子	42.6	40.2	40.3	35.9	39.8
雑穀	64.1	70.5	66.9	60.5	65.5
大豆	8.2	11.8	7.6	6.4	8.5
豆類	22.3	14.7	19.4	19.1	18.9
肉類	4.6	4.2	4.9	3.7	4.4
魚介類	25.0	36.3	31.7	27.9	30.2
卵類	4.0	3.5	3.3	3.4	3.6
野菜類	1.4	1.2	0.9	1.3	1.2
果物類	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5
砂糖	62.0	61.8	107.1	60.9	73.0
油脂	14.6	7.5	50.4	15.8	22.1
乳類	33.0	45.4	19.4	21.0	29.7
加工食品	6.7	2.3	24.8	10.9	11.2
その他	7.7	6.6	12.5	13.2	10.0
砂油	12.6	12.7	10.8	12.9	12.3
魚介類	5.8	6.7	5.3	5.1	5.7
肉類	69.2	64.0	73.0	77.9	71.0
魚類	71.7	62.5	88.2	77.0	74.9
卵類	15.5	17.4	18.0	19.3	17.6
野菜類	17.6	14.3	12.7	14.7	14.8
果物類	27.4	28.8	21.5	20.5	24.6
製菓類	46.8	43.2	42.9	50.3	45.8
飲料類	13.5	32.8	14.4	31.4	23.0
その他	23.0	111.7	59.1	22.9	54.2
乾燥野菜	107.5	142.3	117.6	98.8	116.6
漬物	5.7	4.7	4.6	4.9	5.0
調味料	2.8	1.5	1.7	3.0	2.3
その他	39.2	57.3	54.3	60.0	52.7
その他	68.8	71.3	61.6	62.1	65.9

昭和33年度国民栄養調査のうち、5月、8月、11月および翌34年2月の4回にわたり実施された栄養摂取状況調査による結果。調査期日の選定に際しては祝祭日、もの日その他特別に食物の摂取に変化のある日を選び、なるべく普通の摂取状態にある3日間を選び調査されたもの。

この調査は、厚生行政基礎調査の標本を親標本とし、全国で180地区を層化無作為抽出してその地区の全世帯およびその構成員について調査を行った標本抽出法によるもの。なお、調査世帯は原則として一年間変更しないものとし、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠としている。厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績」昭和34年12月刊による。

表 2 1 平均 1 人 1 日 当り 食 品 摂 取 量 (昭 和 3 2 年)

(単 位 g)

食 品	昭 和 3 2 年			昭 和 3 3 年	平 均
	5 月	8 月	1 1 月	2 月	
総動植物性食品	1,018.1	1,135.0	1,136.2	1,100.9	1,097.6
穀類	1,182	1,128	1,303	1,269	1,221
米	899.9	1,022.2	1,006.0	974.0	975.5
大小雑穀	462.3	444.6	455.0	471.0	458.2
小麦類	354.7	331.6	350.4	368.0	351.2
大麦類	483	454	44.7	424	45.2
雑穀類	56.9	65.5	58.2	58.3	59.7
果糖類	2.4	2.1	1.7	2.3	2.1
油脂類	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6
豆類	5.41	62.6	116.2	78.7	78.0
魚介類	10.2	10.9	9.8	10.4	10.3
肉類	4.6	5.7	4.5	4.4	4.8
鳥肉類	67.1	63.0	70.6	78.7	69.9
卵類	71.6	65.6	86.7	79.6	75.9
乳製品類	12.7	14.7	15.2	17.5	15.0
野菜果実類	14.2	11.9	11.3	13.9	12.8
海藻類	19.7	20.7	17.0	15.9	18.4
加工野菜嗜好品	185.1	299.7	227.6	200.1	228.3
調味料	6.2	4.7	4.6	4.9	5.1
	4.19	60.4	57.3	63.7	55.9
	67.9	70.3	59.5	61.8	64.9

厚生省公衆衛生局編「国民栄養の現状、昭和32年度国民栄養調査成績」昭和33年11月刊による全国の値で5月、8月、11月および翌年2月の4回にわたり実施された標本抽出法による国民栄養調査のうち栄養摂取状況調査による結果。

表 2 2 年次別平均 1 人 1 日 当り 食 品 摂 取 量 (昭 和 2 4 年 - 3 1 年)

(単 位 g)

食 品	昭和 2 4 年	昭和 2 5 年	昭和 2 6 年	昭和 2 7 年	昭和 2 8 年	昭和 2 9 年	昭和 3 0 年	昭和 3 1 年
総穀類	1,0730	10,687	10,948	10,842	10,504	10,518	11,002	11,037
米	4731	4768	4963	4812	4783	4746	4796	4743
大小雑穀	3331	3387	2547	3525	3498	3421	3466	3627
小麦類	627	639	597	562	517	556	600	415
大麦類	658	487	763	630	724	732	683	659
雑穀類	115	55	56	45	44	37	47	42
果糖類	58	09	97	06	95	95	04	05
油脂類	1699	1272	1136	842	742	770	808	680
豆類	52	72	113	143	148	156	158	156
魚介類	18	26	32	39	42	46	44	51
肉類	498	537	630	684	696	682	673	727
野菜果実類	685	818	954	1135	1109	1129	1149	1228
海藻類	2224	2366	2245	2227	2009	2038	2348	2365
加工野菜嗜好品	34	30	38	41	44	48	43	50
調味料	500	469	433	482	504	495	557	591
	281	320	397	429	422	405	424	445

各年とも国民栄養調査の結果で、上表の引用書(国民栄養の現状、昭和32年度国民栄養調査成績)による。調査方法は、前掲の各年と同様。

表 2 3 日本人 1 人 1 日 当り 栄 養 基 準 量

(1) 男 女、年 齢 別 熱 量 お よ び 蛋 白 質 所 要 量 な ら び に 成 人 換 算 率

年 齢	男				女			
	熱 量		蛋 白 質		熱 量		蛋 白 質	
	Cal	換 算 率	g	換 算 率	Cal	換 算 率	g	換 算 率
新 生 児	245	0.10	10	0.15	240	0.10	10	0.15
0	720	0.30	25	0.30	680	0.25	25	0.30
1	1,060	0.40	35	0.45	980	0.40	35	0.45
2	1,280	0.50	45	0.55	1,180	0.45	40	0.50
3	1,420	0.55	50	0.65	1,320	0.55	45	0.55
4	1,500	0.60	50	0.65	1,400	0.60	50	0.65
5	1,560	0.60	55	0.70	1,460	0.60	50	0.65
6	1,690	0.70	60	0.75	1,590	0.65	55	0.70
7	1,770	0.70	60	0.75	1,640	0.70	60	0.75
8	1,830	0.75	65	0.80	1,700	0.70	60	0.75
9	1,900	0.75	65	0.80	1,750	0.70	60	0.75
10	1,950	0.80	70	0.90	1,830	0.75	65	0.80
11	2,030	0.80	70	0.90	1,930	0.75	70	0.90
12	2,130	0.85	75	0.95	2,040	0.80	70	0.90
13	2,250	0.90	80	1.00	2,110	0.85	75	0.95
14	2,490	1.00	90	1.15	2,230	0.90	80	1.00
15	2,580	1.05	90	1.15	2,230	0.90	80	1.00
16	2,630	1.05	90	1.15	2,220	0.90	80	1.00
17	2,640	1.05	95	1.20	2,210	0.90	80	1.00
18	2,650	1.05	95	1.20	2,190	0.90	80	1.00
19	2,650	1.05	95	1.20	2,190	0.90	80	1.00
20	2,650	1.05	95	1.20	2,180	0.85	75	0.95
21-30	2,580	1.05	85	1.05	2,140	0.85	70	0.90
31-40	2,560	1.00	85	1.05	2,070	0.85	70	0.90
41-50	2,500	1.00	80	1.00	2,040	0.80	65	0.80
51-60	2,390	0.95	80	1.00	1,990	0.80	65	0.80
61-70	2,200	0.90	70	0.90	1,700	0.70	55	0.70
71<	1,940	0.80	65	0.80	1,630	0.65	55	0.70

本表は、昭和 2 4 年 に 国 民 食 糧 お よ び 栄 養 対 策 審 議 会 に お い て 決 定 を み た も の。
 栄 養 所 要 量 の 数 値 は、そ の 年 間 の 中 央 値 を 示 す。新 生 児 は 0 歳 中 に 含 ま れ る が、生 後
 2 週 間 以 内 の 状 態 を 示 す た め 特 に 掲 げ た も の。0 歳 の 蛋 白 質 所 要 量 は 人 工 栄 養 で 3 0
 g。

厚 生 省 公 衆 衛 生 局 編 「国 民 栄 養 の 現 状、昭 和 3 2 年 度 国 民 栄 養 調 査 成 績」昭 和 3 3 年
 1 1 月 刊 に よ る。

表 23 日本人の 1 人 1 日 当り 栄 養 基 準 量

(2) 男 女、年 齢 別、成 年 勞 作 別 熱 量 お よ び 蛋 白 質 所 要 量 な ら び に 成 人 換 算 表 率

年 齢	男				女			
	熱 量 Cal	換 算 率	蛋 白 質 g	換 算 率	熱 量 Cal	換 算 率	蛋 白 質 g	換 算 率
輕 勞 作								
17	2,340	0.95	85	1.05	1,910	0.75	70	0.90
18	2,350	0.95	85	1.05	1,890	0.75	70	0.90
19	2,350	0.95	85	1.05	1,890	0.75	70	0.90
20	2,350	0.95	85	1.05	1,880	0.75	65	0.80
21-30	2,280	0.90	75	0.95	1,840	0.75	65	0.75
31-40	2,260	0.90	75	0.95	1,770	0.70	60	0.75
41-50	2,200	0.90	70	0.90	1,740	0.70	55	0.70
51-60	2,090	0.85	70	0.90	1,690	0.70	55	0.70
61-70	1,900	0.75	60	0.75	1,400	0.55	45	0.55
71 ≤	1,740	0.70	55	0.70	1,330	0.55	45	0.55
中 勞 作								
17	2,640	1.05	95	1.20	2,210	0.90	80	1.00
18	2,650	1.05	95	1.20	2,190	0.90	80	1.00
19	2,650	1.05	95	1.20	2,190	0.90	80	1.00
20	2,650	1.05	95	1.20	2,180	0.85	75	0.95
21-30	2,590	1.05	85	1.05	2,140	0.85	70	0.90
31-40	2,560	1.00	85	1.05	2,070	0.85	70	0.90
41-50	2,500	1.00	80	1.00	2,040	0.80	65	0.80
51-60	2,390	0.95	80	1.00	1,990	0.80	65	0.80
61-70	2,200	0.90	70	0.90	1,700	0.70	55	0.70
71 ≤	1,940	0.80	65	0.80	1,630	0.65	55	0.70
強 勞 作								
17	3,140	1.25	110	1.40	2,510	1.00	85	1.05
18	3,150	1.25	110	1.40	2,490	1.00	85	1.05
19	3,150	1.25	110	1.40	2,490	1.00	85	1.05
20	3,150	1.25	110	1.40	2,490	1.00	80	1.00
21-30	3,080	1.25	100	1.25	2,440	1.00	70	0.95
31-40	3,060	1.20	100	1.25	2,370	0.95	75	0.95
41-50	3,000	1.20	95	1.20	2,340	0.95	70	0.90
51-60	2,890	1.15	95	1.20	2,290	0.90	70	0.90
61-70	2,700	1.10	85	1.05	2,000	0.80	60	0.75
71 ≤	2,440	1.00	80	1.00	1,930	0.75	60	0.75
重 勞 作								
17	3,640	1.45	125	1.55	2,910	1.15	95	1.20
18	3,650	1.45	125	1.55	2,890	1.15	95	1.20
19	3,650	1.45	125	1.55	2,890	1.15	95	1.20
20	3,650	1.45	125	1.55	2,880	1.15	90	1.15
21-30	3,580	1.45	115	1.45	2,840	1.15	85	1.05
31-40	3,560	1.40	115	1.45	2,770	1.10	85	1.05
41-50	3,500	1.40	110	1.40	2,740	1.10	80	1.00
51-60	3,390	1.35	110	1.40	2,690	1.10	80	1.00
61-70	3,200	1.30	100	1.25	2,400	0.95	70	0.90
71 ≤	2,940	1.20	95	1.20	2,330	0.95	70	0.90

表 2 3 日本人の 1 人 1 日 当り 栄 養 基 準 量

(2) 成 年 労 作 別 熱 量 お よ び 蛋 白 質 所 要 量 (つ づ き)
男 の 激 労 作

年 齢	熱 量		蛋 白 質		年 齢	熱 量		蛋 白 質	
	Cal	換算率	g	換算率		Cal	換算率	g	換算率
17	4,140	1.65	135	1.70	31-40	4,060	1.60	125	1.55
18	4,150	1.65	135	1.70	41-50	4,000	1.60	120	1.50
19	4,150	1.65	135	1.70	51-60	3,890	1.55	120	1.50
20	4,150	1.65	135	1.70	61-70	3,700	1.50	110	1.40
21-30	4,080	1.65	125	1.55	71 ≤	3,440	1.40	105	1.30

昭和 2 4 年 の 国 民 食 糧 お よ び 栄 養 対 策 審 議 会 決 定。
厚 生 省 公 衆 衛 生 局 編 「 国 民 栄 養 の 現 状 、 昭 和 3 2 年 度 国 民 栄 養 調 査 成 績 」 昭 和 3 3 年 1 1 月 刊 に よ る 。

(3) 男 女 、 年 齢 別 、 労 作 別 無 機 質 お よ び ビ タ ミ ン 所 要 量

栄 養 の 種 類	男 (5 6 k g)					女 (4 9 k g)			
	軽 労 作	中 労 作	強 労 作	重 労 作	激 労 作	軽 労 作	中 労 作	強 労 作	重 労 作
熱 量 (Cal)	2,200	2,500	3,000	3,500	4,000	1,800	2,100	2,400	2,800
蛋 白 質 (g)	70	80	95	110	120	60	70	75	85
カ ル シ ウ ム (g)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鉄 (mg)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ビ タ ミ ン A (IU)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ビ タ ミ ン B ₁ (mg)	11	13	15	18	20	0.9	1.1	1.2	1.4
ビ タ ミ ン B ₂ (mg)	11	13	15	18	20	0.9	1.1	1.2	1.4
ナ イ ア シ ン (mg)	11	13	15	18	20	9	11	12	14
ビ タ ミ ン C (mg)	65	65	65	65	65	60	60	60	60
ビ タ ミ ン D (IU)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
食 塩 (g)	15	15	20	20	25	15	15	20	20

栄 養 の 種 類	小 児 (1 3 歳 未 満)					青 少 年 (1 3 歳 以 上)			
	1 歳 >	男				女			
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-20	13-15	16-20
熱 量 (Cal)	700	1,200	1,550	1,800	2,000	2,450	2,650	2,200	2,200
蛋 白 質 (g)	25	45	55	65	70	90	95	80	80
カ ル シ ウ ム (g)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	1.0
鉄 (mg)	6	7	8	9	10	13	13	13	13
ビ タ ミ ン A (IU)	1,500	2,000	2,500	3,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000
ビ タ ミ ン B ₁ (mg)	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	1.1	1.1
ビ タ ミ ン B ₂ (mg)	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.3	1.3	1.1	1.1
ナ イ ア シ ン (mg)	4	6	8	9	10	13	13	11	11
ビ タ ミ ン C (mg)	25	30	40	55	70	80	90	75	75
ビ タ ミ ン D (IU)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
食 塩 (g)	1	3	6	8	10	12	15	12	15

本 表 は 、 厚 生 省 栄 養 審 議 会 に お い て 昭 和 2 9 年 8 月 1 9 日 決 定 を み た も の 。

同 一 国 際 単 位 I. U. で 表 示 さ れ た ビ タ ミ ン A の 効 力 は 、 カ ロ テ ン に よ る 場 合 は ビ タ ミ ン A に よ る 場 合 の 1/2 で あ る 。

厚 生 省 公 衆 衛 生 局 「 国 民 栄 養 の 現 状 、 昭 和 3 2 年 度 国 民 栄 養 調 査 成 績 」 昭 和 3 3 年 1 1 月 刊 に よ る 。

表24 日本人の1人1日当り食糧構成(昭和37年の目標値)

食品	数量 (g)	熱量 (Cal)	蛋白質 (g)	脂肪 (g)	カルシウム (mg)	ビタミンA (IU)	ビタミンB1 (mg)	ビタミンB2 (mg)	ビタミンC (mg)
穀類									
米	300	1,118.0	2.11	2.8	21	0	0.37	0.13	0
小麦	40	136.8	3.8	0.5	11	0	0.11	0.04	0
雑穀類	80	208.9	5.8	0.9	12	0	0.11	0.04	0
堅い果物	2	6.0	0.2	0.1	0	0	0.00	0.00	—
果物	0.7	2.7	0.1	0.2	4	0	0.00	0.00	0
砂糖類									
砂糖	30	35.3	0.4	0.1	7	20	0.04	0.01	9
加工品	40	31.1	0.8	0.0	2	0	0.04	0.01	6
加工品	20	17.1	0.4	0.2	3	4	0.01	0.01	1
油類									
油	15	58.2	0.1	0.0	10	0	0.00	0.00	0
加工品	15	58.2	0.1	0.0	10	0	0.00	0.00	0
豆類									
大豆	2	7.9	0.8	0.4	4	0	0.01	0.00	0
大豆製品	28	44.7	3.3	0.9	28	0	0.01	0.03	0
大豆製品	40	48.1	3.9	3.1	69	0	0.01	0.02	0
動物性食品	7	22.6	1.3	0.4	4	2	0.02	0.01	0
魚介類	80	116.7	18.5	3.8	77	55	0.07	0.11	1
肉類	20	34.4	4.1	1.9	2	28	0.07	0.03	0
卵類	16	24.2	2.1	1.7	10	121	0.03	0.05	0
野菜・果実	70	41.3	2.1	2.2	70	84	0.03	0.11	1
緑黄色野菜	60	25.7	1.6	0.2	58	4,650	0.06	0.11	38
その他の野菜	140	33.5	2.2	0.2	40	120	0.10	0.10	31
柑類・トマト	30	10.8	0.3	0.1	4	316	0.03	0.01	9
その他の果実	70	26.5	0.3	0.2	6	62	0.02	0.02	8
海藻類	3				25	83	0.00	0.01	0
油	30								
計	1,200	2,212	73.3	31.3	477	ビタミンA 318 カロチン 5,257	1.14	0.85	104
基準		2,130	73.0	30	1,000	3,700	1.20	1.20	60

本表は、昭和34年7月24日厚生大臣の諮問機関である栄養審議会より厚生大臣に答申されたもの。栄養価の算出に当つては、昭和32年度国民栄養調査成績を基礎として食品群別摂取量と各栄養素との比率を求め、昭和37年の目標量にこの比率を乗じて算出したもの。

厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績」昭和34年12月刊による。

表25 児童、生徒の1人1日当り所要熱量および推定食費

年齢	一般世帯				被保護世帯			
	所要熱量(Cal)		食費(円)		所要熱量(Cal)		食費(円)	
	標準量A	一般水準B	Aによる	Bによる	標準量C	一般水準D	Cによる	Dによる
男								
0	720	-	-	-	720	-	-	-
1	1,060	560	42.50	23.80	1,060	560	31.80	16.80
2	1,280	800	54.50	34.00	1,280	800	38.40	24.00
3	1,420	980	60.50	41.70	1,420	980	42.60	29.40
4	1,500	1,130	63.80	48.00	1,500	1,130	45.00	33.90
5	1,560	1,280	66.30	54.50	1,560	1,280	46.80	38.40
6	1,690	1,420	71.90	60.40	1,690	1,420	50.70	42.60
7	1,770	1,570	75.20	66.60	1,770	1,570	53.10	47.10
8	1,830	1,730	77.80	73.40	1,830	1,730	54.90	51.90
9	1,900	1,900	80.80	80.80	1,900	1,900	57.00	57.00
10	1,950	2,100	82.90	89.30	1,950	2,100	58.50	63.00
11	2,030	2,280	86.40	97.00	2,030	2,280	60.90	63.80
12	2,130	2,480	90.50	105.30	2,130	2,480	63.80	74.30
13	2,250	2,660	95.70	113.00	2,250	2,660	67.50	79.80
14	2,490	2,800	106.00	119.00	2,490	2,800	74.70	84.00
15	2,580	2,960	109.70	125.90	2,580	2,960	77.40	88.80
16	2,630	3,100	111.80	131.80	2,630	3,100	78.90	93.00
女								
0	680	-	-	-	680	-	-	-
1	980	360	41.70	15.30	980	360	29.40	10.80
2	1,180	610	50.20	25.90	1,180	610	36.40	18.30
3	1,320	860	56.10	36.60	1,320	860	39.60	25.80
4	1,400	1,090	59.50	46.40	1,400	1,090	42.00	32.70
5	1,460	1,260	62.10	53.60	1,460	1,260	43.80	37.80
6	1,590	1,410	67.60	60.00	1,590	1,410	47.70	42.30
7	1,640	1,540	69.80	65.50	1,640	1,540	49.20	46.20
8	1,700	1,680	72.40	71.50	1,700	1,680	51.00	50.40
9	1,750	1,750	74.50	74.50	1,750	1,750	52.50	52.50
10	1,830	1,830	77.90	77.90	1,830	1,830	54.90	54.90
11	1,930	1,930	82.10	82.10	1,930	1,930	57.90	51.90
12	2,040	2,040	86.80	86.80	2,040	2,040	61.20	61.20
13	2,110	2,110	89.70	89.70	2,110	2,110	63.30	63.30
14	2,230	2,230	94.90	94.90	2,230	2,230	66.90	66.90
15	2,310	2,310	94.90	98.20	2,310	2,310	66.90	69.30
16	2,390	2,390	94.50	101.40	2,220	2,390	66.60	71.70

A、Cは厚生省栄養食糧審議会決定、B、Dは労働科学研究所の調査(過去を含む) A、Bは4.25円/100Calとして、C、Dは3.00円/100Calとして算出したもの。
 厚生大臣官房総務課「児童の生計費に関する研究(社会保障資料No.13)」昭和27年1月刊による。

表 2 6 男女、年齢（5歳階級）別血圧平均値および標準偏差(昭和33年)

(1) 男

(単位 mmHg)

年齢階級	全 国								生産者世帯(1)	
	最 高 血 圧				最 低 血 圧				最 高 血 圧	
	5 月		1 1 月		5 月		1 1 月		平 均 値	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	5 月	1 1 月
20-24	127	15	126	15	75	13	74	14	130	128
25-29	127	16	127	16	76	13	76	13	129	128
30-34	128	16	127	16	77	14	75	14	129	128
35-39	127	18	127	17	78	15	77	14	128	127
40-44	129	18	129	18	81	16	80	14	128	128
45-49	135	22	131	20	83	16	80	15	136	131
50-54	141	26	137	25	85	18	84	17	144	136
55-59	149	30	146	28	89	18	87	18	151	144
60-64	154	31	150	30	89	17	87	18	155	149
65-69	157	31	155	29	89	19	88	18	158	156
70 <	163	30	158	27	90	19	87	17	166	159

年齢階級	生産者世帯		消費者世帯 (2)				その他の世帯			
	最 低 血 圧		最 高 血 圧		最 低 血 圧		最 高 血 圧		最 低 血 圧	
	平 均 値		平 均 値		平 均 値		平 均 値		平 均 値	
	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月	5 月	1 1 月
20-24	76	73	125	125	75	74	135	130	78	75
25-29	76	76	126	126	76	75	128	130	74	78
30-34	77	74	126	126	77	76	127	122	78	76
35-39	77	76	127	127	78	78	125	123	72	76
40-44	78	78	130	130	82	81	132	130	82	83
45-49	83	79	133	131	83	81	140	138	88	83
50-54	85	81	139	138	86	76	142	136	85	86
55-59	89	86	147	147	88	89	157	144	96	87
60-64	89	86	153	152	89	89	154	152	91	88
65-69	91	90	156	152	87	87	164	161	92	89
70 <	91	87	158	155	88	87	165	159	90	87

昭和33年度国民栄養調査のうち、5月および11月に実施された血圧、脈はく数調査の結果。この調査は、国民全体を対象として行われるが、実施に当っては標本抽出法によって抽出された地区の全世帯およびその構成員を調査の客体としている。標本抽出法は、昭和32年4月15日において実施された厚生行政基礎調査の標本を親標本として全国で180地区を無作為抽出したもの。(次頁に)

表26 男女、年齢(5歳階級)別血圧平均値および標準偏差(昭和33年)

(2) 女

(単位 mmHg)

年齢階級	全 国								生産者世帯(1)	
	最 高 血 圧				最 底 血 圧				最 高 血 圧	
	5 月		11月		5 月		11月		平 均 値	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	5 月	11月
20-24	122	15	120	13	73	13	72	13	124	122
25-29	122	16	121	15	74	14	73	13	124	122
30-34	122	15	120	14	75	13	73	13	124	122
35-39	124	17	122	17	78	13	75	13	126	122
40-44	130	22	127	19	81	15	78	14	130	126
45-49	136	24	132	23	84	17	81	15	138	131
50-54	142	28	138	24	86	18	84	15	145	138
55-59	147	28	142	28	88	17	84	17	146	141
60-64	156	29	150	28	90	17	87	17	158	151
65-69	162	31	156	30	91	16	87	16	165	160
70 ≤	170	31	164	30	93	19	90	19	170	164

年齢階級	生産者世帯		消費者世帯(2)				その他の世帯			
	最低血圧		最高血圧		最低血圧		最高血圧		最低血圧	
	平均値		平均値		平均値		平均値		平均値	
	5 月	11月	5 月	11月	5月	11月	5 月	11月	5月	11月
20-24	74	73	120	119	72	72	120	121	79	73
25-29	75	73	121	120	73	72	122	123	78	74
30-34	77	74	121	119	74	73	124	121	76	76
35-39	78	74	123	121	77	75	122	124	79	80
40-44	80	76	130	127	81	79	138	134	84	80
45-49	84	80	135	133	84	82	140	132	89	82
50-54	87	83	140	137	85	84	144	140	90	87
55-59	87	83	147	144	87	85	158	149	97	86
60-64	89	86	154	150	91	88	154	155	95	89
65-69	92	88	158	152	89	87	169	164	94	96
70 ≤	93	91	170	164	92	90	177	167	97	87

調査世帯は原則として一年間変更しないものとし、当該地区より転出またはその他の理由で調査不能となった場合は欠とし、新たに転入してきた世帯については対象外としている。厚生省公衆衛生局栄養課編「国民栄養の現状、昭和33年度国民栄養調査成績」昭和34年12月刊による。

(1) 耕地面積3反(北海道は5反)以上の世帯。(2) 耕地を全く有しない世帯。

表27 男女、年齢（5歳階級）別血圧平均値および標準偏差
（昭和32年）

（単位mg）

年齢階級	最高血圧				最低血圧			
	5月 平均値	標準偏差	11月 平均値	標準偏差	5月 平均値	標準偏差	11月 平均値	標準偏差
男								
20-24	123	15	123	14	71	13	70	13
25-29	123	15	124	15	72	13	71	13
30-34	122	16	121	15	73	14	71	13
35-39	123	17	121	16	74	14	72	13
40-44	125	19	123	19	76	14	73	14
45-49	131	22	128	22	79	15	77	16
50-54	136	25	133	23	82	16	79	16
55-59	142	27	136	25	83	17	81	15
60-64	146	29	144	29	86	20	83	18
65-69	153	28	147	29	87	16	82	18
70 ≦	157	29	154	28	87	18	84	17
女								
20-24	117	16	117	14	70	14	68	13
25-29	119	15	117	15	71	14	69	13
30-34	119	16	117	15	72	14	69	13
35-39	122	18	119	17	74	13	71	13
40-44	126	20	123	18	76	15	74	13
45-49	132	24	127	22	80	16	76	15
50-54	138	27	133	25	83	18	78	16
55-59	145	28	138	27	85	18	81	16
60-64	149	29	144	28	87	20	82	18
65-69	156	30	148	29	86	17	81	17
70 ≦	164	30	156	29	89	20	84	18

前表と同様国民栄養調査結果で、厚生省公衆衛生局編「国民栄養の現状、昭和32年度国民栄養調査成績」昭和33年11月刊による。

第28表 男女、年齢（5歳階級）別血圧平均値（昭和31年）

（単位mg）

年齢階級	男				女			
	最高血圧 5月	最低血圧 11月	最高血圧 5月	最低血圧 11月	最高血圧 5月	最低血圧 11月	最高血圧 5月	最低血圧 11月
20-24	124	122	70	70	117	115	69	68
25-29	123	121	71	70	118	115	69	68
30-34	122	121	71	71	118	116	71	70
35-39	123	122	73	73	121	119	73	71
40-44	126	126	76	76	123	123	76	74
45-49	130	129	79	78	131	128	79	78
50-54	134	135	80	80	137	133	81	78
55-59	138	137	82	81	144	140	85	83
60-64	148	148	84	85	149	145	84	83
65-69	151	150	84	84	154	147	86	82
70 ≦	155	155	83	86	160	155	89	85

本表も国民栄養調査の結果、厚生省公衆衛生局編「国民栄養の現状、昭和31年度国民栄養調査成績」昭和32年12月刊による。

表 2 9 年次別学齡児童、生徒の男女別就学免除および就学猶予者
(昭和 2 5 年 - 3 3 年)

年次	児童(6~11歳)			生徒(12~14歳)			総数	計	
	総数	男	女	総数	男	女		男	女
就学免除者									
実数									
昭和 2 5	4206	2255	1951	1922	966	956	6128	3221	2907
2 6	3741	2054	1687	1820	954	866	5561	3008	2553
2 7	5349	2913	2436	2740	1423	1225	8097	4336	3761
2 8	4062	2150	1912	2241	1129	1112	6303	3279	3024
2 9	4216	2295	1921	2468	1298	1170	6604	3593	3091
3 0	4241	2270	1971	2187	1167	1020	6428	3437	2991
3 1	4919	2678	2241	2201	1211	1090	7220	3889	3331
3 2	5757	3189	2568	2290	1220	1070	8047	4409	3638
3 3	6400	3497	2903	2076	1122	954	8476	4619	3857
率(児童・生徒各100.000につき)									
昭和 2 5	376	398	353	360	357	364	371	384	357
2 6	327	355	299	355	367	342	336	359	313
2 7	480	516	443	541	563	529	499	527	470
2 8	362	378	346	432	419	435	384	394	374
2 9	359	364	332	436	452	419	384	406	361
3 0	346	364	327	372	391	351	354	373	335
3 1	390	417	362	386	401	371	389	412	365
3 2	444	482	405	403	421	379	431	464	397
3 3	474	498	439	398	425	371	453	485	420
就学猶予者									
実数									
昭和 2 5	24956	13339	11617	2888	1463	1425	27844	14802	13042
2 6	21588	11504	10084	2275	1135	1140	23863	12639	11224
2 7	19113	10320	8793	2429	1138	1291	21542	11466	10076
2 8	22660	11964	10696	2385	1166	1219	25045	13130	11915
2 9	24319	12981	11338	2386	1312	1074	26705	14293	12412
3 0	23697	12757	10940	2505	1427	1078	26202	14184	12018
3 1	22463	12262	10201	2578	1517	1061	25041	13779	11262
3 2	20736	11265	9471	1858	1056	802	22594	12321	10275
3 3	19310	10676	8634	1463	790	673	20773	11466	9307
率(児童・生徒各100.000につき)									
昭和 2 5	2230	2354	2103	542	541	542	1685	1768	1600
2 6	1870	1989	1789	444	437	450	1442	1508	1374
2 7	1714	1829	1597	478	442	516	1328	1395	1259
2 8	2019	2101	1934	460	444	476	1526	1577	1473
2 9	2070	2174	1962	421	457	385	1533	1616	1448
3 0	1932	2044	1816	426	479	371	1444	1538	1346
3 1	1780	1907	1649	432	502	361	1348	1458	1234
3 2	1600	1704	1492	325	365	284	1210	1296	1120
3 3	1431	1550	1307	281	292	262	1111	1203	1014

文部省調査局統計課「学校基本調査報告」の昭和 2 5 - 3 3 各年度分による。
次表の注参照。

表30 年次別学齢児童、生徒の男女、理由別就学免除者(昭和30年-33年)

理 由	男				女			
	昭33	昭32	昭31	昭30	昭33	昭32	昭31	昭30
学 齢 児 童								
実 数								
総 数	3,497	3,189	2,678	2,270	2,903	2,568	2,241	1,971
し 体 不 自 由	283	826	882	718	821	720	694	547
虚 弱(病弱)	557	593	457	415	480	442	420	406
精 神 薄 弱	1,602	1,299	1,110	909	1,316	1,046	945	821
教 護 院・少年院 にあるため	28	27	43	42	14	6	15	21
そ の 他	327	444	186	186	272	354	167	176
割 合(総数100.0につき)								
総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
し 体 不 自 由	28.1	25.9	32.9	31.6	28.3	28.0	31.0	27.7
虚 弱(病弱)	15.9	18.6	17.1	18.3	16.5	17.2	18.7	20.6
精 神 薄 弱	45.8	40.7	41.4	40.0	45.3	40.7	42.2	41.7
教 護 院・少年院 にあるため	0.8	0.9	1.6	1.9	0.5	0.2	0.7	1.1
そ の 他	9.4	13.9	6.9	8.2	9.4	13.8	7.5	8.9
学 齢 生 徒								
実 数								
総 数	1,122	1,220	1,211	1,167	954	1,070	1,094	1,020
盲 および 弱 視	—	—	—	40	—	—	—	27
ろう および 難 聴	—	—	—	55	—	—	—	64
し 体 不 自 由	214	228	263	222	221	223	222	190
虚 弱(病弱)	169	177	189	171	166	156	201	168
精 神 薄 弱	561	587	593	496	475	562	559	479
教 護 院・少年院 にあるため	66	87	87	111	17	24	26	31
そ の 他	112	141	79	72	75	105	86	61
割 合(総数100.0につき)								
総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
盲 および 弱 視	—	—	—	3.4	—	—	—	2.6
ろう および 難 聴	—	—	—	4.7	—	—	—	6.3
し 体 不 自 由	19.1	18.7	21.7	19.0	23.2	20.8	20.3	18.6
虚 弱(病弱)	15.1	14.5	15.6	14.7	17.4	14.6	18.4	16.5
精 神 薄 弱	50.0	48.1	49.0	42.5	49.8	52.5	51.1	47.0
教 護 院・少年院 にあるため	5.9	7.1	7.2	9.5	1.8	2.2	2.4	3.0
そ の 他	10.0	11.6	6.5	6.2	7.9	9.8	7.9	6.0

文部省調査局統計課「学校基本調査報告 巻」昭和30-33の各年度分による。学校基本調査は、昭和23年以降統計法による指定統計第13号として、学校基本調査規則および実施要領に基づき全国の学校について基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得る目的で毎年継続的に実施されている。

表31 年次別学齢児童、生徒の男女、理由別就学猶予者(昭和30年-33年)

理 由	男				女			
	昭33	昭32	昭31	昭30	昭33	昭32	昭31	昭30
学 齢 児 童								
実 数								
総 数	10,676	11,265	12,262	12,757	8,634	9,471	10,201	10,940
盲および弱視	145	137	154	146	121	99	111	119
ろうおよび難聴	276	287	265	324	246	247	239	244
し体不自由	1,717	1,671	1,753	1,676	1,551	1,559	1,490	1,502
虚 弱(病弱)	4,530	5,384	6,115	6,952	3,727	4,767	5,226	6,117
精 神 薄 弱	2,990	2,714	2,669	2,425	2,195	1,992	2,128	2,030
教護院・少年院 にあるため	80	124	228	253	23	35	82	89
そ の 他	938	948	1,078	981	770	772	925	839
割 合(総数100.0につき)								
総 数	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
盲および弱視	1.4	1.2	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1
ろうおよび難聴	2.6	2.6	2.2	2.5	2.8	2.6	2.3	2.2
し体不自由	16.1	14.8	14.3	13.1	18.0	16.5	14.6	13.7
虚 弱(病弱)	42.4	47.8	49.9	54.5	43.2	50.3	51.2	55.9
精 神 薄 弱	28.0	24.1	21.8	19.0	25.4	21.0	20.9	18.6
教護院・少年院 にあるため	0.7	1.1	1.9	2.0	0.3	0.4	0.8	0.8
そ の 他	8.8	8.4	8.8	7.7	8.9	8.2	9.1	7.7
学 齢 生 徒								
実 数								
総 数	790	1,056	1,517	1,427	673	802	1,061	1,078
盲および弱視	14	10	19	14	13	12	15	19
ろうおよび難聴	25	22	26	31	24	14	29	23
し体不自由	96	115	129	129	97	105	91	114
虚 弱(病弱)	233	312	461	471	266	338	467	463
精 神 薄 弱	146	184	193	215	129	174	170	204
教護院・少年院 にあるため	174	315	558	441	48	63	142	116
そ の 他	102	98	131	126	96	96	147	139
割 合(総数100.0につき)								
総 数	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
盲および弱視	1.8	0.9	1.3	1.0	1.9	1.5	1.4	1.8
ろうおよび難聴	3.2	2.1	1.7	2.2	3.6	1.7	2.7	2.1
し体不自由	12.1	10.9	8.5	9.0	14.4	13.1	8.6	10.6
虚 弱(病弱)	29.5	29.5	30.4	33.0	39.5	42.1	44.0	42.9
精 神 薄 弱	18.5	17.4	12.7	15.1	19.2	21.7	16.0	18.9
教護院・少年院 にあるため	22.0	29.8	36.8	30.9	7.1	7.9	13.4	10.8
そ の 他	12.9	9.3	8.6	8.8	14.3	12.0	13.9	12.9

前表と同様。文部省「学校基本調査報告書」昭和30年度～昭和33年度分による。

表32 一般検診による年次別小学校児童の男女別、疾病異常別被患率
(昭和24年-33年)

(1) 男

疾病異常	昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄養要注意	197	179	177	155	142	219	139	131	101	094
せき部異	142	131	143	124	125	120	102	110	091	093
伝染性の皮膚疾	120	114	137	112	125	126	128	123	124	117
	172	172	256	236	256	284	273	247	285	279
眼	近視	498	748	690	808	944	930	854	880	886
	遠視	016	022	041	031	050	048	040	024	024
	乱視	004	006	005	009	012	013	015	013	013
	弱視	029	043	022	055	054	059	044	042	045
	色覚異常	121	186	132	163	251	275	280	274	303
ト	480	502	473	622	516	492	432	394	415	381
耳	難聴	054	052	045	064	060	053	052	036	038
	中耳炎	102	105	120	116	105	105	088	080	078
鼻	アレルギー	031	043	059	081	103	108	134	094	109
	蓄膿症	016	018	028	-	065	074	104	112	117
	頭	676	730	858	867	990	980	1094	1062	1137
歯	乳歯を完了している者	121	145	144	247	227	216	281	276	30
	未乳歯のある者	4118	4087	4010	4241	4892	5661	6236	6672	737
	計	4239	4332	4154	4488	5119	5877	6517	6948	767
学校で実施した結核検査	呼吸器系	035	036	083	109	100	089	096	093	069
	その他	037	032	043	040	040	009	003	004	041
	計	072	068	096	149	110	098	099	097	080
寄身精運	虫虚弱	065	045	021	-	320	249	041	016	016
	体虚弱	059	053	045	059	060	072	065	067	047
	神経衰弱	031	028	022	036	040	045	038	036	043
	機能障害	033	033	028	043	391	039	038	037	037
ツベルクリン皮内反応検査	陽性	-	-	-	4125	5185	5435	5778	5811	592
	疑陽性	-	-	-	1113	1013	1058	1076	1060	110
	陰性	-	7325	7040	4762	3801	3506	3146	3129	298
寄生虫卵検	有	6391	6354	5808	5534	4930	4292	3876	3306	297
	養	372	352	358	390	400	298	291	267	227

指定統計第15号学校衛生統計調査における結果で、各年とも4月中に実施される学校身体検査の終了の日を調査期日として、全国で小学校は1/8を目標として都道府県ごとに抽出率を定め、抽出した標本調査による。
(次頁に)

表32 一般校診による年次別小学校児童の男女別、疾病異常別被患率(昭和24年-33年)

(2) 女

疾病異常		昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄養注意	1.87	1.71	1.72	1.51	1.39	1.42	1.36	1.32	0.94	0.93	
せき柱異常	1.12	0.97	1.02	0.82	0.85	0.87	0.76	0.81	0.69	0.68	
胸郭異常	1.01	0.91	1.04	0.80	0.91	0.90	0.90	0.89	0.83	0.81	
伝染性の皮膚疾患	1.20	1.12	1.52	1.57	1.63	1.80	1.77	1.56	1.81	1.75	
眼	近視	5.92	8.97	8.57	9.90	11.59	11.19	11.27	10.14	10.45	10.73
	遠視	0.15	0.17	0.07	0.23	0.41	0.42	0.30	0.20	0.26	0.24
	乱視	0.04	0.06	0.07	0.10	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13
	弱視	0.31	0.48	0.26	0.57	0.56	0.61	0.48	0.48	0.47	0.40
	色覚異常	0.22	0.30	0.14	0.23	0.33	0.39	0.36	0.28	0.33	0.32
	トラホーム	5.37	5.63	5.46	7.12	5.95	5.78	5.02	4.68	4.93	4.66
耳	難聴	0.42	0.38	0.31	0.43	0.44	0.41	0.39	0.28	0.30	0.29
	中耳炎	0.64	0.66	0.68	0.73	0.66	0.67	0.57	0.49	0.51	0.43
鼻のおんよび	アデノイド	0.29	0.37	0.53	0.74	0.92	0.84	1.18	0.77	0.92	0.71
	蓄膿症	0.13	0.14	0.22	1.98	0.59	0.57	0.81	0.86	0.93	0.93
	へんとうせん肥大	6.82	7.27	8.43	8.62	9.86	9.58	10.79	10.40	11.13	10.29
むし歯	処置を完了している者	1.20	1.56	1.56	2.85	2.64	2.69	3.34	3.47	3.8	4.7
	未処置歯のある者	40.55	40.61	40.18	43.18	50.09	58.14	64.53	68.03	77.7	76.4
	計	41.75	42.17	41.74	46.03	52.73	60.83	67.87	71.50	81.5	81.1
学校で実施した結核検査	呼吸器系	0.35	0.32	0.86	0.92	0.90	0.80	0.82	0.87	0.62	0.71
	その他	0.39	0.27	0.12	0.07	0.10	0.10	0.05	0.04	0.11	0.02
	計	0.74	0.59	0.98	0.99	1.00	0.90	0.85	0.91	0.73	0.73
寄生虫	虫病	0.63	0.42	0.22	—	3.20	0.66	0.34	0.16	0.17	0.10
	虚弱	0.60	0.52	0.48	0.61	0.64	0.74	0.70	0.73	0.52	0.49
	精神薄弱	0.22	0.21	0.19	0.27	0.29	0.36	0.30	0.31	0.37	0.35
	運動機能障害	0.29	0.29	0.24	0.39	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30
ツベルクリン皮内反応検査	陽性	—	—	—	47.58	58.81	60.05	63.12	63.66	64.3	65.2
	疑陽性	—	—	—	11.08	9.35	9.51	9.67	9.40	9.9	10.1
	陰性	—	70.52	66.10	41.34	31.83	30.44	27.21	26.94	25.8	24.7
寄生虫卵保有要養	卵保有	63.89	63.31	57.88	54.94	48.20	41.48	37.78	31.88	28.8	24.8
	要養	3.56	3.39	3.65	3.86	3.90	2.93	2.87	2.54	2.39	2.09

疾病異常の被患率とは受検者数100.00に対する疾病異常の件数。

文部省調査局統計課「学校衛生統計報告書、昭和33年度」昭和34年7月刊による。

表33 一般検診による年次別中学校生徒の男女別、疾病異常別罹患率（昭和24年—33年）

(1) 男

疾 病 異 常		昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄 養 要 注 意 せ き 柱 異 常 胸 郭 異 常 伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		1.58	1.44	1.35	1.14	1.18	1.02	0.98	0.78	0.72	0.71
		1.25	1.16	1.36	1.01	0.98	0.92	0.91	0.88	0.75	0.72
		0.85	0.76	0.90	0.66	0.83	0.61	0.66	0.57	0.61	0.56
		1.24	1.31	2.44	1.89	1.88	2.62	2.02	1.99	2.19	2.25
眼	近 視	7.89	7.88	8.47	9.31	11.34	127.0	13.56	13.04	15.41	15.10
	遠 視	0.47	0.45	0.22	0.66	0.94	0.83	0.84	0.46	0.52	0.64
	乱 視	0.11	0.10	0.09	0.18	0.30	0.26	0.26	0.25	0.27	0.31
	弱 視	0.66	0.64	0.87	1.19	0.86	0.76	0.81	0.74	0.87	0.79
	色 弱	2.23	2.40	2.58	2.81	3.29	3.44	3.53	3.48	3.77	3.87
	ト ラ ホ ー ム	4.24	4.56	5.01	5.80	5.82	5.25	4.92	4.21	4.22	3.96
耳	難 聴	0.71	0.71	0.75	0.82	0.86	0.86	0.92	0.71	0.75	0.73
	中 耳 炎	0.61	0.66	0.75	0.97	0.97	0.93	0.98	0.88	0.98	0.88
鼻 おん よび 頭	ア デ ノ イ ド	0.19	0.22	0.13	0.28	0.32	0.38	0.29	0.40	0.18	0.20
	蓄 の う 症	0.25	0.33	0.62	—	1.20	1.11	1.51	1.62	1.80	1.86
	へんとうせん肥大	5.75	6.21	7.28	7.06	7.88	7.45	7.73	7.72	7.72	7.72
む し 歯	処置を完了している者	4.17	4.48	4.26	4.61	4.03	4.38	5.98	6.87	7.0	9.2
	未処置歯のある者 計	33.54 37.71	35.74 40.22	33.69 37.95	31.79 36.40	32.46 36.49	36.17 40.55	38.78 44.76	40.15 47.02	49.4 57.2	51.0 60.2
学校で実施 した結核検 査	呼吸器系	0.26	0.30	0.86	0.86	0.80	0.60	0.69	0.59	0.49	0.58
	その他 計	0.26 0.52	0.23 0.53	0.07 0.93	0.06 0.92	0.04 0.84	0.02 0.62	0.03 0.72	0.03 0.62	0.08 0.57	0.01 0.59
寄 生 虫 病 身 体 虚 弱 筋 神 薄 弱 運 動 機 能 障 害		0.69	0.48	0.12	—	3.00	2.18	0.45	0.16	0.13	0.14
		0.44	0.43	0.28	0.44	0.53	1.20	0.41	0.39	0.41	0.36
		0.19	0.16	0.25	0.31	0.35	0.45	0.39	0.42	0.47	0.50
		0.28	0.28	0.31	0.42	0.36	0.39	0.38	0.34	0.38	0.37
ツベルクリン 皮内反応検査	陽 性	—	—	—	57.80	68.01	72.38	76.02	75.37	76.9	78.0
	疑 陽 性	—	—	—	13.33	11.55	10.99	10.05	10.20	10.3	10.0
	陰 性	—	49.55	46.48	28.86	20.43	16.63	13.93	14.43	12.8	12.0
寄 生 虫 卵 保 有 要 養 護		58.37	59.36	53.2	52.47	46.60	40.98	35.36	30.91	27.1	21.8
		2.47	2.27	1.73	2.29	2.90	1.78	1.93	1.67	1.77	2.02

学校衛生統計調査（指定統計第15号）による結果で、各年次とも4月中に実施される学校身体検査の終了の日を調査期日として、全国で中学校は1/4を目標として都道府県ごとに抽出率を定め、抽出した標本調査。（次頁に）

表33 一般検診による年次別中学校生徒の男女別、疾病異常別被患率(昭和24年-33年)

(2) 女

疾病異常			昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄養 せき 胸 伝	要 柱 郭 の	注 異 異 皮膚疾	1.43	1.32	1.46	1.07	1.17	0.95	0.89	0.72	0.63	0.62
			0.92	0.84	1.13	0.76	0.76	0.74	0.72	0.70	0.66	0.58
			0.69	0.61	0.65	0.50	0.60	0.47	0.48	0.38	0.40	0.37
			0.89	0.90	1.60	1.24	1.20	1.59	1.33	1.08	1.23	1.22
眼	近 遠 乱 弱 色 ト	視 視 視 視 神 ホ	9.86	9.85	10.57	11.70	14.38	15.25	16.86	16.91	18.68	18.87
			0.34	0.34	0.20	0.49	0.67	0.69	0.63	0.35	0.42	0.47
			0.11	0.11	0.10	0.18	0.30	0.29	0.32	0.28	0.33	0.37
			0.72	0.72	1.06	1.35	1.03	1.03	0.97	0.88	0.97	1.00
			0.43	0.43	0.45	0.39	0.47	0.49	0.46	0.40	0.48	0.41
4.86	5.28	5.79	6.88	6.77	5.91	5.57	4.87	4.85	4.54			
耳	難 中	聴 炎	0.49	0.49	0.50	0.57	0.61	0.62	0.65	0.52	0.54	0.56
			0.43	0.46	0.53	0.62	0.68	0.65	0.70	0.63	0.73	0.63
鼻 お よ と び う	ア 蓄 へん	デ の とう	0.15	0.21	0.18	0.24	0.34	0.37	0.29	0.35	0.17	0.17
			0.25	0.28	0.60	—	0.93	0.99	1.32	1.38	1.57	1.75
			6.68	7.15	8.35	8.07	9.01	8.36	8.44	8.43	8.49	8.33
む し 歯	処置を完了している者		4.87	5.31	5.05	5.43	5.01	5.59	7.43	8.32	9.9	11.5
	未処置歯のある者		36.18	38.60	35.71	35.00	35.25	39.62	42.51	44.72	53.1	56.1
	計		41.05	43.91	40.76	40.43	40.26	45.21	49.94	53.04	63.0	67.6
学校で実施 した結核検 査	呼 吸 器 系 そ の 他 計	0.32	0.26	0.82	0.74	0.70	0.58	0.67	0.54	0.48	0.56	
		0.30	0.21	0.06	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.01	
		0.62	0.47	0.88	0.80	0.73	0.60	0.70	0.57	0.56	0.57	
寄 身 精 運	生 体 神 動	虫 虚 薄 能	0.69	0.48	0.09	—	3.30	0.85	0.48	0.18	0.13	0.15
			0.45	0.42	0.30	0.49	0.54	0.55	0.45	0.42	0.48	0.41
			0.12	0.11	0.13	0.22	0.27	0.36	0.28	0.34	0.39	0.43
0.22	0.24	0.20	0.37	0.31	0.34	0.32	0.31	0.37	0.33			
ツベルクリン 皮内反応検査	陽 疑 陰	性 陽 性 陰 性	—	—	—	61.10	71.48	74.96	77.06	76.38	77.1	77.9
			—	—	—	13.48	11.15	10.40	9.80	9.87	10.3	9.8
			—	47.71	43.32	25.42	17.37	14.64	13.14	13.75	12.6	12.3
寄 生 虫 卵 保 有 率	虫 養 護	58.62	59.15	55.27	53.08	47.20	41.30	36.07	31.12	27.6	22.3	
		2.43	2.32	1.67	2.34	2.90	1.72	2.05	1.56	1.39	1.38	

疾病異常の被患率とは受検者数100.00に対する疾病異常の件数。
文部省調査局統計課「学校衛生統計報告書、昭和33年度」昭和34年7月刊による。

表34 一般校診による年次別高等学校生徒の男女別、疾病異常別被患率(昭和24年-33年)

(1) 男

疾病異常			昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄養 せき 胸郭 伝染性	注意 異常 常 患	要柱異	1.04	0.90	0.63	0.68	0.85	0.65	0.67	0.48	0.40	0.32
		注異	0.82	0.68	0.61	0.62	0.69	0.66	0.57	0.59	0.56	0.45
		異常	0.73	0.61	0.62	0.58	0.66	0.58	0.58	0.51	0.45	0.42
		皮膚疾患	0.28	0.27	0.38	0.36	0.32	0.31	0.35	0.39	0.29	0.28
眼	視 視 視 視 異常 ム	近視	10.81	10.71	11.53	13.76	17.87	20.23	22.00	23.70	25.78	26.94
		遠視	0.36	0.39	0.32	0.56	0.82	0.54	0.68	0.45	0.46	0.42
		乱視	0.27	0.24	0.28	0.34	0.56	0.60	0.75	0.63	0.73	0.89
		弱視	0.82	0.79	0.74	1.27	1.15	1.18	0.96	1.15	1.14	0.88
		色覚異常	2.17	2.34	2.87	2.73	3.19	3.27	3.43	3.57	3.75	3.83
		トヲホー	1.76	1.92	2.20	3.18	2.92	2.97	3.26	2.86	2.73	2.53
耳	難聴 中耳炎	難聴	0.42	0.42	0.50	0.42	0.46	0.51	0.48	0.48	0.44	0.43
		中耳炎	0.33	0.37	0.52	0.61	0.55	0.65	0.66	0.72	0.79	0.73
鼻 おん よ頭 び	アデノイド 蓄膿症 へんとうせん肥大	アデノイド	0.06	0.08	0.15	0.14	0.20	0.12	0.06	0.09	0.07	0.10
		蓄膿症	0.50	0.55	1.03	—	1.65	2.22	1.92	2.08	2.02	2.03
		へんとうせん肥大	2.84	3.21	3.36	4.25	4.89	4.59	5.02	5.11	4.67	4.58
むし 歯	処置を完了している者 未処置歯のある者 計	処置を完了している者	14.79	15.70	10.35	12.47	10.76	10.33	10.09	10.34	12.3	13.9
		未処置歯のある者	41.01	43.98	42.42	39.98	40.70	39.42	39.73	42.18	43.4	46.0
		計	55.80	59.68	52.77	52.45	51.46	49.75	49.82	52.52	55.7	59.9
学校で実施 した結核検 査	呼吸器系 その他 計	呼吸器系	0.61	0.51	0.67	0.75	0.80	0.65	0.72	0.58	0.48	0.54
		その他	0.38	0.34	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.06	0.01
		計	0.99	0.85	0.69	0.79	0.84	0.68	0.74	0.60	0.54	0.55
寄 身 精 運 動	生虫 体虚 神薄 機能障害	生虫	0.53	0.35	0.10	—	2.80	1.06	0.50	0.12	0.08	0.11
		体虚	0.23	0.21	0.10	0.17	0.20	0.20	0.19	0.11	0.12	0.09
		神薄	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	—	0.04	0.02
		機能障害	0.13	0.13	0.15	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.19
ツベルクリン 皮内反応検査	陽性 疑陽性 陰性	陽性	—	—	—	69.33	78.65	81.91	85.22	85.68	86.3	86.6
		疑陽性	—	—	—	11.97	9.21	8.52	7.12	6.97	6.9	7.0
		陰性	—	32.87	31.89	18.70	12.12	9.57	7.66	7.36	6.8	6.4
寄 生 虫 要 養	卵保護	卵保護	49.03	50.93	48.70	47.67	38.90	33.65	27.53	22.98	20.5	17.1
		要養	1.14	1.17	1.00	1.13	1.90	1.00	1.63	1.19	1.03	0.73

学校衛生統計調査(指定統計第15号)による結果で、各年次とも4月中に実施される学校身体検査の終了の日を調査期日として、全国で高等学校は $\frac{1}{2}$ を目標として都道府県ごとに抽出率を定め、抽出した標本調査(次頁に)

表34 一般検診による年次別高等学校生徒の男女別、疾病異常別被患率(昭和24年-33年)

(2) 女

疾病異常		昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄養要注	意	0.81	0.68	0.48	0.43	0.62	0.50	0.43	0.39	0.33	0.28
せき柱異	常	0.49	0.40	0.43	0.44	0.31	0.31	0.34	0.31	0.26	0.24
胸郭異	常	0.34	0.33	0.54	0.28	0.31	0.23	0.24	0.22	0.17	0.20
伝染性の皮膚疾患		0.19	0.12	0.12	0.15	0.11	0.21	0.11	0.18	0.11	0.10
眼	近視	13.51	12.70	13.86	15.36	19.31	21.73	24.20	25.92	27.43	28.88
	遠視	0.58	0.52	0.70	0.48	0.66	0.77	0.55	0.46	0.71	0.56
	乱視	0.23	0.28	0.37	0.30	0.54	0.66	0.69	0.74	0.75	0.85
	弱視	0.84	0.75	0.65	1.34	1.13	1.40	1.12	1.12	1.38	1.11
	色覚異常	0.22	0.22	0.25	0.24	0.29	0.28	0.28	0.28	0.31	0.29
トヲホーム	1.79	1.93	2.00	3.36	2.69	2.67	2.50	2.56	2.22	2.05	
耳	難聴	0.27	0.26	0.31	0.27	0.32	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35
	中耳炎	0.26	0.26	0.34	0.49	0.44	0.49	0.50	0.55	0.57	0.55
鼻いおんとよぶ	アデノイド	0.07	0.09	0.06	0.13	0.19	0.16	0.07	0.06	0.05	0.06
	蓄膿症	0.37	0.42	0.65	—	1.43	1.70	1.68	1.72	1.66	1.55
	へんとうせん肥大	5.02	4.79	5.09	5.65	6.09	5.05	5.86	5.59	5.61	5.12
むし歯	処置を完了している者	16.94	17.55	13.75	14.23	11.77	12.19	12.43	13.75	15.2	17.3
	未処置歯のある者	47.00	48.79	45.10	46.16	44.54	44.38	43.53	46.22	48.3	49.2
	計	63.94	66.34	58.85	60.39	56.31	56.57	55.96	59.97	63.5	66.5
学校で実施した結核検査	呼吸器系	0.59	0.46	0.72	0.62	0.70	0.60	0.59	0.50	0.42	0.51
	その他	0.31	0.23	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02
	計	0.90	0.69	0.77	0.68	0.74	0.63	0.61	0.52	0.47	0.53
寄身精神運動機能	寄生虫病	0.71	0.32	0.05	—	2.90	0.93	0.38	0.16	0.08	0.18
	虚弱	0.23	0.21	0.09	0.17	0.15	0.19	0.18	0.13	0.11	0.09
	薄弱	0.02	0.01	0.04	0.004	0.01	0.03	0.00	0.01	0.002	0.001
	障害	0.10	0.09	0.09	0.12	0.20	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13
ツベルクリン皮内反応調査	陽性	—	—	—	73.35	81.85	84.92	87.47	87.97	87.8	88.1
	疑陽性	—	—	—	9.88	7.47	6.42	5.55	5.35	5.6	5.6
	陰性	—	31.86	30.92	16.78	10.68	8.66	6.98	6.68	6.6	6.3
寄生虫卵保有要養	保護	52.03	48.57	46.41	46.54	39.30	33.51	27.74	23.46	21.1	17.2
		1.11	1.30	1.65	1.11	2.20	1.35	1.52	1.12	0.96	0.80

疾病異常の被患率とは受検者数100.00に対する疾病異常の件数。
 文部省調査局統計課「学校衛生統計報告書,昭和33年度」昭和34年7月刊による。

表 35. 一般検診による年次別大学学生の男女別、疾病異常別被患率 (昭和24年—33年)

(1) 男

疾 病 異 常		昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	1.08	0.96	0.76	0.71	0.61	0.47	0.28	0.22	0.16	0.61
胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	0.45	0.71	0.41	0.61	—	—	—	—	—	—
		0.87	0.60	0.40	0.51	—	—	—	—	—	—
		0.18	0.13	0.11	0.08	—	—	—	—	—	—
眼	近 視	24.07	21.53	22.78	25.31	26.79	28.50	30.92	35.00	36.58	38.09
	遠 視	0.60	0.35	0.16	0.66	1.10	1.56	0.75	0.60	0.44	0.41
	乱 視	0.62	0.48	0.53	0.65	0.52	0.78	0.75	0.82	1.09	0.99
	色 盲	2.49	2.13	2.38	2.52	2.48	2.71	3.31	3.15	3.36	3.36
	ト ラ ホ ー ム	0.80	0.68	0.88	1.17	1.06	0.93	0.81	0.70	0.71	0.62
耳	難 聴	0.35	0.30	0.26	0.26	0.32	0.29	0.24	0.16	0.19	0.13
	中 耳 炎	0.91	0.54	0.48	0.61	—	—	—	—	—	—
いんどう	アデノイド	0.34	0.12	0.11	0.05	—	—	—	—	—	—
	へんとうせん肥大	3.12	2.05	1.78	1.92	—	—	—	—	—	—
むし歯	処置を完了している者	24.60	28.14	27.20	25.49	30.10	29.30	24.88	26.48	26.10	24.19
	未処置歯のある者 計	43.18	40.91	44.10	45.58	44.51	42.03	43.69	43.79	43.04	42.22
		67.78	69.05	71.30	71.07	74.61	71.33	68.57	70.27	69.14	66.41
学校で実施した結核検査	呼吸器系	1.47	1.76	2.02	1.62	1.53	1.73	1.62	1.35	1.15	1.19
	その他	0.70	0.31	0.11	0.15	0.13	0.12	0.05	0.04	0.20	0.04
	計	2.17	2.07	2.13	1.77	1.66	1.85	1.67	1.39	1.35	1.23
ツベルクリン皮内反応検査	陽 性	—	—	—	82.18	86.20	87.54	90.34	91.13	91.46	92.56
	疑陽性	—	—	—	9.06	5.57	5.55	4.26	3.91	3.83	3.45
	陰 性	—	17.43	16.95	8.76	8.23	6.91	5.40	4.96	4.71	3.99

学校衛生統計調査(指定統計第15号)による結果で、各年とも4月中に実施される学校身体検査の終了の日を調査期日として、全国で大学は国・公・私立を問わず全部調査が行われている。

疾病異常の被患率とは、受検者数100.00に対する疾病異常の件数。

文部省調査局統計課「学校衛生統計報告書、昭和33年度」昭和34年7月刊による。

(次頁に)

表 35 一般検診による年次別大学生の男女別、疾病異常別被患率（昭和24年—33年）

(2) 女

疾 病 異 常		昭24	昭25	昭26	昭27	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
栄 養 要 注 意		1.12	0.82	1.02	0.55	0.55	0.52	0.57	0.36	0.26	0.33
せ き 柱 異 常		0.48	0.52	0.48	0.51	—	—	—	—	—	—
胸 郭 異 常		0.81	0.41	0.96	1.38	—	—	—	—	—	—
伝 染 性 の 皮 膚 疾 患		0.14	0.04	0.04	0.02	—	—	—	—	—	—
眼	近 視	20.53	21.58	21.31	22.76	24.08	27.63	28.33	30.46	32.73	35.83
	遠 視	0.99	0.75	0.63	0.66	0.99	0.62	0.81	1.10	0.83	0.80
	乱 視	0.45	0.54	0.38	0.66	0.71	1.09	0.81	0.95	1.16	1.10
	色 盲	0.20	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.09	0.12	0.10	0.08
	ト ラ ホ ー ム	0.58	0.60	0.52	0.85	0.62	0.69	0.65	0.56	0.41	0.36
耳	難 聴	0.16	0.19	0.11	0.17	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	—
	中 耳 炎	0.37	0.33	0.26	0.31	—	—	—	—	—	—
いんどう	アデノイド	0.38	0.14	0.05	0.12	—	—	—	—	—	—
	へんとうせん肥大	3.21	3.31	2.76	3.31	—	—	—	—	—	—
むし歯	処置を完了している者	23.25	28.60	27.19	28.20	30.25	30.26	29.55	26.77	28.13	29.34
	未処置歯のある者	41.66	44.62	45.39	44.86	44.82	43.46	42.11	42.51	41.55	41.50
	計	64.91	73.22	72.58	73.06	75.07	73.72	71.66	69.28	69.68	70.84
学校で実施した結核検査	呼吸器系	0.82	0.91	0.96	0.71	1.16	0.99	1.12	0.81	0.68	0.67
	その他	0.43	0.33	0.12	0.06	0.14	0.05	0.02	0.03	0.11	0.07
	計	1.25	1.24	1.08	0.77	1.30	1.04	1.14	0.84	0.79	0.74
ツベルクリン皮内反応検査	陽 性	—	—	—	83.36	86.80	88.86	91.24	91.47	92.34	93.02
	疑 陽 性	—	—	—	7.44	5.10	4.66	3.67	3.71	3.50	3.21
	陰 性	—	21.59	17.50	9.20	8.10	6.48	5.09	4.82	4.16	3.77

学校衛生統計調査は、生徒・児童・幼児および学生の発育状況ならびに健康状態および職員の健康状態を調査して学校衛生行政の基礎資料とすることを目的としている。

調査は、全国の学校における学徒および職員を対象としているが、小学校、中学校、高等学校および幼稚園については標本抽出法により、大学、特殊教育の学校については全部調査の方法により実施されているもの。

表36 精密検診による児童、生徒、学生の男女別、疾病異常別被患率(昭和33年、32年)

学校の 区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫 卵保有	寄生虫卵 保有のうち 十二指腸 虫卵検出	要 養 護	
	在籍者数に 対する被患率		学校が実施したX 線検査の被患率		陽 性		疑陽性	陰 性				
	全結核	呼吸器系	全結核	呼吸器系	既陽性	陽 転						
昭和33年												
総 数												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.37	0.33	0.77	0.68	8.0	18.0	11.0	63.0	19.0	1.33	0.43
	小学校	0.62	0.59	0.76	0.73	43.9	18.7	10.7	26.7	25.4	2.07	2.15
	中学校	0.56	0.54	0.58	0.57	66.1	11.8	9.9	12.2	22.1	2.57	2.00
	高等学校	0.60	0.58	0.54	0.53	78.8	8.5	6.4	6.3	17.2	2.52	0.76
	通定時制	0.61	0.59	0.54	0.53	79.2	8.2	6.3	6.3	17.1	2.53	0.77
	通定時制	0.59	0.57	0.53	0.51	76.1	10.2	6.5	7.2	17.6	2.29	0.69
男												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.38	0.33	0.79	0.68	7.6	17.2	10.9	64.3	18.1	1.25	0.46
	小学校	0.63	0.60	0.77	0.74	41.7	18.4	11.2	28.7	26.0	2.15	2.20
	中学校	0.56	0.54	0.59	0.58	66.0	12.0	10.0	12.0	21.8	2.64	2.02
	高等学校	0.63	0.61	0.55	0.54	78.0	8.6	7.0	6.4	17.1	2.59	0.73
	通定時制	0.64	0.62	0.56	0.55	78.5	8.3	7.0	6.2	17.1	2.57	...
	通定時制	0.59	0.56	0.54	0.52	75.5	10.0	6.9	7.6	17.1	2.76	...
女												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.37	0.33	0.76	0.68	8.5	18.8	11.0	61.7	20.0	1.42	0.41
	小学校	0.62	0.59	0.73	0.71	46.1	19.1	10.1	24.7	24.8	2.01	2.09
	中学校	0.55	0.53	0.57	0.56	66.3	11.6	9.8	12.3	22.3	2.52	1.98
	高等学校	0.58	0.56	0.53	0.51	79.8	8.3	5.6	6.3	17.2	2.45	0.80
	通定時制	0.57	0.55	0.54	0.52	79.9	8.1	5.6	6.4	17.2	2.50	...
	通定時制	0.60	0.58	0.49	0.47	77.9	10.8	5.3	6.0	18.8	1.20	...
昭和32年												
総 数												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.32	0.23	0.72	0.54	7.0	18.1	9.3	65.6	22.6	0.22	0.51
	小学校	0.62	0.53	0.76	0.66	42.2	19.5	10.5	27.8	29.2	0.17	2.33
	中学校	0.53	0.45	0.57	0.48	65.5	11.5	10.3	12.7	27.4	0.13	1.72
	高等学校	0.59	0.52	0.51	0.45	78.1	8.8	6.4	6.7	20.8	0.08	1.00
	通定時制	0.60	0.52	0.51	0.45	78.8	8.7	6.2	6.3	20.2	0.08	1.01
	通定時制	0.55	0.47	0.53	0.46	74.7	9.4	6.9	9.0	25.2	0.06	0.93
男												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.35	0.26	0.77	0.58	6.7	17.6	9.4	66.3	23.1	0.23	0.52
	小学校	0.64	0.54	0.80	0.69	40.0	19.2	11.0	29.8	29.7	0.16	2.27
	中学校	0.53	0.45	0.57	0.49	65.1	11.8	10.3	12.8	27.1	0.13	1.77
	高等学校	0.63	0.55	0.54	0.48	77.3	9.0	6.9	6.8	20.5	0.08	1.03
	通定時制	0.66	0.57	0.55	0.48	78.0	8.9	6.8	6.3	19.9	0.09	1.04
	通定時制	0.55	0.47	0.53	0.45	74.4	9.4	7.3	8.9	24.1	0.05	0.98
女												
幼小中 等学 校 通 常 定 時 制	幼稚園	0.29	0.21	0.67	0.49	7.3	18.7	9.2	64.8	22.1	0.21	0.50
	小学校	0.61	0.51	0.73	0.62	44.5	19.8	9.9	25.8	28.8	0.17	2.39
	中学校	0.54	0.45	0.56	0.48	65.8	11.3	10.3	12.6	27.6	0.13	1.69
	高等学校	0.53	0.47	0.47	0.42	79.3	8.5	5.6	6.6	21.1	0.08	0.96
	通定時制	0.53	0.47	0.46	0.41	79.8	8.4	5.5	6.3	20.5	0.08	0.99
	通定時制	0.54	0.47	0.52	0.46	75.3	9.3	6.2	9.2	27.2	0.07	0.82

疾病異常の被患率とは、受検者数100.00に対する疾病異常の件数。
文部省「学校衛生統計報告書」昭和32年、昭和33年分による。前表の注参照。

表37 世帯種別、世帯業態および世帯類型別身体障害件数（昭和29年）

(1) 世帯種別

世帯種別	総数	視力障害			聴力障害			言語機能障害			し体 不自由
		総数	完全 喪失	その他	総数	完全 喪失	その他	総数	完全 喪失	その他	
全国推計数(単位 1,000)	1,016	228	78	150	164	47	117	98	53	45	527
身体障害の種類別割合(各世帯総数100.0につき)											
総数	100.0	22.4	7.6	14.7	16.1	4.6	11.5	9.6	5.2	4.4	51.9
被保護世帯	100.0	29.3	11.4	17.9	12.8	3.9	8.9	9.1	3.7	5.5	48.7
被保護で社会保険加入	100.0	24.6	9.7	14.9	13.4	4.5	9.0	9.7	3.0	6.7	52.2
その他の被保護世帯	100.0	30.2	11.7	18.5	12.7	3.8	8.9	9.0	3.8	5.3	48.1
社会保険加入世帯	100.0	21.0	6.9	14.1	15.9	4.4	11.5	9.5	5.1	4.3	53.6
その他の世帯	100.0	22.9	8.0	14.8	17.1	5.0	12.1	9.9	5.7	4.2	50.1
身体障害の種類別件数の比率(人口1,000につき)											
総数	12.2	2.7	0.9	1.8	2.0	0.6	1.4	1.2	0.6	0.5	6.3
被保護世帯	51.9	15.2	5.9	9.3	6.6	2.0	4.6	4.7	2.8	2.8	25.3
被保護で社会保険加入	34.2	8.4	3.3	5.1	4.6	1.5	3.1	3.3	1.0	2.3	17.9
その他の被保護世帯	57.3	17.3	6.7	10.6	7.3	2.2	5.1	5.2	2.2	3.0	27.6
社会保険加入世帯	10.4	2.2	0.7	1.5	1.7	0.5	1.2	1.0	0.5	0.5	5.6
その他の世帯	13.2	3.0	1.1	2.0	2.3	0.7	1.6	1.3	0.7	0.6	6.6

(2) 世帯業態別

件数・率	総数	耕地面積3反以上の世帯			耕地面積3反未満の世帯					
		総数	専業 世帯	兼業 世帯	総数	専業 者世帯	常務 者世帯	日雇 者世帯	家内 労働者 世帯	その他 世帯
全国推計件数(単位1,000)	1,016	382	216	166	634	133	240	91	28	141
件数の人口1,000に対する率	12.2	12.7	13.0	12.4	11.9	10.8	8.2	17.6	20.1	28.2

(3) 世帯類型別

件数・率	総数	高齢者世帯	母子世帯	児童世帯	その他の世帯
全国推計件数(単位1,000)	1,016	42	16	0.1	957
件数の人口1,000に対する率	12.2	67.5	10.4	0.7	1.8

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年厚生行政基礎調査報告」昭和30年3月刊による。
 身体障害：(1) 視力障害……いわゆる「めくら」で症状の固定したもの、完全喪失とは両眼とも「めくら」である完全失明者をいう。(2) 聴力障害……いわゆる「つんぼ」で症状の固定したもの、完全喪失とは完全な「つんぼ」で耳に口を寄せて大声を出してもわからないものをいう。(3) 言語機能障害者……いわゆる「おし」「ひどいどもり」で症状の固定したもの、完全喪失とは全く語をすることができないもの。(4) し体不自由……手足とか体に症状の固定した故障があつて日常生活にははたはだしく差支えのあるもの。

表38 男女、年齢(数え年)別4-4.0歳盲、おしおよびつんぼの数(昭和22年)

(1) 男

年齢(数え年)	総数	盲	強い弱視	おし、つんぼ	強い難聴	盲、おし、つんぼ	強い弱視、強い難聴	その他
総数	198,933	12,734	92,168	30,484	41,803	1,932	18,871	941
4-20歳	88,440	4,234	39,985	14,328	18,973	789	9,737	394
4	3,918	174	2,164	274	767	18	505	16
5	4,409	202	2,194	537	860	34	567	15
6	4,661	182	2,221	661	938	44	595	20
7	5,020	199	2,328	782	1,054	32	609	16
8	5,054	212	2,195	886	1,070	51	617	23
9	4,578	182	1,946	843	1,023	40	526	18
10	4,783	224	2,060	875	1,086	43	477	18
11	5,565	233	2,380	995	1,305	42	587	23
12	5,333	245	2,300	939	1,204	69	550	26
13	5,616	285	2,530	945	1,177	50	605	24
14	5,311	262	2,346	894	1,185	46	553	25
15	5,611	266	2,511	926	1,267	63	556	22
16	5,903	312	2,600	994	1,285	51	633	28
17	5,825	280	2,563	1,005	1,278	49	628	22
18	5,643	312	2,491	989	1,210	53	553	35
19	5,663	301	2,600	895	1,167	42	626	32
20	5,547	363	2,556	888	1,097	62	550	31
21-30	54,139	3,668	25,560	8,414	10,787	563	4,885	262
31-40	56,354	4,832	26,623	7,742	12,043	580	4,249	285
	割合							
総数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4-20歳	44.46	33.25	43.38	47.00	45.39	40.84	51.60	41.87
4	1.97	1.37	2.35	0.90	1.83	0.93	2.68	1.70
5	2.22	1.59	2.38	1.76	2.06	1.76	3.00	1.59
6	2.34	1.43	2.41	2.17	2.24	2.28	3.15	2.13
7	2.52	1.56	2.53	2.57	2.52	1.66	3.23	1.70
8	2.54	1.66	2.38	2.91	2.56	2.64	3.27	2.44
9	2.30	1.43	2.11	2.77	2.45	2.07	2.79	1.91
10	2.40	1.76	2.24	2.87	2.60	2.23	2.53	1.91
11	2.80	1.83	2.58	3.26	3.12	2.17	3.11	2.44
12	2.68	1.92	2.50	3.08	2.88	3.57	2.91	2.76
13	2.82	2.24	2.74	3.10	2.82	2.59	3.21	2.55
14	2.67	2.06	2.55	2.93	2.83	2.38	2.93	2.66
15	2.82	2.09	2.72	3.04	3.03	3.26	2.95	2.34
16	2.97	2.45	2.82	3.26	3.07	2.64	3.35	2.98
17	2.93	2.20	2.78	3.30	3.06	2.54	3.33	2.34
18	2.84	2.45	2.70	3.24	2.89	2.74	2.93	3.72
19	2.85	2.36	2.82	2.94	2.79	2.17	3.32	3.40
20	2.79	2.85	2.77	2.91	2.62	3.21	2.91	3.29
21-30	27.21	28.80	27.73	27.60	25.80	29.14	25.89	27.84
31-40	28.33	37.95	28.89	25.40	28.81	30.02	22.52	30.29

総理府統計局「昭和22年臨時国勢調査結果報告(其の5)盲、おし及びつんぼの数」昭和23年4月刊による。

表38 男女、年齢(数え年)別4-40歳 盲、おし、つんぼ
(2) 女 数(昭和52年)

年令 (数え年)	総数	盲	強い弱視	おし、つんぼ	強い難聴	盲、おし、 つんぼ	強い弱視 強い難聴	その他
数								
総数	176,164	10,313	83,227	26,272	35,116	1,760	18,661	815
4-20歳	78,616	3,501	37,197	11,900	15,509	699	9,479	331
4	3,674	179	2,003	281	676	23	503	9
5	3,980	159	2,035	419	772	22	558	15
6	4,203	206	2,044	560	787	56	530	20
7	4,554	199	2,178	653	901	41	569	13
8	4,703	164	2,113	752	991	54	614	15
9	4,186	165	1,916	684	876	28	495	22
10	4,205	161	1,858	710	906	32	517	21
11	4,841	189	2,260	755	983	40	600	14
12	4,756	198	2,157	842	973	36	534	16
13	5,067	205	2,358	793	974	51	666	20
14	4,727	210	2,269	700	949	49	533	17
15	4,927	238	2,279	759	1,000	43	587	21
16	5,091	241	2,390	809	1,000	36	591	24
17	4,866	236	2,303	801	927	40	538	21
18	5,005	263	2,358	820	938	46	545	35
19	5,030	268	2,380	818	924	50	562	28
20	4,801	220	2,296	744	932	52	537	20
21-30	49,173	3,082	23,512	7,418	9,594	503	4,823	241
31-40	48,375	3,730	22,518	6,954	10,013	558	4,359	243
割合								
総数	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4-20歳	44.63	33.95	44.69	45.30	44.17	39.72	50.80	40.61
4	2.09	1.74	2.41	1.07	1.93	1.31	2.70	1.10
5	2.26	1.54	2.45	1.59	2.20	1.25	2.99	1.84
6	2.39	2.00	2.46	2.13	2.24	3.18	2.84	2.45
7	2.59	1.93	2.62	2.49	2.57	2.33	3.05	1.60
8	2.67	1.59	2.54	2.86	2.82	3.07	3.29	1.84
9	2.38	1.60	2.30	2.60	2.49	1.59	2.65	2.70
10	2.39	1.56	2.23	2.70	2.58	1.82	2.77	2.58
11	2.75	1.83	2.72	2.87	2.80	2.27	3.22	1.72
12	2.70	1.92	2.59	3.20	2.77	2.05	2.86	1.96
13	2.88	1.99	2.83	3.02	2.77	2.90	3.57	2.45
14	2.68	2.04	2.73	2.66	2.70	2.78	2.86	2.09
15	2.80	2.31	2.74	2.89	2.85	2.44	3.15	2.58
16	2.89	2.34	2.87	3.08	2.85	2.05	3.17	2.94
17	2.76	2.29	2.77	3.05	2.64	2.27	2.88	2.58
18	2.84	2.55	2.83	3.12	2.67	2.61	2.92	4.29
19	2.86	2.60	2.86	3.11	2.63	2.84	3.01	3.44
20	2.73	2.13	2.76	2.83	2.65	2.95	2.88	2.45
21-30	27.91	29.88	28.25	28.24	27.32	28.58	25.85	29.57
31-40	27.46	36.17	27.06	26.47	28.51	31.70	23.36	29.82

表 39 年次別法定伝染病患者数および死亡数 (明治33 - 昭和21年)

(1) 患者数

年次	コレラ	赤痢	腸チフス	パラチフス	痘瘡	発疹チフス	猩紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	ペスト	日本脳炎
実数 (各期間の1年平均)											
明33-37	2,708	37,114	21,474	-	302	32	95	14,812	-	49	-
38-42	922	29,201	24,699	-	3,946	4	661	15,442	-	432	-
43-大3	1,111	25,598	32,812	3,370	178	1,464	1,490	19,097	-	32	-
4-8	2,334	17,083	42,221	6,545	2,185	355	1,160	16,643	702	25	-
9-13	1,149	15,862	53,381	6,342	1,672	58	1,604	13,814	943	30	-
14-昭4	171	21,735	41,293	4,663	575	22	4,286	15,952	365	2	-
5-9	1	34,511	39,167	4,589	206	7	10,016	23,975	468	-	-
10-14	15	71,354	38,563	4,937	146	8	17,945	29,660	1,155	-	-
15-19	-	60,732	45,372	9,181	493	1,101	12,651	56,241	1,183	-	-
20	-	96,462	57,933	10,059	1,614	2,461	2405	85,833	4,384	-	-
21	1,245	88,214	44,658	9,154	17,954	32,366	2,208	49,864	1,436	-	201
罹患率 (人口100,000につき)											
明33-37	5.95	81.54	47.18	-	0.66	0.07	0.21	32.54	-	0.11	-
38-42	1.91	60.50	51.17	-	8.18	0.01	1.37	31.99	-	0.90	-
43-大3	2.15	49.59	63.57	6.53	0.34	2.84	2.89	37.00	-	0.06	-
大4-8	4.25	31.08	76.82	11.91	3.97	0.65	2.11	30.28	1.28	0.04	-
9-13	2.02	27.89	93.92	11.16	2.94	0.10	2.82	24.31	1.66	0.05	-
14-昭4	0.28	35.59	67.61	7.64	0.94	0.04	7.02	26.12	0.60	0.03	-
昭5-9	0.00	52.42	59.49	6.97	0.31	0.01	15.21	36.42	0.71	-	-
10-14	0.02	102.08	55.17	7.06	0.21	0.01	25.67	42.43	1.65	-	-
15-19	-	84.57	63.18	12.78	0.69	1.53	17.62	78.31	1.65	-	-
20	-	133.98	80.46	13.97	2.24	3.42	3.34	119.22	6.08	-	-
21	1.70	120.65	61.08	12.52	24.56	4.427	3.02	68.20	1.96	-	0.27

(2) 死亡数

年次	コレラ	赤痢	腸チフス	パラチフス	痘瘡	発疹チフス	猩紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	ペスト	日本脳炎
実数 (各期間の1年平均)											
明33-37	1,640	8,494	5,263	-	44	5	11	4,711	-	35	-
38-42	444	6,303	6,084	-	936	6	118	4,520	-	196	-
43-大3	732	8,205	7,121	376	63	239	208	5,093	-	19	-
大4-8	1,730	8,941	10,339	709	431	57	78	4,246	425	15	-
9-13	830	9,638	12,673	705	349	7	107	3,621	663	18	-
14-昭4	99	10,341	8,972	433	86	2	274	4,047	220	1	-
5-9	1	13,984	7,840	340	29	2	374	4,759	267	-	-
10-14	4	19,836	7,172	281	17	1	456	4,472	649	-	-
15-19	1	14,801	7,041	395	66	158	230	5,282	493	-	-
20	-	20,107	7,999	526	319	260	82	7,826	1,072	-	-
21	560	13,409	5,446	466	3,029	3,351	100	3,825	455	-	99
死亡率 (人口100,000につき)											
明33-37	3.60	18.66	11.56	-	0.10	0.01	0.02	10.36	-	0.08	-
38-42	0.92	13.06	12.60	-	1.94	0.01	0.24	9.36	-	0.41	-
43-大3	1.42	15.90	13.80	0.73	0.12	0.46	0.40	9.48	-	0.04	-
大4-8	3.15	16.27	18.81	1.29	0.78	0.10	0.14	7.72	0.77	0.03	-
9-13	1.42	16.95	22.30	1.24	0.61	0.01	0.19	6.37	1.17	0.03	-
14-昭4	0.16	16.93	14.69	0.71	0.14	0.00	0.45	6.63	0.36	0.02	-
5-9	0.00	21.24	11.91	0.52	0.04	0.00	0.57	7.23	0.41	-	-
10-14	0.01	28.38	10.26	0.40	0.02	0.00	0.65	6.40	0.93	-	-
15-19	0.00	20.61	9.80	0.55	0.09	0.22	0.32	7.35	0.69	-	-
20	-	27.85	11.08	0.73	0.44	0.36	0.11	10.84	1.48	-	-
21	0.74	17.69	7.18	0.61	4.00	0.42	0.13	5.05	0.60	-	0.13

厚生省大官房統計調査部「昭和32年衛生年報」、昭和34年3月刊によるものを、各期間の平均値としたもの。
 ただし、患者数の昭和12年以前は内務省衛生局「衛生高年報」、昭和13-17年は厚生省衛生局「伝染病統計」、昭和18年以降は同
 「伝染病年報」より採った簡速統計、死亡者数は同統計調査部「人口動態統計」によるもの。

表 40 年次別法定伝染病患者数および死亡数（昭和22年-33年）

年次	(1) 患者数									
	赤痢	腸チフス	パラチフス	痘	瘡	発疹チフス	猩紅熱	ジフテリ	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎
昭 22	39,219	17,809	4,728	386	1,106	2,635	28,307	3,373	263	
昭 23	14,665	9,486	2,917	29	475	2,982	16,377	2,052	4,757	
昭 24	23,961	6,391	2,189	124	111	4,602	14,555	1,446	1,284	
昭 25	49,780	4,883	1,711	5	938	5,149	12,621	1,193	5,196	
昭 26	93,039	3,878	1,302	86	3	5,096	10,749	1,111	2,188	
昭 27	111,709	2,898	835	2	16	6,168	8,381	912	3,545	
昭 28	108,009	2,521	1,098	6	-	12,619	9,589	859	1,729	
昭 29	98,810	2,567	760	2	-	19,861	10,490	676	1,750	
昭 30	80,654	1,939	590	1	-	13,486	15,557	630	3,699	
昭 31	84,437	2,123	509	-	-	12,172	18,395	610	4,538	
昭 32	74,780	2,113	544	-	1	14,499	15,423	760	1,793	
昭 33	81,577	1,901	1,149	-	-	13,734	15,641	638	3,900	
罹患者率（人口100,000につき）										
昭 22	50.2	22.8	6.1	0.5	1.4	3.4	36.2	4.3	0.3	
昭 23	18.3	11.9	3.6	0.0	0.6	3.7	20.5	2.6	5.9	
昭 24	29.3	7.8	2.7	0.2	0.1	5.6	17.8	1.8	1.6	
昭 25	59.8	5.9	2.1	0.0	1.1	6.2	15.2	1.4	6.2	
昭 26	110.0	4.6	1.5	0.1	0.0	6.0	12.7	1.3	2.6	
昭 27	130.1	3.4	1.0	0.0	0.0	7.2	9.8	1.1	4.1	
昭 28	124.1	2.9	1.3	0.0	-	14.5	11.0	1.0	2.0	
昭 29	111.9	2.9	0.9	0.0	-	22.5	11.9	0.8	2.0	
昭 30	90.3	2.2	0.7	0.0	-	15.1	17.4	0.7	4.1	
昭 31	93.6	2.4	0.6	-	-	13.5	20.4	0.7	5.0	
昭 32	82.1	2.3	0.4	-	0.0	15.9	16.9	0.8	2.0	
昭 33	88.7	2.1	1.2	-	-	14.9	17.0	0.7	4.2	

(2) 死亡数

年次	赤痢	腸チフス	パラチフス	痘	発疹チフス	猩紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎
実数									
昭22	9,573	2,926	316	85	135	71	3,390	1,187	228
23	5,157	1,433	170	3	47	42	1,903	650	2,620
24	7,765	936	116	14	18	58	1,635	492	1,177
25	11,968	630	80	2	68	33	1,182	367	2,430
26	14,814	351	49	12	2	34	895	302	956
27	13,585	189	32	-	-	48	639	227	1,437
28	10,851	157	16	-	-	56	773	196	720
29	9,341	124	24	-	1	87	795	155	732
30	6,042	105	13	-	-	62	913	161	1,373
31	5,165	80	19	-	-	63	980	147	1,600
32	3,763	76	7	-	-	44	887	153	744
33	3,147	55	8	-	-	31	618	134	1,347
死亡率(人口100,000につき)									
昭22	12.3	3.7	0.4	0.1	0.2	0.1	4.3	1.5	0.3
23	6.4	1.8	0.2	0.0	0.1	0.1	2.4	0.8	3.3
24	9.5	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.0	0.6	1.4
25	14.4	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	2.9
26	17.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	1.1
27	15.8	0.2	0.0	-	-	0.1	0.7	0.3	1.7
28	12.5	0.2	0.0	-	-	0.1	0.9	0.2	0.8
29	10.6	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.9	0.2	0.8
30	6.8	0.1	0.0	-	-	0.1	1.0	0.2	1.5
31	5.7	0.1	0.0	-	-	0.1	1.1	0.2	1.8
32	4.1	0.1	0.0	-	-	0.0	1.0	0.2	0.8
33	3.4	0.1	0.0	-	-	0.0	0.7	0.1	1.5

患者数は、厚生省大臣官房統計調査部「衛生統計月報、特別号(伝染病簡速統計月報年計)、第11巻第13号」昭和34年6月刊(昭和26年以前は「伝染病年報」、昭和27年以降は「伝染病簡速統計月報」による)、死亡数は同部「人口動態統計」の各年分によるもの。なお、昭和33年は概数。

表 4 1. 年次別届出伝染病患者数および死亡数 (昭和 2 2 年 - 3 3 年)

(1) 患者数

年次	マラリア ¹⁾	麻疹 ²⁾	百日咳 ²⁾	インフルエンザ ²⁾	急性灰白髄炎 ³⁾	破傷風 ²⁾	狂犬病 ²⁾	炭疽 ²⁾	結核 ²⁾	瘧疾 ²⁾
英 数										
昭 2 2	1,1825	18,1303	152,072	16,898	275	1,625	22.	13	317,597	607
昭 2 3	4,953	55,234	53,508	2,848	993	1,979	46	4	382,810	712
昭 2 4	3,716	16,4646	126,110	2,927	3,127	2,168	74	11	464,903	778
昭 2 5	1,016	56,236	122,796	39,324	3,212	1,915	57	2.	528,829	604
昭 2 6	480	181,866	78,612	59,58	4,233	1,725	13	2.	590,684	487
昭 2 7	262	57,502	56,868	1,654	2,317	1,436	5	-	586,651	326
昭 2 8	168	127,723	45,262	89,942	2,286	1,243	3	3	507,244	315
昭 2 9	337	71,605	67,028	4,444	1,921	1,044	1	3	523,556	333
昭 3 0	66	60,271	14,134	18,639	1,314	960	-	6	517,477	331
昭 3 1	47	68,153	18,524	24,991	1,497	998	1	1	518,142	285
昭 3 2	33	65,886	20,112	983,105	1,718	945	-	-	520,899	361
昭 3 3	28	29,351	29,948	32,944	2,610	853	-	3	498,779	362
罹患率 (人口 100,000 につき)										
昭 2 2	15.1
昭 2 3	6.2	69.0	66.9	3.6	1.2	2.5	0.1	0.0	478.5	0.9
昭 2 4	4.5	20.3	154.2	3.6	3.8	2.7	0.1	0.0	568.5	1.0
昭 2 5	1.2	67.6	147.6	47.3	3.9	2.3	0.1	0.0	635.6	0.7
昭 2 6	0.6	215.0	93.0	7.0	5.0	2.0	0.0	0.0	698.4	0.6
昭 2 7	0.3	67.0	66.2	1.9	2.7	1.7	0.0	-	683.3	0.4
昭 2 8	0.2	146.8	52.0	103.3	2.6	1.4	0.0	0.0	582.8	0.4
昭 2 9	0.4	81.1	75.9	5.0	2.2	1.2	0.0	0.0	593.0	0.4
昭 3 0	0.1	67.5	15.8	20.9	1.5	1.1	-	0.0	579.6	0.4
昭 3 1	0.1	75.5	20.5	27.7	1.7	1.1	0.0	0.0	574.1	0.3
昭 3 2	0.0	72.3	22.1	107.3	1.9	1.0	-	-	571.9	0.4
昭 3 3	0.0	31.9	32.6	35.8	2.8	0.9	-	0.0	542.1	0.4

(2) 死亡数

年次	マラリア	麻疹	百日咳	インフルエンザ	急性灰白髄炎	破傷風	狂犬病	炭疽	結核	頸
昭和22	456	20,939	17,001	1,903	1,009	2,221	16	2	146,241	189
23	224	5,598	4,746	515	775	2,138	40	-	143,909	150
24	120	12,589	9,105	524	1,074	1,958	79	-	138,113	171
25	73	3,745	8,426	1,250	775	1,558	63	-	121,769	90
26	38	9,036	3,905	747	570	1,439	13	-	93,307	100
27	38	3,063	2,425	298	508	1,353	6	-	70,558	87
28	33	5,880	1,400	2,659	441	1,168	3	1	57,849	47
29	19	3,309	1,830	300	442	1,020	1	1	55,124	18
30	20	2,258	401	539	314	887	-	1	46,735	21
31	12	2,361	332	543	290	869	1	-	43,974	15
32	14	2,772	340	7,735	255	755	-	-	42,718	13
33	14	972	472	1,954	247	643	-	3	36,166	21
死亡率										
昭和22	0.6
23	0.5	7.0	5.9	0.6	1.0	2.7	0.0	-	179.9	0.2
24	0.1	15.1	11.1	0.6	1.3	2.4	0.1	-	168.9	0.2
25	0.1	4.5	10.1	1.5	0.9	1.9	0.1	-	146.4	0.1
26	0.0	10.7	4.6	0.9	0.7	1.7	0.0	-	110.3	0.1
27	0.0	3.6	2.8	0.3	0.6	1.6	0.0	-	82.2	0.1
28	0.0	6.8	1.6	3.1	0.5	1.3	0.0	0.0	66.5	0.1
29	0.0	3.7	2.1	0.3	0.5	1.2	0.0	0.0	62.4	0.0
30	0.0	2.5	0.4	0.3	0.3	1.0	-	0.0	52.3	0.0
31	0.0	2.6	0.4	0.6	0.3	1.0	0.0	-	48.6	0.0
32	0.0	3.0	0.4	8.5	0.3	0.8	-	-	46.9	0.0
33	0.0	1.1	0.5	2.1	0.3	0.7	-	0.0	39.3	0.0

1)は昭和2.1年5月, 2)は昭和2.2年3月, 3)は昭和2.2年9月, 4)は昭和2.1年12月, 5)は昭和2.3年5月, 6)は昭和2.5年1月, 7)が昭和2.7年1月より届け出られている。したがって, 届出開始の年次の年間罹患率と死亡率は掲げていない。(次頁に)

表 4 1. 届出伝染病患者数、死亡数 (つづき)

(1) 患者数

年次	トホーム(2)	伝染性下痢症(5)	恙虫(6)	住血吸虫(6)	ライリフ病(6)	梅毒(4)	淋病(4)	軟性下疳(4)	鼠径淋(4)	鼠径淋(4)	食中毒(7)
実数											
昭22	229,158	•	•	•	•	148,191	212,784	40,836	923	•	•
23	151,209	697	•	•	•	216,617	219,745	36,753	707	•	•
24	175,251	769	•	•	•	185,785	178,901	21,669	635	•	•
25	156,248	91	116	918	106	121,461	178,273	15,820	490	•	•
26	165,208	1,520	100	697	71	77,044	177,774	15,903	303	•	•
27	149,067	147	97	948	40	50,528	158,670	14,909	208	24,622	•
28	130,223	59	104	1,200	55	38,721	140,458	12,514	163	23,068	•
29	123,460	109	74	1,537	187	33,829	141,416	8,745	125	22,595	•
30	102,215	81	43	1,349	61	28,675	134,571	4,636	70	65,746	•
31	91,684	424	38	1,442	98	24,323	116,842	30,68	40	28,907	•
32	77,922	37	41	664	61	18,011	86,195	2,216	25	24,387	•
33	63,404	45	35	1,983	122	15,211	24,367	733	13	32,891	•
罹患率(人口100,000につき)											
昭22	•••	•	•	•	•	189.7	272.4	52.3	1.2	•	•
23	189.0	•••	•	•	•	270.8	274.7	45.9	0.9	•	•
24	214.3	0.9	•	•	•	227.1	218.7	26.5	0.8	•	•
25	187.8	0.1	0.1	1.1	0.1	146.0	214.3	19.0	0.6	•	•
26	195.3	1.8	0.1	0.8	0.1	91.1	210.2	18.8	0.4	•	•
27	173.6	0.2	0.1	1.1	0.0	58.9	184.8	17.4	0.2	28.7	•
28	149.6	0.1	0.1	1.4	0.1	44.5	161.4	14.4	0.2	26.5	•
29	139.8	0.1	0.1	1.7	0.2	38.5	160.2	9.9	0.1	25.6	•
30	114.5	0.1	0.0	1.5	0.1	32.1	150.7	5.2	0.1	73.6	•
31	101.6	0.5	0.0	1.6	0.1	26.9	129.5	3.4	0.0	52.0	•
32	85.5	0.0	0.0	0.7	0.1	19.8	94.6	2.4	0.0	26.8	•
33	68.9	0.0	0.0	2.2	0.1	14.4	26.5	0.8	0.0	35.7	•

(2) 死亡数

年次	トランプ	伝染性下痢症	恙虫病	住血吸虫病	フイラリア病	梅毒	淋病	飲性下痢	風疹	巴氏肉芽腫症	食中毒
昭 22	-	・	・	・	・	4444	46	2	37	・	
昭 23	-	5	・	・	・	4,356	32	1	20	・	
昭 24	-	14	・	・	・	5,501	51	1	5	・	
昭 25	1	9	5	81	59	5,176	29	2	1	・	
昭 26	-	13	1	54	64	4,630	27	1	2	・	
昭 27	-	19	-	71	55	4,265	10	-	1	359	
昭 28	-	4	2	73	61	3,692	16	-	-	308	
昭 29	-	9	-	86	64	3,594	13	-	1	371	
昭 30	-	2	-	80	54	2,882	14	2	1	507	
昭 31	・	2	-	74	57	2,776	21	-	1	273	
昭 32	・	1	-	57	53	2,630	289	
昭 33	・	1	1	69	46	2,335	311	

年次	死亡率 (人口100,000につき)
昭 22	0.0
昭 23	0.0
昭 24	0.0
昭 25	0.0
昭 26	0.0
昭 27	0.0
昭 28	0.0
昭 29	0.0
昭 30	0.0
昭 31	0.0
昭 32	0.0
昭 33	0.0

黄熱・回帰熱は、昭和31年7月より届け出られることとなつたが発生届がないので表には載せていない。患者数は、厚生省大臣官房統計課産部「衛生統計月報特別号（伝染病簡速統計月報年計）第11巻第13号」昭和34年6月刊、死亡者数は同部「人口動態統計」の各年分によるもの。

表 4.2. 厚生行政基礎調査による年次別傷病世帯および傷病人員（昭和28年-33年）

年次	世帯		世帯人員 総数	傷病			人員												
	総数	傷病者の いる世帯		結 核	在宅		院 入	その他											
					数	在宅		院 入	在宅	院 入									
実数																			
率																			
昭28	17,180	2,101	86,240	2,410	561	429	132	1,849	1,731	118									
29	17,357	1,823	83,122	2,064	603	457	146	1,461	1,336	125									
30	18,963	2,197	88,799	2,552	651	483	168	1,902	1,771	130									
31	19,823	2,573	89,800	3,017	603	433	169	2,414	2,251	163									
32	20,704	1,826	90,728	2,013	408	267	141	1,605	1,451	154									
33	21,310	2,703	90,930	3,154	522	365	156	2,632	2,446	186									
昭28	1,000.0	12.23	1,000.0	2.80	6.5	5.0	1.5	21.4	20.1	1.4									
29	1,000.0	10.52	1,000.0	2.48	7.3	5.5	1.8	17.6	16.1	1.3									
30	1,000.0	11.59	1,000.0	2.87	7.3	5.4	1.9	21.4	19.9	1.5									
31	1,000.0	12.98	1,000.0	3.36	6.7	4.8	1.9	26.9	25.1	1.8									
32	1,000.0	8.82	1,000.0	2.23	4.5	2.9	1.6	17.7	16.0	1.7									
33	1,000.0	12.68	1,000.0	3.47	5.7	4.0	1.7	28.9	26.9	2.0									

厚生省大臣官房統計調査部「厚生行政基礎調査報告」の昭和28～33年分による。
 昭和28-31年は各年4月1日、昭和32-33年は各年4月15日の調査、全国の世帯について1/100を抽出した標本調査。
 厚生行政基礎調査は、厚生行政の企画および運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種標本調査の客体を抽出するために必要な標本を決定することを目的として、昭和28年以降毎年行われているもの。

表 4 3. 厚生行政基礎調査による年次別世帯種類別傷病世帯および傷病世帯人員の割合 (昭和 29 年 - 33 年)

年次	総数	耕地面積 3 反以上の世帯				耕地面積 3 反未満の世帯				
		総数	専業世帯	常用勤労者のいる兼業	その他の兼業	専業世帯	常用勤労者世帯	日雇労働者世帯	家内労働者世帯	その他の世帯

(A) 傷病世帯の割合

昭 29	1052	1177	1124	1247	1004	939	907	1116	1215	1402
30	1159	1380	1279	1522	1077	1047	948	1263	1449	1510
31	1298	1659	1606	1735	1170	1175	100.1	1480	1757	1745
32	882	1172	1159	1182	1214	78.1	784	64.8	107.1	111.9	126.1
33	1268	1869	1846	1841	204.9	107.5	115.8	89.8	128.6	156.0	169.0

(B) 傷病世帯人員の割合 (各世帯人員総数 1000.0 につき)

昭 29	24.8	21.5	21.2	21.9	...	26.7	20.3	24.5	30.3	33.1	50.4
30	28.7	26.0	24.6	27.9	...	30.3	23.6	27.3	35.0	41.3	54.8
31	33.6	32.3	32.3	32.5	...	34.3	27.4	30.4	41.4	51.0	68.4
32	22.2	21.2	21.8	20.1	20.7	22.8	17.7	19.7	29.5	34.0	50.5
33	34.7	37.2	38.4	33.8	39.0	33.4	27.5	28.6	43.2	47.5	73.4

(a) 結核によるもの (各世帯人員総数 1000.0 につき)

昭 29	7.3	3.9	3.7	4.3	...	9.1	6.5	9.2	7.9	12.9	15.7
30	7.3	4.2	3.9	4.6	...	9.1	6.0	9.1	8.9	14.2	15.3
31	6.7	3.9	3.6	4.2	...	8.3	5.9	7.9	8.0	15.5	16.3
32	4.5	2.8	2.9	2.8	2.4	5.5	3.4	5.2	5.4	10.5	12.6
33	5.7	5.7	3.6	4.1	3.5	6.8	4.7	6.3	7.2	15.4	15.1

(b) その他のもの (各世帯人員総数 1000.0 につき)

昭 29	17.6	17.6	17.5	17.6	...	17.6	13.8	15.3	22.4	20.2	34.7
30	21.4	21.9	20.7	23.3	...	21.2	17.6	18.3	26.1	27.1	39.5
31	26.9	28.5	28.6	28.3	...	26.0	21.5	22.5	33.4	35.5	52.1
32	17.7	18.4	18.9	17.3	18.3	17.3	14.3	14.5	24.1	23.5	38.0
33	28.9	33.5	34.8	29.7	35.5	26.6	22.8	22.3	36.0	32.2	58.3

厚生省大臣官房統計調査部「厚生行政基礎調査報告」昭和 29-33 年分による。前表の注参照。

表 4.4 厚生行政基礎調査による年次別、世帯類型別、世帯種別傷病世帯および傷病世帯人員の割合 (昭和29年-33年)

(1) 世帯類型別

世帯類型	傷病世帯の割合 (各世帯総数 10000 につき)					傷病世帯人員の割合 (各世帯人員総数 10000 につき)				
	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
総 数	1025	115.9	1298	882	1268	248	287	336	222	347
高齢者世帯	101.9	111.2	150.8	110.4	175.3	68.0	81.4	106.2	76.3	126.5
母子世帯	71.3	77.7	100.1	63.8	94.6	25.8	29.0	37.9	23.4	37.2
児童世帯	6.7	2.5	12.6	12.6	5.3	7.2	2.4	12.4	12.5	5.2
その他の世帯	107.1	117.8	131.2	89.8	129.1	24.5	28.4	33.0	21.8	34.1
世帯類型	傷病世帯人員の割合のうち結核のもの					傷病世帯人員の割合のうち非結核のもの				
	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
総 数	7.3	7.3	6.7	4.5	5.7	17.6	21.4	26.9	17.7	28.9
高齢者世帯	4.5	5.3	5.1	3.2	5.6	63.5	76.2	101.1	73.2	120.9
母子世帯	8.4	9.1	8.6	4.9	7.2	17.4	19.8	29.2	18.5	29.9
児童世帯	2.9	-	-	0.5	0.5	4.3	2.4	12.4	11.9	4.8
その他の世帯	7.3	7.3	6.7	4.5	5.7	17.2	21.1	26.3	17.3	28.3

(2) 世帯種別

世帯種別	傷病世帯の割合 (各世帯総数 10000 につき)					傷病世帯人員の割合 (各世帯人員総数 10000 につき)				
	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
総 数	1052	115.9	1298	882	1268	248	287	336	222	347
被保護世帯	306.9	429.2	498.5	454.0	579.1	125.6	137.6	164.2	144.8	197.8
国保加入世帯	104.5	129.3	153.6	103.6	160.1	24.1	31.7	34.5	22.2	38.2
医療保険加入世帯	90.7	109.9	113.6	76.0	104.5	21.6	26.5	30.6	19.7	29.1
その他の世帯	90.7	95.6	107.1	69.2	97.7	21.6	24.2	28.3	18.8	29.4
世帯種別	傷病世帯人員の割合のうち結核のもの					傷病世帯人員の割合のうち非結核のもの				
	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33	昭29	昭30	昭31	昭32	昭33
総 数	7.3	7.3	6.7	4.5	5.7	17.6	21.4	26.9	17.7	28.9
被保護世帯	56.6	56.9	64.9	59.6	72.6	69.0	80.7	99.4	85.2	125.2
国保加入世帯	7.3	5.2	4.1	2.7	3.8	16.8	26.4	30.4	19.5	34.4
医療保険加入世帯	7.3	8.5	7.6	4.6	5.8	16.8	18.0	23.0	15.2	23.3
その他の世帯	4.9	4.7	4.1	3.0	3.6	16.7	19.5	24.2	15.7	25.8

厚生省大臣官房統計調査部「厚生行政基礎調査報告」の各年分による。表4.2の注参照。

表 4.5. 厚生行政基礎調査による勤労その他の世帯における収入階層別傷病世帯および傷病世帯人員の割合（昭和31年-33年）

収入階層	傷病世帯の割合 (各階層世帯総数) 1,000.0につき			傷病世帯人員の割合(各階層世帯人員総数) 1,000.0につき								
				総 数			結核のもの			結核以外のもの		
	昭31	昭32	昭33	昭31	昭32	昭33	昭31	昭32	昭33	昭31	昭32	昭33
総 数	116.9	78.0	105.7	36.4	24.3	35.2	9.0	6.1	7.5	27.3	18.2	27.7
1,999円以下	180.1	115.5	178.4	80.0	63.8	87.9	15.1	11.0	15.2	64.9	52.9	72.7
2,000-3,999円	176.0	123.3	168.3	87.6	67.3	107.1	17.2	14.2	19.1	70.3	53.1	88.0
4,000-5,999	138.7	95.8	118.7	64.4	50.9	71.6	15.4	12.3	14.1	49.0	38.6	57.4
6,000-7,999	113.2	75.4	97.9	50.7	37.6	55.0	12.6	10.4	13.2	38.2	27.3	41.8
8,000-9,999	101.6	70.5	91.6	40.3	30.5	44.9	9.5	8.7	9.8	30.8	21.8	35.1
10,000-14,999	108.0	69.4	103.6	36.5	23.8	38.7	9.0	5.9	8.3	27.4	17.9	30.4
15,000-19,000	104.3	72.2	99.5	28.7	20.5	31.1	7.7	4.8	6.9	21.1	15.7	24.2
20,000-24,999	112.4	74.2	97.2	28.2	18.7	26.4	7.8	5.2	5.3	20.4	13.5	21.1
25,000-29,999	113.2	76.7	100.6	26.7	17.7	25.3	7.3	5.1	5.3	19.3	12.6	20.0
30,000-39,999	118.5	76.5	108.0	25.8	16.7	25.6	6.8	4.2	5.6	18.9	12.4	20.0
40,000円以上	114.0	73.7	102.6	25.2	14.8	22.9	5.6	3.6	5.3	19.6	11.2	17.6
不 詳	139.3	75.0	155.1	61.7	30.3	62.9	18.5	8.3	11.7	43.2	22.0	51.3

厚生省大臣官房統計調査部「厚生行政基礎調査報告」の各年分による。表4.2の注参照。

表 4.6. 厚生行政基礎調査による勤労その他の世帯における収入階層別傷病世帯人員の割合（昭和30年, 29年）

収入階層	総 数		結核のもの		結核以外のもの	
	昭 29	昭 30	昭 29	昭 30	昭 29	昭 30
総 数	28.7	32.3	9.9	10.0	18.7	22.3
4,999円以下	63.8	67.5	18.9	17.4	44.9	50.1
5,000-9,999円	35.1	42.6	11.5	12.8	23.6	29.8
10,000-14,999	26.7	30.6	9.5	9.7	17.2	20.9
15,000-19,999	23.1	25.8	8.5	7.8	14.6	18.0
20,000-24,999	22.3	24.9	8.4	8.3	13.9	16.6
25,000-29,999	21.5	23.0	8.1	8.7	13.4	14.2
30,000-39,999	20.1	25.1	7.8	8.7	12.2	16.3
40,000円以上	22.4	20.2	8.1	7.3	14.3	12.9
不 詳	-	5.64	-	2.29	-	3.35

上表の注と同様

表 4.7. 国民健康調査による年次別傷病件数および罹病日数
(昭和 28 年—33 年)

調査年月	傷 病 件 数						罹病日数
	総 数	罹患(発病)の時期		傷 病 の 結 果			
		調査期間 前の発病	調査期間 中の発病	調査期間 中の治ゆ	調査期間 中の死亡	調査期間 後への	
全国推計件数							
昭 28. 11	18,712	4,012	14,700	14,254	63	4,395	179,567
29. 10	17,930	3,870	14,060	13,800	50	4,090	177,650
30. 11	16,490	3,390	13,100	12,670	44	3,770	153,610
31. 11	18,556	3,754	14,802	14,187	31	4,338	172,720
32. 10	20,343	3,711	16,632	16,013	61	4,269	177,659
33. 10	20,207	4,260	15,947	15,617	41	4,548	195,429
月間人口 1,000 に対する率							
昭 28. 11	215	46	169	164	0.0	50	2,062
29. 10	203	44	159	156	0.6	46	2,012
30. 11	184	38	147	142	0.5	42	1,718
31. 11	206	42	164	157	0.3	48	1,913
32. 10	223	41	183	176	0.7	47	1,951
33. 10	220	46	173	170	0.5	49	2,124
年間人口 1,000 に対する率							
昭 28. 11	2,099	46	2,053	1,991	9	50	25,083
29. 10	1,919	44	1,875	1,840	7	46	23,688
30. 11	1,821	38	1,783	1,724	6	42	20,905
31. 11	2,041	42	2,000	1,917	4	48	23,336
32. 10	2,191	41	2,150	2,070	8	47	22,966
33. 10	2,087	46	2,041	1,999	5	49	25,010

この調査で傷病とは、“A 身体または精神が異常状態になつたため、なんらかの治療処置をした場合、B 身体または精神が異常状態になつたため、治療処置はしないが、床につくか、1 日以上日常の業務を中止(仕事を休み、家事をせず、学校を休む、など)した場合”をいう。

厚生省大臣官房統計調査部「国民健康調査」昭和 28—33 年分(ただし昭和 33 年は速報)による。

国民健康調査は、国民の世帯を調べ、その世帯におきた病気やけがの種類とその数量、治療方法、治療費とその支払方法などを明らかにし、衛生行政の基礎資料を得ることを目的とした医療調査で、厚生行政基礎調査の標本を親標本として抽出する標本抽出法。昭和 23 年以降毎年 1 回 1 カ月間にわたって実施せられているもの。

表 4.8. 国民健康調査による年次別、男女年齢階級別罹患率および罹病日数 (昭和28年-32年)

年齢階級	男					女				
	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32	昭28	昭29	昭30	昭31	昭32
月間罹患率(人口1,000につき)										
総数	172	162	143	140	179	166	157	150	180	186
1>	299	285	252	256	285	228	244	197	227	246
1-4	281	246	212	209	279	233	235	206	208	266
5-14	156	149	136	145	201	142	139	130	142	188
15-24	134	129	107	114	127	133	116	131	225	148
25-34	155	149	124	132	168	172	160	141	160	184
35-44	167	178	140	153	166	181	169	162	187	190
45-54	162	152	165	156	166	179	176	191	184	195
55-64	174	162	165	137	175	175	171	160	168	188
65-74	158	171	138	133	195	153	154	142	158	181
75≤	209	113	103	144	119	159	136	140	152	135
月間1人当罹病日数										
総数	2.05	2.05	1.76	1.86	1.90	2.08	1.97	1.68	1.96	2.00
1>	2.85	2.54	1.85	2.58	2.17	2.67	2.28	1.90	1.71	2.21
1-4	1.99	1.95	1.54	1.54	1.75	1.95	2.06	1.65	1.55	1.64
5-14	1.31	1.32	1.02	1.17	1.37	1.06	1.13	1.02	1.14	1.27
15-24	1.48	1.44	1.12	1.28	1.22	1.49	1.43	1.12	1.98	1.32
25-34	2.03	2.00	1.70	1.64	1.60	2.21	1.79	1.73	1.84	1.82
35-44	2.43	2.52	1.93	2.07	2.28	2.57	2.60	2.07	2.12	2.34
45-54	2.62	2.92	2.84	2.86	2.59	3.14	2.80	2.45	2.86	2.86
55-64	3.45	3.63	3.29	3.26	3.47	3.53	3.65	2.73	3.07	3.31
65-74	3.74	3.41	3.81	4.29	4.02	2.98	3.12	2.97	3.23	4.07
75≤	3.53	3.72	3.42	3.67	3.61	3.32	2.73	2.71	2.16	3.45
罹患1件当罹病日数										
総数	11.9	12.7	12.3	12.8	10.6	12.5	12.6	11.2	10.9	10.7
1>	9.5	8.9	7.3	10.1	7.6	11.7	9.3	9.6	7.5	9.0
1-4	7.1	7.9	7.3	7.4	6.3	8.4	8.8	8.0	7.4	6.2
5-14	8.4	8.8	7.5	8.0	6.8	7.4	8.2	7.8	8.0	6.8
15-24	11.0	11.1	10.5	11.3	9.6	11.2	11.3	8.5	8.8	8.9
25-34	13.1	13.5	13.8	12.4	9.5	12.8	11.2	12.2	11.5	9.9
35-44	14.5	14.2	13.8	13.5	13.7	14.2	15.4	12.8	11.4	12.3
45-54	16.2	19.3	17.2	18.3	15.6	17.6	15.9	12.8	15.6	14.7
55-64	19.9	22.4	20.0	23.8	19.8	20.2	21.4	17.1	18.3	17.6
65-74	23.6	19.9	27.7	32.2	20.6	19.4	20.3	20.9	20.5	22.5
75≤	16.9	32.8	33.1	25.4	30.3	20.9	20.0	19.3	14.2	25.5

厚生省大臣官房統計調査部「国民健康調査」昭和28-32年分による。前表の注参照。

表 49. 国民健康調査による年次別、傷病大分類別有病率および罹患率
(昭和30年—33年)

傷病(大)分類	有 病 率				罹 患 率			
	昭 33	昭 32	昭 31	昭 30	昭 33	昭 32	昭 31	昭 30
総 数	463	40.7	41.6	37.9	2040.8	2,149.9	1,999.8	1,783.3
I 伝染病および寄生虫病 結 核(再掲)	6.9 5.2	6.2 4.4	7.1 5.5	6.8 5.4	59.2 4.2	58.7 3.9	63.9 5.1	61.5 4.0
II 新 生 物	0.7	0.5	0.4	0.5	6.1	6.5	5.9	5.9
III アレルギー性疾患内分 泌系の疾患物質代謝及 び栄養の疾患	1.8	2.1	1.9	2.0	19.8	21.1	26.3	21.0
IV 血液および造血器の疾患	0.2	0.3	0.2	0.2	2.5	1.7	1.7	1.7
V 精神病精神神経症および 人格異常	0.5	0.6	0.5	0.4	1.7	2.0	2.4	2.5
VI 神経系および感覚器の 疾患	5.9	5.6	5.8	5.4	110.5	110.6	120.5	102.3
VII 循 環 器 系 の 疾 患	4.2	3.6	3.4	2.7	26.5	23.0	24.1	20.5
VIII 呼 吸 器 系 の 疾 患 急性鼻咽頭炎(再掲)	6.0 4.2	5.5 3.0	5.2 3.2	4.4 2.5	830.7 749.2	1,024.0 727.3	798.9 710.6	727.5 631.8
IX 消 化 器 系 の 疾 患	10.1	6.9	7.7	7.2	330.8	272.6	321.9	276.4
X 性 尿 器 系 の 疾 患	1.2	1.3	1.2	0.8	20.7	14.0	33.9	13.8
XI 正常分娩並びに妊娠分 娩及び産婦の合併症	0.2	0.2	0.1	0.2	3.3	4.8	2.9	4.4
XII 皮膚及び疎性結合組織 の疾患	2.6	2.3	2.2	1.8	98.3	79.7	101.9	92.5
XIII 骨および運動器の疾患	1.8	1.6	1.7	1.5	108.3	92.4	97.8	92.9
XIV 先 天 奇 形	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5	0.5
XV 新生児の主要疾患(新生 下痢及び肺炎を除く)	-	-	-	-	0.6	0.3	1.2	1.0
XVI 症状老衰および診断名 不明確の状態	1.2	1.3	1.5	1.1	212.7	217.0	183.1	188.4
XVII 不慮の事故中毒および暴力	2.8	2.4	2.4	2.3	201.0	215.9	207.8	164.1
XVIII 回復期保護成形処置お よび補綴処置	0.3	0.4	0.3	0.4	7.5	5.6	5.1	5.9

有病率は調査期間当初の人口1,000.0に対する調査期間前よりの傷病件数。
罹患率は調査期間当初の人口1,000.0に対する調査期間中のり患件数を年間の率に換算したもの。
厚生省大臣官房統計調査部「国民健康調査」昭和30年より昭和33年までの分による、ただし、昭和33年は速報による。表47の注参照。

表 50. 国民健康調査による年次別世帯業態別罹患率および罹病日数
(昭和29年-32年)

調 査 年 月	総 数	耕地面積3反以上の世帯				耕地面積3反未満の世帯					
		総 数	専業主 帯	兼業世帯		総 数	事業経 営者世 帯	常用勤 労者世 帯	日雇 労働者 世帯	家内 労働者 世帯	その他 の世帯
				常用勤 労者の いる世 帯	その他 の世帯						
月間罹患率(人口1,000につき)											
昭 29.10	159	138	131	147	170	158	180	143	175	167	
30.11	147	122	119	127	158	155	160	143	148	178	
31.11	164	123	118	131	186	158	210	149	130	152	
32.10	183	171	159	179 212	190	189	200	166	200	147	
月間1人当罹病日数											
昭 29.10	2.01	1.62	1.48	1.82	2.21	1.91	2.26	2.36	1.85	2.69	
30.11	1.72	1.31	1.25	1.39	1.91	1.64	1.95	1.72	1.61	2.85	
31.11	1.91	1.47	1.39	1.60	2.16	1.75	2.30	1.61	1.62	2.99	
32.10	1.95	1.74	1.68	1.74 1.98	2.08	1.75	2.20	1.67	2.12	2.68	
月間罹患1件当罹病日数											
昭 29.10	12.6	11.8	11.3	12.4	13.0	12.1	12.5	16.5	10.6	16.1	
30.11	11.7	10.7	10.5	11.0	12.1	10.6	12.2	12.0	10.9	16.0	
31.11	11.7	12.0	11.7	12.2	11.6	11.1	10.9	10.8	12.5	19.6	
32.10	10.7	10.2	10.6	9.8 9.3	11.0	9.3	11.0	10.0	10.6	18.2	

厚生省大臣官房統計調査部「国民健康調査」昭和29-32年分による。表47の注参照。

表 51. 国民健康調査による世帯種別罹患率および罹病日数
(昭和32年, 31年および30年)

世 帯 種 別	月 間 罹 患 率 (人口1,000につき)			月 間 1 人 当 罹 病 日 数			月 間 罹 患 1 件 当 罹 病 日 数		
	昭 30	昭 31	昭 32	昭 30	昭 31	昭 32	昭 30	昭 31	昭 32
総 数	147	164	183	1.72	1.91	1.95	11.7	11.7	10.7
被 保 護 世 帯	121	138	185	5.31	5.27	5.42	4.38	3.82	2.92
医 療 保 険 加 入 世 帯	149	176	190	1.74	2.00	2.04		11.4	10.7
国 保 加 入 世 帯	134	138	181	1.41	1.59	1.87	11.7	11.6	10.4
国 保 以 外 の 医 療 保 険 加 入 世 帯	159	200	197	1.96	2.28	2.16	12.3	11.3	11.0
そ の 他 の 世 帯	143	134	159	1.43	1.45	1.45	9.7	10.9	9.1

上表の注と同様。

表 52. 国民健康調査による勤労者世帯の現金支出階級別有病率，
罹患者および傷病日数 (昭和32年)

現金支出階級	有病率		月 間		年 間		罹患1 件当罹 病日数
	期 初	期 末	罹患者 率	1人当罹 病日数	罹患者 率	1人当罹 病日数	
総 数	46.7	54.1	190.2	2.20	2239.0	2586	11.6
2000 円 >	68.2	90.9	68.2	3.34	802.8	3934	36.8
2000 ~ 3,999	42.6	31.9	156.9	1.92	1,847.5	2264	12.3
4,000 ~ 5,999	55.7	58.5	157.4	2.54	1,853.0	2993	16.2
6,000 ~ 7,999	39.6	43.9	165.2	1.85	1,945.5	2183	11.2
8,000 ~ 9,999	47.3	50.3	181.1	2.05	2,132.1	2409	11.3
10,000 ~ 14,999	35.2	47.7	189.2	1.92	2,227.8	2259	10.1
15,000 ~ 19,999	45.5	51.7	168.8	2.06	1,987.7	2422	12.2
20,000 ~ 24,999	47.7	57.5	210.9	2.29	2,482.7	2693	10.8
25,000 ~ 29,999	57.6	60.7	199.1	2.47	2,343.9	2913	12.4
30,000 ~ 39,999	53.1	61.5	223.9	2.50	2,635.7	2946	11.2
40,000 円 ≤	60.8	71.7	218.7	2.89	2,575.2	3404	13.2

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年10月国民健康調査」昭和34年3月刊による。表47の注参照。

表 53 国民健康調査による年次別勤労者世帯の現金支出階級別傷病罹患率および傷病日数
(昭和28年—31年)

家計上の現金支出階級	月 間 罹 患 率 (人口1,000につき)				1 人 当 月 間 罹 病 日 数				1 傷 病 当 罹 繼 続 日 数			
	昭 28	昭 29	昭 30	昭 31	昭 28	昭 29	昭 30	昭 31	昭 28	昭 29	昭 30	昭 31
	総 数	169	175	157	202	2.1	2.3	1.9	2.2	1.22	1.30	1.22
5000 円 >	141	103	153	300	2.0	1.1	1.4	3.2	1.39	1.11	9.0	10.5
5,000—9,999	164	141	141	228	1.9	2.3	1.8	2.2	1.15	1.66	1.24	9.5
10,000—14,999	172	174	149	186	2.0	2.1	1.8	2.1	1.16	1.22	1.19	11.1
15,000—19,999	173	185	151	174	2.2	2.3	1.8	1.9	1.25	1.23	1.21	10.8
20,000—24,999	177	188	171	195	2.1	2.4	1.9	2.1	1.20	1.26	1.11	10.7
25,000—29,999	164	181	164	188	2.2	2.1	2.3	2.1	1.36	1.16	1.42	11.2
30,000—34,999	166	203	165	205	2.1	3.0	2.2	2.7	1.42	14.6	1.42	1.33
35,000—39,999												
40,000 円 ≤			226	372			3.1	4.4			13.5	11.9

厚生省大臣官房統計調査部「国民健康調査」昭和28—31年分による。

表 47 の注参照。

表 54 結核実態調査による男女、年齢（5歳階級）別ツ反応陽性率、肺
および肺外結核有所見率ならびに要指導者率（昭和28年）

年齢階級	調査対象数	ツ反応陽性率	肺結核有所見率			肺外結核有所見率	全結核要指導者率			要入院者の要医療者に対する率	
			総数	有病率	治癒者率		総数	要医療	要休養		要注意
総数	50,668	60.1	15.7	5.9	9.8	0.7	6.4	3.4	0.4	2.6	46.8
0-4	6,260	16.4	2.6	1.3	1.3	0.2	1.4	1.0	0.1	0.3	26.6
5-9	6,046	50.3	5.8	1.8	4.0	0.3	2.1	1.1	0.2	0.8	25.0
10-14	5,733	71.0	8.0	1.9	6.1	0.5	2.3	1.3	0.2	0.8	17.6
15-19	4,898	70.8	9.2	3.0	6.2	0.4	3.4	2.4	0.1	0.8	40.0
20-24	4,235	68.8	13.5	5.6	7.8	0.9	6.0	4.0	0.4	1.6	42.1
25-29	5,756	72.6	19.2	8.7	10.5	1.1	9.3	5.8	0.5	3.1	53.7
30-34	3,267	71.1	23.3	10.4	12.9	1.7	11.4	6.6	0.7	4.1	55.1
35-39	3,039	69.5	24.3	8.4	15.9	1.3	9.2	4.9	0.5	3.8	51.0
40-44	2,891	69.2	24.8	9.9	14.9	1.3	10.7	5.1	0.4	5.1	53.4
45-49	2,412	68.7	27.3	10.6	16.7	1.2	11.3	4.8	0.6	6.0	49.6
50-54	2,124	67.1	27.4	9.8	17.6	0.5	10.5	4.8	0.3	5.3	48.5
55-59	1,806	63.9	28.1	9.7	18.4	0.3	10.0	4.2	0.7	5.1	43.4
60-64	1,494	64.4	30.7	10.8	19.9	0.4	11.4	4.6	1.3	5.5	49.3
65-69	1,112	60.3	28.6	10.2	18.4	0.5	11.1	4.9	0.4	5.8	57.4
70-74	799	58.8	33.3	12.5	20.8	0.3	12.9	4.9	1.0	7.0	51.3
75-79	498	58.3	28.5	10.2	18.3	0.2	11.0	4.4	0.6	6.0	68.2
80-84	176	63.4	27.8	10.8	17.0	—	12.5	2.8	0.6	9.1	40.0
85 ≤	74	66.2	31.1	8.1	23.0	—	10.8	1.4	1.4	8.1	100.0

(2) 男

年齢階級	調査 対数	肺結核有所見率		ツ反症 陽性率	肺外結核 有所見率		全結核要指患者率			要入院患者の要 療者に対する率	
		総 数	有病率		治ゆ者率	総 数	要医療	要休養	要注意	要入院者 に対する率	
総 数	24,687	1,688	7.2	9.6	0.7	7.7	4.2	0.5	3.1	50.0	
0 - 4	3,240	3.1	1.6	15	0.2	1.8	1.3	0.1	0.5	24.4	
5 - 9	3,040	5.3	1.7	35	0.3	2.2	1.1	0.3	0.9	28.1	
10 - 14	2,997	8.6	2.2	64	0.6	2.7	1.7	0.2	0.8	15.7	
15 - 19	2,463	10.0	3.4	6.7	0.4	3.9	2.9	0.1	0.9	40.8	
20 - 24	2,066	15.0	6.5	8.4	0.9	6.7	4.6	0.4	1.6	46.3	
25 - 29	1,729	22.8	11.0	11.8	1.1	11.6	7.2	0.6	3.8	58.4	
30 - 34	1,382	26.0	14.1	11.9	1.7	14.9	8.9	0.8	5.2	60.2	
35 - 39	1,351	27.3	11.3	16.0	1.2	12.1	6.6	0.7	4.8	58.4	
40 - 44	1,389	27.9	13.0	15.0	1.4	13.8	6.6	0.7	6.5	59.8	
45 - 49	1,163	30.0	13.3	16.7	1.1	14.2	6.5	0.9	6.7	52.6	
50 - 54	1,075	29.9	12.5	17.4	0.6	13.1	6.3	0.3	6.5	52.9	
55 - 59	883	30.8	12.9	17.9	0.1	13.3	5.5	1.1	6.6	44.9	
60 - 64	717	35.0	15.5	19.5	0.6	16.0	6.7	1.7	7.7	43.8	
65 - 69	513	29.6	13.1	16.6	1.0	13.8	6.2	0.8	6.8	62.5	
70 - 74	369	37.1	16.5	20.6	0.3	16.8	6.5	2.2	8.1	54.2	
75 - 79	195	30.8	12.3	18.5	0.5	12.8	7.2	0.5	5.1	64.3	
80 - 84	68	25.0	10.3	14.7	-	11.8	2.9	-	8.8	50.0	
85 以上	19	42.1	10.5	31.6	-	15.8	-	-	15.8	-	

表 5 4 結核実態調査による男女、年齢別ツ反応陽性率、肺結核有所見率、要指導者率等の諸率 (昭和 2 8 年)

年齢階級	調査対象数	ツ反応陽性率	肺結核有所見率		肺外結核有所見率	全結核要指導者率			要入院者の要医原者に対する率		
			総数	有病率		治癒者率	総数	要医原		要休養	要注意
総数	25,981	57.8	14.6	4.6	9.9	0.7	5.1	2.6	0.3	2.2	41.9
0 - 4	3,020	16.9	2.0	1.0	1.0	0.1	1.1	0.8	0.2	0.1	30.4
5 - 9	3,006	53.8	6.3	1.8	4.5	0.3	2.1	1.2	0.1	0.8	22.2
10 - 14	2,736	73.9	7.3	1.6	5.7	0.4	1.8	0.8	0.1	0.8	21.7
15 - 19	2,435	73.3	8.4	2.6	5.7	0.4	3.0	2.0	0.1	0.8	38.8
20 - 24	2,169	66.2	12.0	4.7	7.3	1.0	5.3	3.5	0.3	1.5	36.8
25 - 29	2,527	65.9	16.2	6.8	9.4	1.0	7.4	4.6	0.3	2.5	47.3
30 - 34	1,885	63.0	21.3	7.7	13.5	1.7	8.8	4.8	0.6	3.3	48.4
35 - 39	1,688	59.5	21.9	6.1	15.8	1.4	6.9	3.6	0.3	3.0	40.0
40 - 44	1,502	59.4	22.0	7.1	14.9	1.3	7.7	3.7	0.2	3.8	42.9
45 - 49	1,249	60.7	24.8	8.1	16.7	1.4	8.6	3.1	0.2	5.3	43.6
50 - 54	1,049	59.4	24.9	7.1	17.7	0.5	7.7	3.3	0.3	4.1	40.0
55 - 59	923	58.7	25.6	6.6	19.0	0.5	6.8	2.9	0.2	3.7	40.7
60 - 64	777	58.9	26.6	6.4	20.2	0.3	7.1	2.7	0.9	3.5	61.9
65 - 69	599	55.2	27.7	7.7	20.0	0.2	8.7	3.7	0.2	4.8	50.0
70 - 74	430	55.1	30.0	9.1	20.9	0.2	9.5	3.5	—	6.0	46.7
75 - 79	303	55.6	27.1	8.9	18.2	—	9.9	2.6	0.7	6.6	75.0
80 - 84	108	65.4	29.6	11.1	18.5	—	13.0	2.8	0.9	9.3	33.3
85 ≦	55	67.9	27.3	7.3	20.0	—	9.1	1.8	1.8	5.5	100.0

調査対象総数中に年齢不詳男 2 8、女 2 0 を含む。
 厚生省編「昭和 2 8 年結核実態調査」結核予防会昭和 3 0 年 3 月刊による。
 結核実態調査は、昭和 2 8 年の夏から秋にかけて実施された標本調査で、全国を 358,522 地区に分け、それより 211 地区を無作為抽出
 した。その地区内の住民(約 5 万人)を調査の客体として全国を推定できるようにしたものである。

表 5.5. 年次別、男女、年齢（5歳階級）別結核罹患率

(昭和24年～32年)

(1) 総数

年齢階級	昭 32	昭 31	昭 30	昭 29	昭 28	昭 27	昭 26	昭 25	昭 24
総数	571.0	575.5	586.2	403.5	439.8	552.6	556.9	520.6	480.6
0 - 4	212.4	170.8	167.2	142.0	164.0	163.4	168.1	134.0	115.0
5 - 9	364.3	395.3	407.0	269.4	286.7	382.1	294.6	239.3	193.0
10 - 14	251.2	294.9	276.8	199.0	237.5	378.1	286.7	226.0	193.7
15 - 19	420.0	458.3	490.5	355.3	415.7	546.2	562.5	579.2	558.2
20 - 24	703.0	781.3	869.4	639.5	752.3	1,030.8	1,085.4	1,140.6	1,111.8
25 - 29	827.2	938.1	1,073.9	766.0	837.1	1,100.7	1,216.5	1,145.4	1,060.8
30 - 34	888.3	925.8	1,003.2	662.0	735.7	853.6	948.3	899.8	838.3
35 - 39	798.5	813.4	844.1	562.3	585.1	751.8	766.0	739.2	670.4
40 - 44	757.4	743.7	744.3	495.8	505.2	614.4	650.5	525.9	460.8
45 - 49	708.2	678.0	671.1	438.1	450.0	505.3	494.6	380.0	343.7
50 - 54	692.3	630.9	604.5	372.3	379.0	459.6	461.8	261.9	182.0
55 - 59	765.0	645.6	573.0	376.3	371.3	402.1	400.3	127.7	
60 - 64	744.1	600.5	545.4	336.1	338.8	370.3	370.3	263.8	
65 - 69	724.8	560.7	467.2	289.9	279.8	237.4	263.8	168.0	
70 - 74	588.8	434.6	346.1	207.2	186.6	168.0	168.0	39.7	
75 - 79	383.4	310.1	237.0	103.8	109.2				
80 - 84	227.0	152.0			71.9				
85 ≦	248.3	210.1	166.7	38.0					

精密統計調査の基礎となる医師からの届出票の1/10を系統抽出して得られた結果、調査対象総数中に年齢不詳男28、女20を含む。
 人口：0万について、厚生省大臣官房統計調査部「伝染病および食中毒精密統計年報」の各年分による。(99頁参照)

(2) 男

年齢階級	昭 32	昭 31	昭 30	昭 29	昭 28	昭 27	昭 26	昭 25	昭 24
総 数	666.8	677.8	698.1	470.0	514.0	646.5	627.3	585.0	546.5
0 - 4	219.8	180.5	180.2	149.1	166.0	180.3	176.2	138.0	121.9
5 - 9	366.4	402.4	430.8	280.5	282.9	396.4	298.6	243.2	194.6
10 - 14	239.4	283.5	266.0	188.8	232.9	382.4	270.8	211.6	185.2
15 - 19	438.7	468.9	501.5	368.6	430.2	538.6	552.6	573.0	562.1
20 - 24	760.6	845.1	941.4	681.3	823.2	1,126.9	1,148.2	1,198.8	1,239.9
25 - 29	918.0	1,079.6	1,266.2	883.4	978.0	1,300.4	1,420.5	1,322.3	1,281.2
30 - 34	1,041.8	1,136.1	1,323.7	832.8	929.0	1,024.5	1,127.5	1,070.5	1,007.1
35 - 39	998.7	1,049.7	1,095.9	751.3	769.9	1,024.5	959.5	920.8	852.6
40 - 44	971.2	991.9	1,019.4	664.1	698.3	868.8	829.0	701.0	606.6
45 - 49	958.8	917.7	934.4	604.8	617.5	680.5	663.9		
50 - 54	936.7	851.9	851.8	494.5	524.5	648.8	614.7	505.8	457.2
55 - 59	1,038.0	876.8	762.2	494.9	498.0	584.7	523.9		
60 - 64	988.4	818.0	730.4	407.3	457.6		501.4	362.5	
65 - 69	985.5	804.1	662.9	382.0	399.5		376.1		
70 - 74	906.7	672.9	512.1	314.9	285.7		256.4	194.5	267.9
75 - 79	596.6	480.2	358.4	150.6	203.8	350.3			
80 - 84	413.3	246.6			66.7		129.5	72.4	
85 ≦	340.4	465.1	245.3	75.5					

(1,000につき)

(5) 女

年齢階級	昭 32	昭 31	昭 30	昭 29	昭 28	昭 27	昭 26	昭 25	昭 24
総 数	478.3	476.6	478.1	339.3	368.1	462.1	489.2	458.6	418.6
0 - 4	204.7	160.6	153.7	134.5	161.9	140.8	159.6	129.7	108.6
5 - 9	362.2	388.0	382.2	257.9	290.5	367.4	290.3	235.2	192.6
10 - 14	263.3	306.7	288.0	209.4	242.2	373.6	302.9	240.8	206.6
15 - 19	401.1	447.5	479.2	341.6	401.0	554.0	572.6	585.3	566.6
20 - 24	645.0	717.5	796.8	597.4	681.1	935.2	1,023.9	1,083.6	1,011.6
25 - 29	737.3	798.5	887.9	652.6	703.1	918.0	1,045.1	992.5	904.7
30 - 34	747.7	741.4	744.2	524.0	582.3	717.1	799.8	758.3	712.7
35 - 39	638.4	621.3	631.0	402.4	426.3	514.2	594.0	577.6	546.2
40 - 44	571.6	525.7	497.9	345.1	330.0	380.6	477.1	410.5	314.8
45 - 49	478.2	453.3	416.2	276.9	284.6	329.0	322.4		
50 - 54	449.8	408.9	374.8	248.8	231.0	267.0	304.8	252.0	227.6
55 - 59	492.7	412.5	382.0	255.5	243.4	216.5	275.9		
60 - 64	507.5	390.4	367.5	267.4	226.0		248.4	173.4	
65 - 69	493.1	345.9	297.7	210.1	177.4		171.3		141.3
70 - 74	349.2	257.3	223.5	127.7	113.8	146.4	106.2	81.0	
75 - 79	246.4	200.4	158.9	73.6	48.8				
80 - 84	124.1	99.2	127.4	19.1	74.6		33.2	22.9	
85 ≦	205.9	94.7							

伝染病および食中毒の患者または死者の発生をできるだけ速かに把握するために、簡速統計制度があるが、複雑・微妙な伝染病および食中毒の発生状況を解明するためにより精密な調査が要請され本精密統計調査が実施されている。精密調査では簡速統計と同じく医師よりの届出票を基礎資料としているが、ましん・百日咳・性病・結核については届出票の1/10を系統抽出、他の疾患は全数を調査主体としている。

表 5 6 人口問題研究所第 12 回簡速静止人口表
(昭和 33 年 4 月 - 昭和 34 年 3 月)

(1) 男

x	nL_x	T_x	l_x	nd_x	nP_x	nq_x	${}^o e_x$
0	97,104	6,498,414	100,000	3,657	0.96343	0.03657	64.98
1	96,082	6,401,310	96,343	428	0.99556	0.00444	66.44
2	95,757	6,305,228	95,915	316	0.99671	0.00329	65.74
3	95,475	6,209,471	95,599	249	0.99740	0.00260	64.95
4	95,247	6,113,996	95,350	206	0.99784	0.00216	64.12
5 - 9	474,087	6,018,749	95,144	554	0.99418	0.00582	63.26
10 - 14	472,195	5,544,662	94,590	311	0.99671	0.00329	58.62
15 - 19	470,081	5,072,467	94,279	588	0.99376	0.00624	53.80
20 - 24	466,227	4,602,386	93,691	939	0.98998	0.01002	49.12
25 - 29	460,953	4,136,159	92,752	1,138	0.98773	0.01227	44.59
30 - 34	455,107	3,675,206	91,614	1,200	0.98690	0.01310	40.12
35 - 39	448,675	3,220,099	90,414	1,411	0.98439	0.01561	35.62
40 - 44	440,531	2,771,424	89,003	1,901	0.97864	0.02136	31.14
45 - 49	428,953	2,330,893	87,102	2,820	0.96762	0.03238	26.76
50 - 54	411,131	1,901,940	84,282	4,407	0.94771	0.05229	22.57
55 - 59	384,220	1,490,809	79,875	6,462	0.91910	0.08090	18.66
60 - 64	344,983	1,106,589	73,413	9,371	0.87235	0.12765	15.07
65 - 69	290,073	761,606	64,042	12,559	0.80389	0.19611	11.89
70 - 74	220,649	471,533	51,483	14,972	0.70919	0.29081	9.16
75 - 79	144,065	250,884	36,511	15,194	0.58385	0.41615	6.87
80 ≦	106,819	106,819	21,317	21,317	0.00000	1.00000	5.01

昭和 33 年 4 月 - 34 年 3 月の死亡事実に基づいて算定されたもの。
厚生省人口問題研究所研究資料、第 133 号、「第 12 回簡速静止人口表(生命表)(昭和 33 年 4 月 1 日 - 34 年 3 月 31 日)付第 4 回、第 6 回 - 第 9 回完全生命表、第 1 回 - 第 12 回人口問題研究所簡速静止人口表比較」昭和 34 年 10 月刊による。

(次頁に)

表 56 人口問題研究所第 12 回簡速静止人口表

(2) 女

x	nLx	Tx	lx	ndx	np_x	q_x	e_x
0	97,560	6,952,398	100,000	3,095	0.96905	0.03095	69.52
1	96,668	6,854,838	96,905	398	0.99589	0.00411	70.74
2	96,364	6,758,170	96,507	286	0.99704	0.00296	70.03
3	96,109	6,661,806	96,221	225	0.99766	0.00234	69.23
4	95,905	6,565,697	95,996	183	0.99809	0.00191	68.40
5 - 9	477,823	6,469,792	95,813	401	0.99581	0.00419	67.53
10 - 14	476,505	5,991,969	95,412	230	0.99759	0.00241	62.88
15 - 19	474,983	5,515,464	95,182	415	0.99564	0.00436	57.95
20 - 24	472,252	5,040,481	94,767	672	0.99291	0.00709	53.19
25 - 29	468,383	4,568,229	94,095	858	0.99088	0.00912	48.55
30 - 34	463,855	4,099,846	93,237	952	0.98979	0.01021	43.97
35 - 39	458,689	3,635,991	92,285	1,136	0.98769	0.01231	39.40
40 - 44	452,221	3,177,302	91,149	1,483	0.98373	0.01627	34.86
45 - 49	443,405	2,725,081	89,666	2,093	0.97666	0.02334	30.39
50 - 54	430,736	2,281,676	87,573	3,019	0.96553	0.03447	26.05
55 - 59	412,819	1,850,940	84,554	4,238	0.94988	0.05012	21.89
60 - 64	386,540	1,438,121	80,316	6,484	0.91927	0.08073	17.91
65 - 69	346,434	1,051,581	73,832	9,684	0.86884	0.13116	14.24
70 - 74	288,848	705,147	64,148	13,366	0.79164	0.20836	10.99
75 - 79	213,864	416,299	50,782	16,355	0.67794	0.32206	8.20
80 ≤	202,435	202,435	34,427	34,427	0.00000	1.00000	5.88

この生命表に用いられている記号の名称は次のとおり

x …… 年齢、 nLx …… 年齢階級間における静止人口（生存年数）、 n^Tx …… x 才以上の静止人口の合計（生存延年数）、 lx …… 年齢階級の最初における生存数、 ndx …… 年齢階級間における死亡数、 np_x …… 年齢階級の最初における生存数が次の年齢階級に到達する割合、 q_x …… 年齢階級の最初の生存数に対するその階級の死亡数の比、 e_x …… 年齢階級の最初における平均余命。

表 57 各回生命表における死亡率 (q_x) および平均余命 (e_x) (大正10年 - 昭和27年)

(1,000につき)

(1) 死亡率 (q_x)

x (年齢)	男					女				
	第4回	第5回	第6回	第8回	第9回	第4回	第5回	第6回	第8回	第9回
0	162.04	140.00	113.03	85.98	56.69	144.00	124.14	99.17	76.64	49.73
5	7.04	6.44	6.48	5.13	3.10	7.76	7.09	6.57	4.79	2.94
10	3.17	2.63	2.40	1.96	1.09	3.73	3.00	2.54	1.83	0.95
15	5.97	5.02	4.79	2.61	1.23	9.01	7.32	6.95	3.05	1.29
20	10.80	9.82	9.96	7.69	3.14	12.08	10.59	9.60	6.94	2.77
25	9.51	8.61	9.22	9.50	4.19	11.17	9.64	9.06	7.65	3.77
30	8.23	7.39	7.69	8.44	4.37	10.45	8.94	8.06	7.26	3.99
35	8.71	7.70	7.60	8.53	4.49	10.73	9.26	8.24	7.00	4.22
40	10.53	9.58	8.91	9.10	5.61	11.54	10.05	9.01	7.54	4.95
45	13.71	12.69	11.85	11.08	7.49	11.30	10.17	9.49	8.20	5.90
50	18.62	17.50	17.25	14.82	10.73	13.82	12.62	12.11	11.11	8.04
55	26.27	24.95	23.98	21.22	16.10	18.39	16.86	15.90	14.39	11.46
60	39.15	36.71	35.54	33.25	24.77	26.40	24.16	22.74	22.07	16.90
65	57.05	54.86	51.91	51.10	40.59	39.77	37.08	34.08	33.53	27.46
70	84.80	80.35	76.68	75.06	61.70	61.57	57.67	53.33	52.03	43.51
75	124.46	117.53	113.26	108.15	91.97	95.85	88.92	85.30	81.17	69.12
80	182.74	170.20	166.15	153.09	134.68	150.26	138.54	137.53	126.43	109.45
85	264.60	243.20	240.96	213.21	193.89	233.15	213.72	220.00	195.05	171.58
90	372.76	341.41	342.75	291.63	273.92	353.51	322.69	343.32	294.70	263.59
95	510.59	462.72	470.32	386.94	377.48	511.07	470.09	510.07	430.96	392.57
100	666.24	604.84	621.32	505.73	503.12	693.98	642.34	702.91	597.90	551.72

x 才の者のうち $(x+1)$ 才に到達しないで死亡する者の割合を死亡率といい q_x で表わす。また、ここには掲げていないが、 x 才の者のうち $(x+1)$ 才に到達する者の割合は生存率といい p_x で表わす。
* 才の者の (次頁に)

(2) 平均余命 (回)

(1,000につき)

X	男					女				
	第4回	第5回	第6回	第8回	第9回	第4回	第5回	第6回	第8回	第9回
0	42.06	44.82	46.92	50.06	59.57	43.20	46.54	49.63	53.96	62.97
5	50.35	51.85	52.22	53.61	60.10	50.71	53.00	54.40	57.45	63.28
10	46.53	47.93	48.25	49.49	55.68	47.00	49.18	50.47	53.31	58.82
15	42.31	43.58	43.85	44.93	50.95	43.12	45.11	46.33	48.81	54.10
20	39.10	40.18	40.41	40.89	46.43	40.38	42.12	43.22	44.87	49.58
25	36.06	37.01	37.55	37.60	42.24	37.72	39.23	40.23	41.48	45.35
30	32.59	33.43	33.89	34.23	38.10	34.69	35.98	36.88	37.95	41.20
35	28.87	29.61	30.10	30.62	33.87	31.44	32.53	33.30	34.24	36.99
40	25.13	25.74	26.22	26.88	29.65	28.09	29.01	29.65	30.39	32.77
45	21.49	22.02	22.43	23.12	25.52	24.58	25.39	25.91	26.52	28.58
50	18.02	18.49	18.85	19.44	21.54	20.95	21.67	22.15	22.64	24.47
55	14.77	15.21	15.55	15.97	17.79	17.43	18.09	18.54	18.92	20.53
60	11.87	12.23	12.55	12.83	14.36	14.12	14.68	15.07	15.39	16.81
65	9.31	9.64	9.89	10.16	11.35	11.10	11.58	11.88	12.22	13.36
70	7.11	7.43	7.62	7.93	8.82	8.44	8.88	9.04	9.41	10.34
75	5.31	5.61	5.72	6.09	6.73	6.21	6.59	6.62	7.03	7.76
80	3.87	4.15	4.20	4.62	5.04	4.41	4.73	4.67	5.09	5.64
85	2.77	3.02	3.03	3.46	3.72	3.04	3.30	3.17	3.58	3.97
90	1.95	2.17	2.14	2.56	2.70	2.04	2.24	2.09	2.45	2.72
95	1.37	1.55	1.51	1.89	1.95	1.36	1.50	1.35	1.65	1.83
100	0.83	1.09	1.07	1.23	1.40	0.89	1.01	0.89	1.05	1.22

才の生存数が、その生命表の死亡秩序に従いその後平均して何年生きられるかという期待値をいい、 e_x で表わす。各回とも完全生命表によるもので、第6回までは内閣統計局、第8回以後は厚生省大臣官房統計調査部が作成、その年次を示すと、第4回……大正10-14年、第5回……大正15-昭和5年、第6回……昭和10年4月-11年3月、第8回……昭和22年、第9回……昭和25年10月-27年9月で、各調査期間の死亡率に基づき算出されたもの。

表 58 主要国における生命表の死亡率(%)

(1,000につき)

年 齢	イギリス ¹⁾ (1950-52)	フランス (1951-51)	西ドイツ ²⁾ (1949-51)	オランダ (1953-55)	デンマーク ³⁾ (1946-50)	ノルウェー (1946-50)	スウェーデン (1951-55)	オーストリア (1949-51)	ポーランド (1952-53)
男									
0	3.27	5.21	6.18	25.7	45.3	34.2	22.4	75.2	102.2
5	0.8	0.9	1.2	0.8	0.9	1.3	0.8	1.4	1.8
10	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8	1.1
15	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	1.2	1.5
20	1.3	1.6	1.9	0.8	1.6	1.9	1.3	2.3	2.7
30	1.6	2.5	2.3	1.2	1.9	2.1	1.5	2.5	3.0
40	2.9	4.6	3.5	2.1	2.9	2.9	2.2	4.0	4.9
50	8.5	11.0	8.5	5.7	6.6	6.1	5.6	10.1	10.4
60	23.7	22.8	18.9	15.2	16.2	13.6	15.6	23.4	25.2
70	56.5	52.4	45.8	37.4	40.5	34.1	39.9	53.8	59.2
女									
0	25.1	40.2	49.1	18.5	34.7	25.7	17.2	58.4	83.1
5	0.6	0.8	1.0	0.5	0.6	0.9	0.4	1.2	1.5
10	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.8
15	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.7	0.4	0.8	1.0
20	0.8	1.1	1.2	0.4	0.9	1.1	0.6	1.3	1.7
30	1.3	1.8	1.7	0.9	1.6	1.4	1.0	1.8	2.2
40	2.3	2.9	2.6	1.7	2.7	2.2	1.9	3.0	3.3
50	5.2	6.1	5.5	4.1	5.8	4.4	4.5	6.2	6.3
60	12.7	13.2	12.9	10.3	13.4	10.4	11.2	13.7	15.1
70	35.3	34.8	39.1	31.8	37.7	29.3	33.2	40.6	42.2

(1,000につき)

* 年齢	カナダ	アメリカ	アルゼンチン	ブラジル	インド	オーストラリア	ニュージーランド	南ア連邦	ソウェット
	(1950-52)	(1955)	(1947)	(1949-51)	(1941-50)	(1946-48)	(1950-52)	(1945-47)	(1926-27)
0	43.3	26.7	92.9	105.7	190.0	32.0	250	41.3	201.0
5	1.0	2.7	7.4	2.8	17.1	1.1	0.8	1.6	10.9
10	0.8	2.9	6.0	1.6	13.1	3.7	0.5	0.9	3.2
15	1.1	6.4	11.2	2.1	10.6	1.2	1.1	1.3	3.2
20	1.7	8.9	15.3	4.9	10.5	1.7	1.6	2.0	5.4
30	1.9	8.8	17.9	7.7	14.1	1.9	1.6	2.4	6.4
40	3.3	20.7	35.9	11.1	20.2	3.4	2.7	4.6	9.3
50	8.5	55.8	81.9	19.7	32.3	9.2	7.3	11.5	16.6
60	20.7	127.2	163.2	38.8	57.3	22.8	19.5	25.4	27.9
70	44.4	255.5	314.9	74.6	104.4	52.6	47.2	51.7	59.7
女									
0	34.2	20.4	79.3	88.2	175.0	25.2	200	32.9	172.1
5	0.8	1.9	6.5	2.8	20.6	0.8	0.5	1.3	10.5
10	0.5	1.6	5.8	1.2	13.1	0.5	0.3	0.8	2.9
15	0.7	2.6	11.6	2.7	8.4	0.6	0.5	1.0	3.2
20	0.9	3.2	14.5	4.2	7.8	0.9	0.7	1.3	4.7
30	1.3	5.0	16.1	6.0	16.7	1.7	1.1	2.0	6.0
40	2.6	12.0	25.9	6.8	24.3	2.8	2.1	3.7	7.3
50	5.6	27.9	49.6	11.5	31.3	6.4	5.5	8.1	9.4
60	13.1	68.4	105.2	22.0	50.0	13.6	13.2	15.7	18.3
70	33.1	171.5	241.7	44.9	88.2	36.1	32.8	36.6	45.8

1) イングランド、ウェールズ、2) ガールを除く。3) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。4) ニューコンおよび北西部地域を除く。5) 白人。6) 連邦地域。7) 1951年センサスにおける住民294,749千人の住む地域による資料、5歳未満および60歳以上推定。8) 純血の原住民を除く。9) ヨーロッパ人。10) ヨーロッパの部分。

United Nations: Demographic Yearbook, 1957年版による。

表 59 主要国における生命表の平均余命(ex)

(年)

エ (年齢)	イギリス ¹⁾ (1956年)	フランス (1952-56)	西ドイツ ²⁾ (1949-51)	オランダ (1953-55)	デンマーク ³⁾ (1951-55)	ノールウェイ (1951-55)	スウェーデン (1951-55)	オーストリア (1949-51)	ポーランド (1952-53)
0	67.76	65.04	64.56	71.0	62.87	71.11	70.49	61.91	58.6
5	64.89	63.31	64.47	68.2	67.56	68.40	67.45	62.70	61.4
10	60.03	58.48	59.76	63.4	62.74	63.65	62.67	58.02	56.8
15	55.15	53.63	54.98	58.5	57.86	58.83	57.82	53.26	52.1
20	50.35	48.90	50.34	53.7	53.09	54.11	53.10	48.68	47.6
30	40.85	39.69	41.32	44.2	43.73	44.81	43.74	39.71	38.9
40	31.42	30.68	32.32	34.8	34.38	35.54	34.42	30.74	30.1
50	22.53	22.36	23.75	25.7	25.46	26.60	25.45	22.31	21.8
60	14.97	15.24	16.20	17.8	17.50	18.52	17.38	15.12	14.7
70	9.15	9.26	9.84	10.8	10.70	11.60	10.63	9.27	9.1
男									
0	73.30	71.15	68.48	73.9	72.60	74.70	73.43	66.97	64.2
5	70.07	68.95	67.61	70.6	69.66	71.57	69.99	66.89	66.1
10	65.18	64.09	62.84	65.7	64.78	66.72	65.12	62.15	61.4
15	60.27	59.20	57.99	60.8	59.86	61.83	60.23	57.34	56.7
20	55.37	54.36	53.24	56.0	54.99	56.96	55.36	52.62	52.0
30	45.68	44.84	43.89	46.2	45.34	47.31	45.72	43.37	43.0
40	36.19	35.58	34.67	36.7	35.89	37.79	36.22	34.20	34.0
50	27.11	26.73	25.75	27.5	26.85	28.57	27.07	25.42	25.3
60	18.69	18.54	17.46	18.9	18.44	19.93	18.61	17.27	17.3
70	11.45	11.31	10.42	11.5	11.17	12.30	11.28	10.37	10.6
女									

(年)

#	(年)									
	4) カナダ (1950-52)	5) アメリカ (1956)	アルゼンチン (1947)	6) ブラジル (1949-51)	7) インド (1941-50)	8) オーストラリア (1955-55)	9) ニュージーランド (1950-52)	5) 南ア連邦 (1945-47)	10) ソヴェト (1926-27)	
0	66.33	67.3	56.9	49.80	52.45	67.14	68.29	63.78	41.93	
5	64.86	64.4	59.3	53.87	40.86	64.32	65.39	62.32	54.72	
10	60.15	59.6	54.7	49.44	38.97	59.53	60.60	57.71	51.65	
15	55.39	54.8	50.0	44.82	36.24	54.72	55.79	52.97	47.34	
20	50.76	50.1	45.6	40.54	33.03	50.10	51.15	48.35	43.24	
30	41.60	40.9	36.9	32.82	26.58	40.90	41.89	39.29	35.65	
40	32.45	31.6	28.2	25.45	20.53	31.65	32.65	30.38	28.02	
50	23.88	23.1	20.4	18.63	14.89	22.92	23.83	22.21	20.99	
60	16.49	15.9	13.8	12.80	10.13	15.47	16.19	15.34	14.85	
70	10.41	10.3	8.5	8.34	6.51	9.59	10.05	9.79	9.65	
女										
0	70.83	73.7	61.4	55.96	31.66	72.75	72.43	68.31	46.79	
5	68.80	70.5	63.3	59.98	40.91	69.61	69.23	66.40	58.79	
10	64.02	65.6	58.7	55.54	39.45	64.78	64.37	61.73	55.72	
15	59.19	60.7	54.0	50.88	36.56	59.90	59.47	56.97	51.45	
20	54.41	55.9	49.6	46.71	32.90	55.06	54.64	52.27	47.36	
30	44.94	46.2	41.1	39.01	26.18	45.43	45.06	43.06	39.75	
40	35.63	36.7	32.4	31.21	21.06	36.00	35.64	34.07	32.12	
50	26.80	27.7	24.1	23.58	16.15	27.03	26.68	25.66	24.41	
60	18.64	19.3	16.5	16.60	11.33	18.78	18.53	18.04	17.07	
70	11.62	12.2	10.1	10.68	7.53	11.62	11.46	11.39	10.96	

1) - 9) は前表の注と同様、10) ヨーロッパの部分で、1955-56年の \bar{x}_0 (0歳の平均余命) 男63、女69となつてゐる。
United Nations; Demographic Yearbook, 1958年版による。

表60 職業(大分類)および産業(大分類)別生命表による男子死亡率(%) (昭和29年-31年)

職業(大分類)	年												階級																	
	15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
昭和30年簡易的業務	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216
生命表	92	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121	92	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121	92	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121
農林漁業	74	103	102	98	114	158	222	307	421	571	74	103	102	98	114	158	222	307	421	571	74	103	102	98	114	158	222	307	421	571
採石	57	84	96	107	138	202	321	494	714	976	57	84	96	107	138	202	321	494	714	976	57	84	96	107	138	202	321	494	714	976
林業	81	119	131	138	162	220	319	483	670	951	81	119	131	138	162	220	319	483	670	951	81	119	131	138	162	220	319	483	670	951
採石	217	240	239	242	261	341	439	664	1,168	2,084	217	240	239	242	261	341	439	664	1,168	2,084	217	240	239	242	261	341	439	664	1,168	2,084
運送	172	140	117	112	131	183	260	416	725	1,247	172	140	117	112	131	183	260	416	725	1,247	172	140	117	112	131	183	260	416	725	1,247
技能工	68	106	116	121	144	204	316	494	749	1,097	68	106	116	121	144	204	316	494	749	1,097	68	106	116	121	144	204	316	494	749	1,097
他に分類されない単純労働者	66	136	160	166	187	244	348	499	695	933	66	136	160	166	187	244	348	499	695	933	66	136	160	166	187	244	348	499	695	933
他に分類されない単純労働者(再掲)	49	72	77	81	105	157	237	365	578	908	49	72	77	81	105	157	237	365	578	908	49	72	77	81	105	157	237	365	578	908

産業(大分類)	年												階級																	
	15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64		
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
昭和30年簡易的業務	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216	73	133	142	150	174	233	355	542	824	1,216
生命表	83	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121	83	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121	83	120	133	141	165	225	326	492	749	1,121
農林漁業	76	103	102	98	114	158	222	307	421	571	76	103	102	98	114	158	222	307	421	571	76	103	102	98	114	158	222	307	421	571
水産	151	183	190	193	215	268	382	575	857	1,243	151	183	190	193	215	268	382	575	857	1,243	151	183	190	193	215	268	382	575	857	1,243
建設	66	92	96	98	119	175	278	451	718	1,106	66	92	96	98	119	175	278	451	718	1,106	66	92	96	98	119	175	278	451	718	1,106
製造	44	70	79	89	115	174	274	423	626	890	44	70	79	89	115	174	274	423	626	890	44	70	79	89	115	174	274	423	626	890
小売	34	65	77	85	105	144	230	363	537	753	34	65	77	85	105	144	230	363	537	753	34	65	77	85	105	144	230	363	537	753
不動産	160	140	124	120	137	179	258	361	478	1,103	160	140	124	120	137	179	258	361	478	1,103	160	140	124	120	137	179	258	361	478	1,103
その他	61	73	79	88	112	159	255	361	561	858	61	73	79	88	112	159	255	361	561	858	61	73	79	88	112	159	255	361	561	858
事務	53	77	85	87	109	167	265	387	508	606	53	77	85	87	109	167	265	387	508	606	53	77	85	87	109	167	265	387	508	606

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年~昭和31年 職業別・産業別死亡統計—人口動態統計特殊報告」昭和34年3月刊による。
1,000 について。

表 61 職業（大分類）および産業（大分類）別生命表による男子平均餘命（年）
（昭和29年-31年）

職業（大分類）	年											
	年齢											
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60	
(1) 職業	昭和30年	45.3	40.6	36.1	31.6	27.0	22.5	17.9	13.5	9.1	4.7	表
	専門的・技術的	46.6	42.0	37.3	32.6	27.8	23.1	18.4	13.8	9.3	4.7	命
	事務	—	42.9	38.1	33.3	28.5	23.7	18.9	14.2	9.5	4.8	事
	販売	46.0	41.3	36.7	32.0	27.4	22.7	18.2	13.7	9.2	4.8	者
	農林・漁業	46.3	41.6	36.9	32.2	27.5	22.9	18.3	13.7	9.3	4.8	者
	採石	45.6	40.9	36.4	31.9	27.3	22.7	18.1	13.6	9.2	4.7	者
	運輸	42.7	38.6	34.5	30.3	26.0	21.6	17.3	12.9	8.7	4.5	者
	技能工・生産工程	45.5	41.3	36.8	32.2	27.6	22.9	18.3	13.7	9.2	4.7	者
	単純労働者	45.9	41.2	36.6	32.0	27.3	22.7	18.1	13.6	9.2	4.7	者
	他に分類されない単純労働者（再掲）	45.3	40.6	36.1	31.7	27.2	22.6	18.1	13.7	9.3	4.8	者
その他	46.9	42.1	37.4	32.7	28.0	23.2	18.5	13.9	9.4	4.8	者	
(2) 産業	年											
(2) 産業	昭和30年	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	60
		45.3	40.6	36.1	31.6	27.0	22.5	17.9	13.5	9.1	4.7	表
		45.5	40.9	36.3	31.8	27.2	22.6	18.1	13.6	9.2	4.7	業
		46.8	42.1	37.5	32.9	28.2	23.5	18.8	14.2	9.6	4.9	業
		45.4	40.8	36.2	31.7	27.2	22.6	18.1	13.6	9.2	4.7	業
		44.2	39.8	35.5	31.2	26.7	22.5	18.0	13.4	9.1	4.7	業
		45.1	40.6	36.1	31.6	27.0	22.5	17.8	13.5	9.2	4.7	業
		46.3	41.6	37.0	32.3	27.6	22.9	18.2	13.7	9.2	4.7	業
		47.1	41.9	37.2	32.5	27.7	23.0	18.4	13.8	9.3	4.8	業
		45.6	42.3	37.5	32.8	28.0	23.3	18.6	14.0	9.4	4.8	業
46.9	41.3	36.8	32.3	27.6	23.0	18.4	13.8	9.2	4.8	業		
46.9	42.1	37.4	32.7	28.0	23.2	18.6	14.0	9.4	4.8	業		
46.9	42.1	37.4	32.7	28.0	23.2	18.6	14.0	9.5	4.8	業務		

前表の注と同様

表 6.2 年次別、男女、死因別死亡率順位（明治33年—昭和32年）

(1) 男

年次	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率
明治 33	脳 卒	171.7	全 結	162.0	胃 腸 炎	131.0	気管支炎	129.8	肺 炎	110.2
38	全 結	192.8	脳 卒	175.6	肺 炎	155.1	胃 腸 炎	129.3	気管支炎	122.4
43	全 結	214.1	胃 腸 炎	207.2	肺 炎	148.7	脳 卒	144.3	気管支炎	123.5
大正 4	胃 腸 炎	218.7	全 結	206.8	肺 炎	170.5	脳 卒	141.2	気管支炎	101.5
9	肺 炎	315.8	胃 腸 炎	250.7	全 結	208.8	流 感	191.0	脳 卒	175.4
14	胃 腸 炎	234.4	肺 炎	225.4	全 結	185.1	脳 卒	182.5	腎 臓 炎	100.0
15	胃 腸 炎	218.4	全 結	182.6	脳 卒	179.9	肺 炎	166.6	腎 臓 炎	97.7
昭和 10	全 結	193.6	脳 卒	181.3	胃 腸 炎	170.6	肺 炎	163.2	老 衰	91.9
15	全 結	227.8	脳 卒	198.0	胃 腸 炎	173.5	胃 腸 炎	154.4	老 衰	100.5
22	全 結	208.9	肺 炎	146.1	胃 腸 炎	142.1	脳 卒	136.0	老 衰	84.4
23	全 結	198.6	脳 卒	119.5	胃 腸 炎	112.6	肺 炎	72.8	が	71.6
24	全 結	185.4	脳 卒	122.7	胃 腸 炎	94.3	が	75.5	肺 炎	74.1
25	全 結	159.5	脳 卒	127.9	胃 腸 炎	81.4	が	80.1	肺 炎	68.8
26	脳 卒	126.3	全 結	121.0	が	81.6	胃 腸 炎	65.9	肺 炎	64.4
27	脳 卒	130.5	全 結	91.2	が	85.0	心臓の疾患	61.3	老 衰	55.7
28	脳 卒	136.7	心	87.5	全 結	74.6	心臓の疾患	66.3	老 衰	62.5
29	脳 卒	138.2	心	91.5	全 結	72.0	心臓の疾患	61.6	不慮の事故	60.3
30	脳 卒	143.1	心	94.0	心臓の疾患	62.2	全 結	60.7	不慮の事故	56.8
31	脳 卒	156.5	心	98.4	心臓の疾患	67.6	老 衰	61.0	全 結	57.5
32	脳 卒	162.6	心	100.0	心臓の疾患	76.0	老 衰	63.5	不慮の事故	58.1

(2) 女

年次	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死	因	死	因	死	因	死	因	死	因
明治 33	全	核	老	衰	腦	卒	胃	腸	氣	炎
明治 38	全	核	老	衰	腦	卒	胃	腸	肺	炎
明治 43	全	核	胃	炎	老	衰	肺	炎	腦	中
大正 4	全	核	胃	炎	胃	衰	老	衰	老	中
大正 9	全	炎	胃	炎	胃	核	流	感	老	衰
大正 14	肺	炎	肺	炎	全	核	腦	中	老	衰
大正 5	胃	炎	全	核	全	核	腦	中	老	衰
昭和 10	胃	核	全	炎	肺	卒	肺	衰	老	衰
昭和 15	全	核	胃	炎	腦	卒	老	衰	肺	炎
昭和 22	全	核	胃	炎	腦	卒	老	衰	老	衰
昭和 23	全	核	腦	中	腦	卒	老	衰	老	衰
昭和 24	全	核	腦	中	腦	卒	老	衰	老	衰
昭和 25	全	核	腦	中	腦	卒	老	衰	老	衰
昭和 26	全	核	腦	中	腦	卒	老	衰	老	衰
昭和 27	全	核	老	衰	全	衰	老	衰	心	患
昭和 28	全	核	老	衰	老	衰	老	衰	全	核
昭和 29	全	核	老	衰	老	衰	老	衰	全	核
昭和 30	全	核	老	衰	老	衰	老	衰	全	核
昭和 31	全	核	老	衰	老	衰	老	衰	全	核
昭和 32	全	核	老	衰	老	衰	老	衰	肺	炎

死亡率は人口10万に於いてのもの。年次によって死因名および内容に変化があるが、詳細については引用書参照。死因のうち、脳卒中とは中枢神経系の血管損傷、胃腸炎は胃炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎、がんは悪性新生物、流感はインフルエンザ、腎臓炎は腎炎およびネフローゼ、老衰は精神病の記載のない、老衰のそれぞれ国際簡単分類による死因名を省略したもの。(昭和15年以前には沖繩を含む)厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

表 63 主要国における死因別死亡率順位 (1954年 - 57年)

国 (調査年次)	第 1 位		第 2 位	
	死 因	率	死 因	率
イギリス ¹⁾ (1956)	心臓の疾患	351.9	が ん	207.6
フランス (1957)	心臓の疾患	208.4	が ん	189.6
西ドイツ (1956)	心臓の疾患	206.8	が ん	195.6
イタリア (1956)	心臓の疾患	237.9	脳 卒 中	141.6
オランダ (1957)	心臓の疾患	182.4	が ん	158.5
ベルギー (1956)	心臓の疾患	229.6	が ん	208.6
デンマーク (1956)	心臓の疾患	261.2	が ん	196.2
ノールウェー (1956)	心臓の疾患	215.7	が ん	160.0
スウェーデン (1956)	心臓の疾患	282.7	が ん	167.8
フィンランド (1957)	心臓の疾患	229.3	が ん	152.6
ポルトガル (1957)	老 衰 等	189.7	心臓の疾患	147.8
オーストリア (1957)	心臓の疾患	328.2	が ん	246.2
ハンガリー (1957)	心臓の疾患	217.2	が ん	156.2
ギリシア (1957)	老 衰 等	184.2	心臓の疾患	102.1
スイス (1956)	心臓の疾患	267.5	が ん	190.9
カナダ (1957)	心臓の疾患	252.3	が ん	128.9
アメリカ (1956)	心臓の疾患	317.3	が ん	147.9
メキシコ (1956)	胃 腸 炎	184.5	肺 炎	146.9
チリ (1954)	肺 炎	229.0	老 衰 等	160.3
フィリピン (1956)	老 衰 等	183.4	全 結 核	100.7
セイロン (1956)	老 衰 等	210.4	先天性弱質等	109.9
オーストラリア ³⁾ (1957)	心臓の疾患	270.4	が ん	131.5
ニュージーランド ⁴⁾ (1956)	心臓の疾患	289.3	が ん	149.6
アラブ連合 ²⁾ (1955)	胃 腸 炎	844.2	老 衰 等	281.0
南ア連邦 ⁴⁾ (1956)	心臓の疾患	202.4	が ん	130.7

死亡率は人口10万についてのもの。

- 1) イングランド・ウェールズ、2) エジプト、3) 純血の原住民を除く、
4) ヨーロッパ人のみ。

United Nations: Demographic Yearbook, 1958年版による。

(次頁に)

表 63 主要国における死因別死亡率順位(つづき)

国	第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	率	死 因	率	死 因	率
イギリス	脳 卒 中	166.8	気 管 支 炎	66.4	肺 炎	50.1
フランス	老 衰 等	186.8	脳 卒 中	138.1	不慮の事故	63.7
西ドイツ	脳 卒 中	174.4	老 衰 等	82.2	不慮の事故	58.7
イタリア	が ん	135.3	老 衰 等	66.2	肺 炎	58.9
オランダ	脳 卒 中	101.7	不慮の事故	36.9	老 衰	29.9
ベルギー	老 衰	164.2	脳 卒 中	70.7	不慮の事故	58.1
デンマーク	脳 卒 中	114.5	不慮の事故	43.5	自殺・自傷	22.5
ノールウェー	脳 卒 中	132.8	老 衰 等	60.9	不慮の事故	47.6
スウェーデン	脳 卒 中	138.8	不慮の事故	40.6	肺 炎	38.8
フィンランド	脳 卒 中	136.4	不慮の事故	54.0	肺 炎	39.0
ポルトガル	脳 卒 中	112.0	胃 腸 炎	98.0	肺 炎	88.9
オーストリア	脳 卒 中	167.0	不慮の事故	72.6	肺 炎	51.3
ハンガリー	脳 卒 中	138.4	老 衰 等	72.5	肺 炎	68.8
ギリシア	が ん	93.1	脳 卒 中	71.4	不慮の事故	27.1
スイス	脳 卒 中	138.3	不慮の事故	55.9	高血圧症	26.1
カナダ	脳 卒 中	91.3	不慮の事故	58.2	肺 炎	32.5
アメリカ	脳 卒 中	106.3	不慮の事故	56.7	高血圧症	49.8
メキシコ	老 衰 等	132.4	心臓の疾患	70.9	先天性弱質等	63.1
チリー	先天性弱質等	142.8	が ん	90.2	心臓の疾患	72.5
フィリピン	肺 炎	95.6	気 管 支 炎	65.6	先天性弱質等	63.6
セイロン	肺 炎	63.1	伝染性疾患等	55.1	心臓の疾患	48.7
オーストラリア	脳 卒 中	119.0	不慮の事故	55.4	肺 炎	33.7
ニュージーランド	脳 卒 中	110.6	不慮の事故	40.1	高血圧症	33.7
アラブ連合	先天性弱質等	229.8	気 管 支 炎	217.0	肺 炎	96.1
南ア連邦	脳 卒 中	86.9	不慮の事故	51.9	肺 炎	51.0

死因分類は国際簡単分類による。死因のうち、がんとは悪性新生物、脳卒中は中枢神経系の血管損傷、老衰等は精神病の記載のない老衰ならびに診断名不相当および不明の原因、胃腸炎は胃炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎、先天性弱質等はその他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児、伝染性疾患等は伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患を省略したもの。

表 64 男女、年齢（5歳階級）別、死因別死亡率順位（昭和32年）

年齢階級	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率
総 数	脳 卒 中	162.6	が 人	100.0	心臓の疾患	76.0	肺炎・気管支炎	63.6	老 衰	63.5
0-1)	先天薄弱質等	1,657.7	肺炎・気管支炎	1,142.7	胃腸炎	307.6	先天奇形	208.4	出生時の損傷等	138.1
1-4	不慮の事故	86.8	肺炎・気管支炎	61.2	胃腸炎	43.0	赤痢	26.9	麻疹	17.7
5-9	不慮の事故	38.8	肺炎・気管支炎	10.9	赤痢	9.0	腎炎・ネフローズ	7.9	胃腸炎	6.5
10-14	不慮の事故	16.6	心臓の疾患	5.5	肺炎・気管支炎	4.8	腎炎・ネフローズ	4.5	がん	3.4
15-19	不慮の事故	36.3	自殺・自傷	31.8	核	10.2	心臓の疾患	8.8	肺炎・気管支炎	5.8
20-24	自殺・自傷	74.5	不慮の事故	63.1	全結核	25.5	心臓の疾患	10.4	腎炎・ネフローズ	7.7
25-29	不慮の事故	62.0	自殺・自傷	50.8	全結核	47.6	心臓の疾患	12.9	がん	10.0
30-34	全結核	69.9	不慮の事故	55.9	自殺・自傷	27.3	がん	18.0	心臓の疾患	16.5
35-39	全結核	79.6	不慮の事故	57.0	がん	31.4	心臓の疾患	24.0	自殺・自傷	22.8
40-44	全結核	88.6	がん	59.6	不慮の事故	58.8	脳卒	51.7	心臓の疾患	34.9
45-49	がん	123.4	脳卒	123.0	全結核	102.9	不慮の事故	70.1	心臓の疾患	60.3
50-54	脳卒	260.6	がん	227.9	全結核	123.8	心臓の疾患	105.4	不慮の事故	69.5
55-59	脳卒	472.0	がん	387.1	心臓の疾患	185.8	核	159.3	不慮の事故	76.3
60-64	脳卒	833.6	がん	595.7	心臓の疾患	316.9	核	197.1	肺炎・気管支炎	109.6
65-69	脳卒	1,399.9	がん	804.8	心臓の疾患	536.1	核	228.0	肺炎・気管支炎	227.0
70-74	脳卒	2,183.8	がん	1,043.2	心臓の疾患	956.5	衰	852.3	肺炎・気管支炎	492.8
75-79	脳卒	2,921.0	老	2,287.4	心臓の疾患	1,359.9	がん	993.8	肺炎・気管支炎	909.5
80≤	老 衰	7,284.8	脳卒	3,436.5	心臓の疾患	1,860.9	肺炎・気管支炎	1,630.5	胃腸炎	772.6

(2) 女

年齢階級	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死	率	死	率	死	率	死	率	死	率
総数 ¹⁾	中	1412	老	96.8	人	82.9	心臓の疾患	70.3	肺炎・気管支炎	54.9
1-4	先天性弱質等	1,423.0	肺炎・気管支炎	907.4	腸炎	268.5	先天奇形	170.7	出生時の損傷等	99.3
5-9	肺炎・気管支炎	62.5	不慮の事故	58.7	腸炎	46.7	赤痢	33.4	麻疹	20.3
10-14	不慮の事故	14.9	肺炎・気管支炎	11.9	痢疾	11.6	胃腸炎	8.3	腎炎・ネフロシス	5.3
15-19	不慮の事故	6.3	心臓の疾患	6.3	肺炎・気管支炎	5.6	全結核	4.5	腎炎・ネフロシス	4.3
20-24	自殺・自傷	232	全結核	128	心臓の疾患	9.5	不慮の事故	7.3	肺炎・気管支炎	6.7
25-29	自殺・自傷	483	全結核	30.9	心臓の疾患	13.9	出生時の障害	11.8	肺炎・気管支炎	8.7
30-34	全結核	513	自殺・自傷	26.2	出生時の障害	21.1	心臓の疾患	19.6	がん	13.0
35-39	全結核	624	がん	27.4	心臓の疾患	24.0	出生時の障害	19.5	自殺・自傷	17.8
40-44	全結核	599	がん	41.8	心臓の疾患	31.5	自殺・自傷	14.8	出生時の障害	14.8
45-49	がん	874	全結核	58.6	心臓の疾患	41.2	脳卒中	34.9	腎炎・ネフロシス	14.9
50-54	がん	137.3	脳卒中	87.2	全結核	57.8	心臓の疾患	56.9	腎炎・ネフロシス	17.8
55-59	中	196.2	脳卒中	181.8	心臓の疾患	79.2	全結核	56.5	腎炎・ネフロシス	26.5
60-64	中	472.0	がん	271.4	心臓の疾患	122.7	全結核	66.3	腎炎・ネフロシス	35.8
65-69	中	540.4	がん	367.8	心臓の疾患	207.5	全結核	84.0	肺炎・気管支炎	61.7
70-74	中	931.7	がん	486.0	心臓の疾患	372.2	肺炎・気管支炎	140.6	老衰	133.8
75-79	中	1,589.4	老衰	630.9	心臓の疾患	630.0	がん	442.8	肺炎・気管支炎	287.8
80-84	中	2,186.0	老衰	1,996.0	心臓の疾患	933.1	がん	614.4	肺炎・気管支炎	540.6
85-89	老衰	7,137.2	脳卒中	2,765.4	心臓の疾患	1,381.1	肺炎・気管支炎	1,085.1	胃腸炎	785.1

率は、各年齢階級別人口10万について。①率の分母は、人口によらず出生数10万についてのもの。
 死因のうち、先天性弱質等とはその他の新生児固有の疾患および性不明の未熟児、脳卒中は中枢神経系の血管損傷、胃腸炎は胃炎・十二指腸炎・腸炎および大腸炎、出生時の損傷等は出生時の損傷・分娩後窒息および肺不全拡張、老衰は精神病の記載のない老衰、出生時の障害は妊娠・分娩・産後の合併症、がんは悪性新生物を省略したものである。厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

表 65 男女、年齢（5歳階級）別、死因別死亡率順位（昭和30年）

(1)

(1) 男

年齢階級 総数	第1位		第2位		第3位	
	死因	率 (%)	死因	率 (%)	死因	率 (%)
0	脳卒	14.31 (17)	が	94.0 (11)	心臓の疾患	62.2 (8)
1	先天性弱質等	1,732.8 (41)	肺炎・気管支炎	994.6 (23)	腸炎	358.1 (8)
2	不慮の事故	126.2 (21)	肺炎・気管支炎	122.7 (21)	腸炎	94.1 (16)
3	不慮の事故	107.8 (24)	胃腸炎	72.9 (16)	肺炎・気管支炎	57.9 (13)
4	不慮の事故	72.5 (20)	胃腸炎	62.9 (17)	赤痢	59.6 (16)
0-4	不慮の事故	55.7 (20)	赤痢	48.8 (18)	腸炎	33.5 (12)
5-9	先天性弱質等	320.8 (28)	肺炎・気管支炎	231.1 (20)	腸炎	118.6 (11)
10-14	不慮の事故	46.0 (32)	赤痢	13.7 (9)	腸炎	9.9 (7)
15-19	不慮の事故	18.8 (25)	心臓の疾患	5.9 (8)	結核	4.9 (7)
20-24	自殺・自傷	37.6 (25)	不慮の事故	31.4 (21)	結核	15.3 (10)
25-29	自殺・自傷	84.8 (31)	不慮の事故	59.0 (22)	結核	40.9 (15)
30-34	結核	72.7 (25)	不慮の事故	59.7 (21)	自殺・自傷	54.0 (19)
35-39	結核	87.3 (30)	不慮の事故	52.9 (18)	自殺・自傷	30.5 (10)
40-44	結核	87.9 (26)	不慮の事故	52.7 (15)	が	33.3 (10)
45-49	結核	95.8 (21)	が	65.1 (14)	不慮の事故	56.9 (12)
50-54	が	127.0 (18)	全結核	112.7 (16)	脳卒	111.5 (16)
55-59	脳卒	232.1 (21)	が	218.2 (20)	全結核	129.3 (12)
60-64	脳卒	425.8 (25)	が	354.5 (21)	心臓の疾患	161.2 (10)
65-69	脳卒	769.8 (28)	が	573.4 (21)	心臓の疾患	266.2 (10)
70-74	脳卒	1,282.9 (29)	が	800.9 (18)	心臓の疾患	457.3 (10)
75-79	脳卒	1,973.3 (28)	が	971.8 (14)	心臓の疾患	742.9 (10)
80	老衰	2,567.8 (24)	老衰	2,034.3 (19)	心臓の疾患	1,031.1 (10)
	老衰	6360.9 (37)	脳卒	3,127.0 (18)	心臓の疾患	1,332.2 (8)

表 6 5 (つづき)

(1) 男

年齢階級	第 4 位		第 5 位		第 6 位		第 7 位	
	死 因	率 (%)	死 因	率 (%)	死 因	率	死 因	率
総 数	全 天	60.7(7)	不慮の事故	5.68(7)	老 不慮の事故	53.8	肺炎・気管支炎	51.5
0	先 奇 形	23.13(5)	出生時の損傷等	128.0(3)	赤 不慮の事故	102.0	腸閉塞・ヘルニア	65.1
1	麻 疹	32.2(5)	全 結核	22.4(4)	赤 腎炎・ネフロゼ	2.02	腸 炎	13.1
2	赤 気管支炎	49.8(11)	全 結核	17.0(4)	腎炎・ネフロゼ	13.5	麻 疹	13.1
3	肺炎・気管支炎	35.4(10)	腎炎・ネフロゼ	15.8(4)	全 結核	11.3	が ナリ	8.8
4	肺炎・気管支炎	25.2(9)	腎炎・ネフロゼ	16.0(6)	全 結核	8.9	ジ 出生時の損傷等	8.0
0-4	不慮の事故	9.09(8)	先天奇形	47.5(4)	赤 全結核	37.9	が 出生時の損傷等	23.7
5-9	腎炎・ネフロゼ	8.9(6)	肺炎・気管支炎	8.6(6)	全 結核	6.0	が 腸炎	4.4
10-14	腎炎・ネフロゼ	4.2(6)	が 腎炎・気管支炎	3.9(5)	肺炎・気管支炎	3.5	腸炎	2.3
15-19	心臓の疾患	9.4(6)	が 腎炎・ネフロゼ	5.4(4)	腎炎・ネフロゼ	5.0	肺炎・気管支炎	3.9
20-24	心臓の疾患	11.1(4)	他 腎炎・ネフロゼ	6.7(2)	腎炎・ネフロゼ	6.3	が 腎炎	5.8
25-29	心臓の疾患	13.3(5)	が 他 腎炎・ネフロゼ	9.1(3)	腎炎・ネフロゼ	6.5	腎炎・ネフロゼ	6.5
30-34	が 心臓の疾患	17.3(6)	必 臓の疾患	17.0(6)	胃・十二指腸潰瘍	7.3	腎炎・ネフロゼ	7.0
35-39	心臓の疾患	25.1(7)	自 殺の疾患	2.43(7)	脳 卒 中	1.77	腎炎・ネフロゼ	11.9
40-44	脳 卒 中	4.67(10)	心 臓の疾患	2.64(6)	目 殺・自 傷	23.6	胃・十二指腸潰瘍	19.2
45-49	不慮の事故	65.9(9)	心 臓の疾患	56.3(8)	目 殺・自 傷	32.3	胃・十二指腸潰瘍	31.1
50-54	心臓の疾患	96.6(9)	不慮の事故	69.5(6)	胃・十二指腸潰瘍	47.9	胃・十二指腸潰瘍	37.5
55-59	全 結核	148.7(9)	胃 腸	75.1(4)	不慮の事故	73.5	自 殺・自 傷	48.1
60-64	全 結核	184.1(7)	胃 腸	109.0(4)	不慮の事故	78.0	自 殺・自 傷	76.2
65-69	全 結核	213.3(5)	肺炎・気管支炎	166.9(4)	胃・十二指腸潰瘍	166.3	肺炎・気管支炎	145.0
70-74	老 衰	638.1(10)	肺炎・気管支炎	359.0(5)	全 結核	215.7	老 衰	212.7
75-79	が 腎炎・気管支炎	90.47(9)	肺炎・気管支炎	652.0(6)	胃 腸	418.8	腎炎・ネフロゼ	316.0
80	肺炎・気管支炎	1146.0(7)	胃 腸	816.1(5)	が 腎炎	666.7	腎炎・ネフロゼ	433.9

率は各年齢階級別人口10万について、%は総死亡中に占める割合を示す。

死因のうち、脳卒中とは中枢神経系の血管損傷、がんは悪性新生物、老衰は精神病的記載のない老衰、先天性弱質等はその他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児、胃腸炎は胃炎、十二指腸炎、腸炎および大腸炎、出生時の損傷等は出生時の損傷・分娩後産息および肺不全症、他殺は他殺および戦争行為の国際簡単分類による死因名を省略したもの。

厚生省大臣府統計調査部「昭和30年人口動態統計上巻」昭和32年3月刊参照。

表65 男女、年齢（5歳階級）別、死因別死亡率順位（昭和30年）

(1)

(2) 女

年齢階級	第1位		第2位		第3位	
	死因	率(%)	死因	率(%)	死因	率(%)
総数		722.6		80.3 (11)		80.0 (11)
0	脳卒 先天性弱質等	129.4 (18)	人が 肺炎・気管支炎	898.9 (24)	老腸炎	316.9 (9)
1	肺炎・気管支炎	128.4 (23)	不慮の事故	105.3 (19)	胃腸炎	87.7 (16)
2	不慮の事故	77.7 (18)	胃腸炎	74.8 (17)	肺炎・気管支炎	65.5 (15)
3	赤痢	63.5 (18)	胃腸炎	59.6 (17)	不慮の事故	44.7 (13)
4	赤痢	60.8 (22)	胃腸炎	46.1 (17)	肺炎・気管支炎	29.2 (11)
0-4	先天性弱質等	280.7 (28)	肺炎・気管支炎	218.4 (22)	胃腸炎	112.4 (11)
5-9	赤痢	16.9 (15)	不慮の事故	14.7 (13)	胃腸炎	12.5 (11)
10-14	不慮の事故	9.2 (15)	全結核	7.6 (12)	心臓の疾患	6.7 (11)
15-19	自殺・自傷	26.4 (24)	全結核	21.5 (20)	心臓の疾患	10.0 (9)
20-24	自殺・自傷	47.2 (24)	全結核	46.7 (24)	心臓の疾患	15.0 (18)
25-29	全結核	70.8 (31)	自殺・自傷	28.0 (12)	出産時の障害	22.4 (10)
30-34	全結核	75.8 (30)	出産時の障害	24.0 (9)	人が	23.5 (9)
35-39	全結核	68.2 (23)	人が	49.6 (17)	心臓の疾患	31.1 (10)
40-44	人が	91.6 (24)	全結核	62.0 (16)	心臓の疾患	39.3 (10)
45-49	人が	139.1 (26)	脳卒中	93.6 (18)	全結核	63.1 (12)
50-54	人が	201.6 (26)	脳卒中	186.0 (24)	心臓の疾患	75.7 (10)
55-59	脳卒中	303.8 (27)	人が	275.2 (24)	心臓の疾患	114.8 (10)
60-64	脳卒中	514.1 (29)	人が	368.3 (21)	心臓の疾患	189.6 (11)
65-69	脳卒中	889.4 (31)	人が	492.0 (17)	心臓の疾患	320.1 (11)
70-74	脳卒中	1,447.1 (30)	人が	573.7 (12)	老腸炎	56.4 (12)
75-79	脳卒中	1,985.8 (26)	老脳	1,740.6 (23)	心臓の疾患	755.3 (10)
80≤	老衰	6217.7 (42)	脳卒	2,552.1 (17)	心臓の疾患	1,082.1 (7)

表65(つづき)

(2) 女

年齢階級	第4位		第5位		第6位		第7位	
	死因	率(%)	死因	率(%)	死因	率(%)	死因	率(%)
総数	心臓の疾患	59.6(8)	肺炎・気管支炎	45.3(6)	全結核	44.3	胃腸炎	35.7
0	先天性奇形	181.4(5)	不慮の事故	99.9(3)	出生時の損傷等	82.8	疥癬	52.7
1	麻疹	34.4(6)	梅毒	18.1(3)	赤痢	17.1	奇天	15.9
2	肺炎・気管支炎	57.7(13)	全結核	18.0(4)	麻疹	12.4	膜	8.8
3	不慮の事故	41.9(12)	全結核	12.5(4)	腎炎・ネフローゼ	12.2	疹	10.0
4	不慮の事故	28.8(10)	腎炎・ネフローゼ	13.4(5)	全結核	10.9	疹	7.6
5-9	不慮の事故	69.1(7)	赤痢	42.3(4)	先天性奇形	39.3	疹	2.4
10-14	肺炎・気管支炎	9.4(8)	腎炎・ネフローゼ	6.7(6)	全結核	5.7	ア	3.5
15-19	腎炎・ネフローゼ	4.4(7)	肺炎・気管支炎	3.6(6)	全結核	3.3	疹	2.1
20-24	不慮の事故	6.1(6)	肺炎・気管支炎	5.3(5)	腎炎・ネフローゼ	3.7	ん	3.5
25-29	出産時の障害	13.9(7)	腎炎・ネフローゼ	8.3(4)	腎炎・ネフローゼ	6.0	が	3.3
30-34	心臓の疾患	19.0(8)	不慮の事故	11.8(5)	腎炎・ネフローゼ	7.7	肺炎・気管支炎	3.6
35-39	心臓の疾患	23.4(9)	が	18.0(7)	腎炎・ネフローゼ	8.2	肺炎・気管支炎	7.0
40-44	出産時の障害	19.8(7)	自殺	15.9(5)	腎炎・ネフローゼ	14.1	腎炎・ネフローゼ	12.4
45-49	心臓の疾患	35.6(9)	自殺	14.9(4)	脳卒	14.8	不慮の事故	9.4
50-54	全結核	53.3(10)	腎炎・ネフローゼ	19.7(4)	自殺	16.7	不慮の事故	7.9
55-59	全結核	65.1(8)	腎炎・ネフローゼ	26.0(3)	自殺	18.6	肝硬変	15.4
60-64	全結核	74.1(7)	腎炎・ネフローゼ	38.4(3)	肺炎・気管支炎	25.7	自殺	22.7
65-69	全結核	86.2(5)	腎炎・ネフローゼ	60.8(3)	肺炎・気管支炎	50.6	腸炎	40.4
70-74	老心臓の疾患	14.0(4)	腎炎・ネフローゼ	109.5(4)	肺炎・気管支炎	101.6	腸結核	92.5
75-79	心臓の疾患	513.3(11)	肺炎・気管支炎	200.2(4)	胃腸炎	198.7	腎炎・ネフローゼ	165.7
80	が	596.7(8)	胃腸炎	399.6(5)	肺炎・気管支炎	394.6	腎炎・ネフローゼ	246.9
85	腸炎	848.6(6)	肺炎・気管支炎	767.1(5)	が	495.8	腎炎・ネフローゼ	356.1

死因のうち、出産時の障害とは産前・分娩および産後の合併症、梅毒は梅毒およびその続発症を省略したもの。その他については(1)男の注参照。

表 6.6. 年次別、男女、年齢（5歳階級）別中枢神経系の血管損傷死亡率
（大正9年～昭和32年）

年 齢 階 級	死 亡 率									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
総 数	175.1	1822	179.4	1813	1980	1360	1279	1431	1626	
0-4	50	31	33	20	32	22	12	07	06	
5-9	18	11	07	09	18	10	08	04	0.5	
10-14	11	11	11	11	23	09	12	05	0.6	
15-19	29	18	2.1	24	4.2	39	16	15	15	
20-24	64	47	34	53	55	56	36	27	29	
25-29	21	88	70	21	78	63	54	36	47	
30-34	182	166	152	182	180	120	92	62	79	
35-39	405	412	408	415	435	263	174	177	192	
40-44	841	95.2	929	98.3	1010	542	388	467	517	
45-49	1602	1868	1933	2012	2218	1004	925	111.5	123.0	
50-54	3120	3634	3708	3812	4230	2065	1975	2321	2606	
55-59	5429	661.7	6518	6708	7063	4208	3857	4258	4720	
60-64	12058	13289	13430	10792	11824	8152	6996	7698	8336	
65-69				17811	18126	13612	12510	12829	13999	
70-74	25219	26376	27066	26247	31769	2922	19725	19733	21838	
75-79				27318	31769	28524	26348	25678	29210	
80≧	35067	33674	34121	34185	34967	32972	33511	31270	34365	

年 齢 階 級	指 数（昭和5年=100）									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
総 数	97.6	101.6	100.0	101.1	110.4	75.8	71.3	79.8	90.6	
0-4	151.5	93.9	100.0	60.6	97.0	66.7	36.4	21.2	18.2	
5-9	257.1	157.1	100.0	128.6	257.1	142.9	114.3	57.1	71.4	
10-14	100.0	100.0	100.0	100.0	209.1	81.8	109.1	45.5	54.5	
15-19	138.1	85.7	100.0	114.3	200.0	185.7	76.2	71.4	71.4	
20-24	188.2	138.2	100.0	155.9	161.8	164.7	105.9	79.4	85.3	
25-29	130.0	125.7	100.0	130.0	111.4	90.0	77.1	51.4	67.1	
30-34	119.7	109.2	100.0	119.7	118.4	78.9	60.5	40.8	52.0	
35-39	99.3	101.0	100.0	101.7	106.6	64.5	42.6	43.4	47.1	
40-44	90.5	102.5	100.0	105.8	108.7	58.3	41.8	50.3	55.7	
45-49	82.9	96.6	100.0	104.1	114.7	51.9	47.9	57.7	63.6	
50-54	86.0	97.0	100.0	102.8	114.1	55.7	53.3	62.6	70.3	
55-59	83.3	101.5	100.0	102.9	108.4	64.6	59.2	65.3	72.4	
60-64	89.8	99.0	100.0	80.4	88.0	60.7	52.1	57.3	62.1	
65-69				101.6	106.9	78.4	69.2	72.8	79.4	
70-74	93.2	97.5	100.0	132.6	135.0	101.4	93.1	95.5	104.2	
75-79				97.0	77.3	72.9	72.7	80.7		
80≧	102.8	98.7	100.0	100.2	102.5	96.6	98.2	91.6	100.7	

死亡率は、各年齢階級別人口10万について、大正9年～昭和15年は内閣統計局、昭和22年以降は厚生省統計調査部の各「人口動態統計」による死亡数と各年の国勢調査による年齢別人口に基づいて算出されたもの、戦前の昭和15年以前には沖縄の数値が含まれている。（次頁に）

表66 年次別、男女、年齢(5歳階級)別中枢神経系の血管損傷死亡率
(大正9年-昭和32年)

年 齡 階 級	死 亡 率									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
総 数	139.5	139.6	145.4	149.4	158.1	123.2	126.3	129.4	141.2	
0-4	5.3	3.1	2.3	1.9	2.9	1.3	1.2	0.6	0.5	
5-9	1.4	0.6	0.5	1.2	2.2	1.0	0.8	0.3	0.3	
10-14	1.4	1.3	0.7	1.0	1.8	0.7	1.0	0.6	0.8	
15-19	3.1	2.2	1.7	2.2	3.2	3.1	1.9	0.8	0.9	
20-24	5.5	4.4	4.5	4.2	4.0	4.6	2.7	2.1	2.2	
25-29	8.2	6.8	7.1	7.7	9.7	6.1	4.2	3.3	3.1	
30-34	13.1	17.3	16.4	18.1	20.9	11.1	7.7	6.2	5.8	
35-39	32.3	37.4	40.3	44.9	50.9	23.8	19.4	14.1	13.7	
40-44	57.9	68.1	74.1	81.5	90.9	52.7	43.3	35.6	34.9	
45-49	101.0	117.4	135.0	145.5	158.4	107.9	97.6	93.6	87.2	
50-54	205.2	226.6	241.1	264.2	290.7	204.7	193.3	186.0	181.8	
55-59	328.2	360.0	384.7	401.2	427.8	318.6	319.9	303.8	311.7	
60-64	772.9	798.6	831.7	1,121.3	1,117.7	932.3	952.3	889.4	931.7	
65-69										
70-74	1,783.5	1,752.0	1,862.1	1,904.2	1,774.1	1,463.9	1,476.4	1,447.1	1,589.4	
75-79	2,289.3	2,289.3	2,011.6	2,011.6	2,011.6	2,061.7	1,985.8	2,186.0	2,186.0	
80≤	2,512.8	2,315.0	2,364.8	2,414.3	2,514.9	2,413.1	2,639.7	2,552.1	2,765.4	

年 齡 階 級	指 数									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
総 数	95.9	96.0	100.0	102.8	108.7	84.7	86.9	89.0	97.1	
0-4	230.4	134.8	100.0	82.6	126.1	56.5	52.2	26.1	21.7	
5-9	280.0	120.0	100.0	240.0	440.0	200.0	160.0	60.0	60.0	
10-14	200.0	185.7	100.0	142.9	257.1	100.0	1357.1	85.7	114.3	
15-19	182.4	129.4	100.0	129.4	188.2	182.4	111.8	47.1	52.9	
20-24	122.2	97.8	100.0	93.3	88.9	102.2	60.0	46.7	48.9	
25-29	115.5	95.8	100.0	108.5	136.6	85.9	59.2	46.5	43.7	
30-34	79.9	105.5	100.0	110.4	127.4	67.7	45.1	37.8	35.4	
35-39	80.1	92.8	100.0	111.4	126.3	59.1	48.1	35.0	34.0	
40-44	78.1	91.9	100.0	110.0	122.7	71.1	58.4	48.0	47.1	
45-49	74.8	87.0	100.0	107.8	117.3	79.9	72.3	69.3	64.6	
50-54	85.1	94.0	100.0	109.6	120.6	84.9	80.2	77.1	75.4	
55-59	85.3	93.6	100.0	104.3	111.2	82.8	83.2	79.0	81.0	
60-64	92.9	96.0	100.0	77.1	83.6	70.9	64.7	61.8	65.0	
65-69				102.3	104.9	89.9	87.1	81.4	85.4	
70-74	95.8	94.1	100.0	134.8	134.4	112.1	114.5	106.9	112.0	
75-79				95.3	78.6	79.3	77.7	85.4		
80≤	106.3	97.9	100.0	102.1	106.3	102.0	111.6	107.9	116.9	

死因内容および名称は年次によつて変化しているが、その対比の詳細については引用書参照
厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。
(表71まで同様)

表 67 年次別、男女、年齢（5歳階級）別悪性新生物死亡率
（大正9年～昭和32年）

(1) 男 死亡率

年 階 級	大 正 9 年	大 正 14 年	昭 和 5 年	昭 和 10 年	昭 和 15 年	昭 和 22 年	昭 和 25 年	昭 和 30 年	昭 和 32 年
総 数	73.4	70.5	69.6	71.2	75.2	62.9	80.1	94.0	100.0
0-4	1.4	1.1	1.1	2.2	4.4	3.9	5.6	6.8	7.4
5-9	0.5	0.6	0.6	0.6	1.9	1.6	2.7	4.4	4.1
10-14	0.3	0.6	0.8	1.0	2.4	1.5	2.9	3.9	3.4
15-19	0.8	1.2	1.4	1.6	3.5	4.0	4.1	5.4	4.8
20-24	1.9	2.1	2.2	2.6	4.9	4.8	4.6	5.8	6.8
25-29	3.9	4.9	5.8	5.3	8.2	7.2	7.7	9.1	10.0
30-34	10.1	11.0	10.5	11.1	13.5	14.4	15.0	17.3	18.0
35-39	25.1	26.5	25.1	25.8	28.1	28.1	29.1	33.3	31.4
40-44	58.3	63.4	58.2	57.2	59.1	57.7	63.4	65.1	59.6
45-49	114.4	123.2	120.6	124.8	115.8	106.6	116.4	127.0	123.4
50-54	222.9	209.9	222.7	228.3	231.1	202.0	211.8	218.2	227.9
55-59	350.2	355.3	343.0	348.5	350.8	320.2	354.0	354.5	387.1
60-64	538.6	540.3	533.8	476.1	500.9	493.4	523.1	573.4	595.7
65-69	599.9	571.6	619.9	639.5	660.1	607.1	775.1	800.9	804.8
70-74	599.9	571.6	619.9	639.5	660.1	607.1	775.1	971.8	1043.2
75-79	599.9	571.6	619.9	639.5	660.1	607.1	775.1	904.7	993.8
80≤	389.3	352.7	366.6	451.9	387.3	331.2	502.6	666.7	719.5

指 数

年 階 級	大 正 9 年	大 正 14 年	昭 和 5 年	昭 和 10 年	昭 和 15 年	昭 和 22 年	昭 和 25 年	昭 和 30 年	昭 和 32 年
総 数	105.5	101.3	100.0	102.3	108.0	100.4	115.1	135.1	143.7
0-4	127.3	100.0	100.0	200.0	400.0	354.5	509.1	618.2	672.7
5-9	83.3	100.0	100.0	100.0	316.7	266.7	450.0	733.3	683.3
10-14	37.5	75.0	100.0	125.0	300.0	187.5	362.5	487.5	425.0
15-19	57.1	85.7	100.0	114.3	250.0	285.7	292.9	385.7	342.9
20-24	86.4	95.5	100.0	118.2	222.7	218.2	209.1	262.6	309.1
25-29	67.2	84.5	100.0	91.4	141.4	124.1	132.8	156.9	172.4
30-34	96.2	104.8	100.0	105.7	128.6	137.1	142.9	164.8	171.4
35-39	100.0	105.6	100.0	106.8	112.0	112.0	115.9	132.7	125.1
40-44	100.2	108.9	100.0	98.3	101.5	99.1	108.9	111.9	102.4
45-49	94.9	102.2	100.0	103.5	96.0	88.4	96.5	105.3	102.3
50-54	100.1	94.3	100.0	102.5	103.8	90.7	95.1	98.0	102.3
55-59	102.1	103.6	100.0	101.6	102.3	93.4	103.2	103.4	112.9
60-64	100.3	100.7	100.0	88.7	93.3	91.9	97.4	106.8	111.0
65-69	100.3	100.7	100.0	100.3	100.5	101.2	112.2	123.6	128.5
70-74	96.8	92.3	100.0	112.5	112.1	113.2	132.8	149.2	149.9
75-79	96.8	92.3	100.0	103.2	103.5	97.9	125.0	156.8	168.3
80≤	106.2	96.2	100.0	123.3	105.6	96.7	95.3	121.7	134.4
						90.3	82.2	115.1	160.3
							137.1	181.9	196.2

前表の注参照

表 6.7. 年次別、男女、年齢（5 歳階級）別悪性新生物死亡率

（大正 9 年～昭和 32 年）

(2) 女		死 亡 率								
年 階	齡 級	大 正 9 年	大 正 14 年	昭 和 5 年	昭 和 10 年	昭 和 15 年	昭 和 22 年	昭 和 25 年	昭 和 30 年	昭 和 32 年
総 数		707	693	697	706	691	682	749	803	829
	0-4	0.8	1.0	1.4	1.7	3.6	2.3	4.2	5.3	5.3
	5-9	0.4	0.3	0.4	0.7	2.3	1.2	1.9	3.0	3.3
	10-14	0.4	0.5	0.7	0.8	2.0	1.3	2.0	3.3	3.1
	15-19	1.1	1.4	1.3	1.5	2.4	3.9	3.3	3.5	4.4
	20-24	3.4	3.6	3.2	4.0	3.9	5.2	4.9	5.3	6.3
	25-29	11.8	13.2	13.1	10.8	11.4	11.1	11.6	11.8	13.0
	30-34	31.4	33.0	32.1	32.4	30.6	30.4	26.4	23.5	27.4
	35-39	62.4	63.9	60.1	61.6	61.1	59.8	56.0	49.6	50.2
	40-44	98.8	101.3	103.0	104.1	100.9	99.5	104.8	91.6	87.4
	45-49	141.5	150.9	159.5	161.6	145.2	153.0	152.4	139.1	137.3
	50-54	216.5	198.9	205.8	209.1	208.7	207.1	215.5	201.6	196.2
	55-59	284.3	281.7	271.2	273.7	258.6	264.9	283.6	275.2	271.4
	60-64	369.3	375.1	376.4	349.5	336.8	350.7	375.4	368.3	367.8
	65-69				420.6	401.7	392.3	470.6	492.0	486.0
	70-74	400.2	381.7	414.0	428.7	426.5	423.2	484.3	573.7	606.7
	75-79				387.3	364.8	463.4	596.7	614.4	
	80≦	236.2	243.6	274.9	295.3	282.3	263.0	356.9	495.8	494.1

		指 数								
年 階	齡 級	大 正 9 年	大 正 14 年	昭 和 5 年	昭 和 10 年	昭 和 15 年	昭 和 22 年	昭 和 25 年	昭 和 30 年	昭 和 32 年
総 数		101.4	99.4	100.0	101.3	99.1	97.8	107.5	115.2	118.9
	0-4	57.1	71.4	100.0	121.4	257.1	164.3	300.0	378.6	378.6
	5-9	100.0	75.0	100.0	175.0	575.0	300.0	475.0	750.0	825.0
	10-14	57.1	71.4	100.0	114.3	285.7	185.7	285.7	471.4	442.9
	15-19	84.6	107.7	100.0	115.4	184.6	300.0	253.8	269.2	338.5
	20-24	106.3	112.5	100.0	125.0	121.9	162.5	153.1	165.6	196.9
	25-29	90.1	100.8	100.0	82.4	87.0	84.7	88.5	90.1	99.2
	30-34	97.8	102.8	100.0	100.9	95.3	94.7	82.2	73.2	85.4
	35-39	103.8	106.3	100.0	102.5	101.7	99.5	93.2	82.5	83.5
	40-44	95.9	98.3	100.0	101.1	98.0	96.6	101.7	88.9	84.9
	45-49	88.7	94.6	100.0	101.3	91.0	95.9	95.5	87.2	86.1
	50-54	105.2	96.6	100.0	101.6	101.4	100.6	104.7	98.0	95.3
	55-59	104.8	103.9	100.0	100.9	95.4	97.7	104.6	101.5	100.1
	60-64	98.1	99.7	100.0	92.9	89.5	93.2	99.7	97.8	97.7
	65-69				100.9	96.7	98.3	111.1	111.7	110.9
	70-74	96.7	92.2	100.0	111.7	106.7	104.2	125.0	130.7	129.1
	75-79				103.0	102.2	117.0	138.6	146.5	
	80≦	85.9	88.6	100.0	107.4	102.7	95.7	129.8	180.4	179.7

表68 年次別、男女、年齢(5歳階級)別心臓の疾患死亡率
(大正9年-昭和32年)

(1) 男 年階	年齢級	死 亡 率								
		大正9年	大正14年	昭和5年	昭和10年	昭和15年	昭和22年	昭和25年	昭和30年	昭和32年
総数		58.0	61.6	55.3	57.4	63.6	61.9	64.0	62.2	76.0
0-4		29.8	27.6	24.6	13.7	13.9	18.9	6.1	4.7	5.1
5-9		9.7	10.9	10.7	8.5	8.9	8.4	5.8	3.3	3.4
10-14		13.6	15.2	13.0	11.9	11.5	9.5	7.8	5.9	5.5
15-19		22.0	21.9	19.4	16.5	15.9	16.3	12.7	9.4	8.8
20-24		18.7	20.7	17.6	17.2	17.6	22.3	13.9	11.1	10.4
25-29		20.8	17.9	16.8	17.2	16.3	27.8	20.5	13.3	12.9
30-34		24.4	24.9	20.7	23.1	20.7	26.9	25.1	17.0	16.5
35-39		38.3	35.8	29.2	32.4	32.7	37.5	33.1	25.1	24.0
40-44		57.8	58.1	48.7	51.3	50.0	50.2	48.3	36.4	34.9
45-49		74.8	83.7	80.2	86.7	82.0	76.0	76.2	56.3	60.3
50-54		114.9	124.6	117.3	128.9	138.2	116.4	118.7	96.6	105.4
55-59		167.2	190.6	167.3	203.6	204.9	184.4	192.7	161.2	185.8
60-64	} 270.7	308.5	293.7	403.8	275.2	319.0	311.2	308.0	266.2	316.9
65-69										
70-74	} 450.2	538.2	497.5	534.4	599.3	571.3	697.8	742.9	956.5	956.5
75-79										
80≤		577.8	606.1	556.8	542.9	765.6	723.0	1046.3	1332.2	1860.9

年階	年齢級	指 数								
		大正9年	大正14年	昭和5年	昭和10年	昭和15年	昭和22年	昭和25年	昭和30年	昭和32年
総数		104.9	111.4	100.0	103.8	115.0	111.9	115.7	112.5	137.4
0-4		121.1	112.2	100.0	55.7	56.5	76.8	24.8	19.1	20.7
5-9		90.7	101.9	100.0	79.4	83.2	78.5	54.2	30.8	31.3
10-14		104.6	116.9	100.0	91.5	88.5	75.1	60.0	45.4	42.3
15-19		113.4	112.9	100.0	85.1	82.0	84.0	65.5	48.5	45.4
20-24		106.3	117.6	100.0	97.7	100.0	126.7	79.0	63.1	59.1
25-29		123.8	106.5	100.0	102.4	97.9	165.5	122.0	79.2	76.8
30-34		117.9	120.3	100.0	111.6	100.0	130.0	121.3	82.1	79.7
35-39		131.2	122.6	100.0	111.0	112.0	128.4	113.4	86.0	82.2
40-44		118.7	112.3	100.0	105.3	102.7	103.1	99.2	74.7	71.7
45-49		93.3	104.4	100.0	108.1	102.2	94.8	95.0	70.2	78.2
50-54		98.0	106.2	100.0	109.9	117.8	99.2	101.2	82.4	89.9
55-59		99.9	113.9	100.0	121.7	122.5	110.2	115.2	96.4	111.1
60-64	} 92.2	105.0	100.0	93.7	108.6	106.6	106.0	104.9	90.6	107.9
65-69										
70-74	} 90.5	108.2	100.0	107.5	111.5	126.2	125.9	134.5	117.1	138.6
75-79										
80≤		103.8	108.9	100.0	97.5	137.5	129.8	187.9	239.3	334.2

表66と同様

表68 年次別、男女、年齢別(5歳階級)別心臓の疾患死亡率
(大正9年-昭和32年)

年 齡 階 級	死 亡 率									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 数	66.0	66.4	61.1	57.8	63.0	62.4	64.3	59.6	70.3	
0-4	27.9	25.0	23.0	12.5	12.6	17.2	6.0	4.1	4.6	
5-9	12.9	12.1	10.7	8.7	9.5	8.3	6.2	3.1	3.1	
10-14	18.9	18.7	18.2	14.7	14.5	11.9	10.4	6.7	6.3	
15-19	30.8	30.1	25.3	22.1	21.1	19.9	14.0	10.0	9.5	
20-24	36.5	35.0	32.7	26.6	25.7	27.2	20.3	15.0	13.9	
25-29	42.6	40.9	39.0	33.7	33.2	36.9	31.6	19.0	19.6	
30-34	52.4	47.4	44.4	40.9	39.4	41.6	34.5	23.4	24.0	
35-39	64.4	61.5	57.0	51.9	51.1	47.8	46.3	31.1	31.5	
40-44	74.8	73.9	63.1	64.1	59.6	60.2	59.4	39.3	41.2	
45-49	83.1	89.7	78.2	72.5	74.2	72.8	72.9	53.3	56.9	
50-54	105.7	113.0	97.5	103.6	102.7	103.8	95.6	75.9	79.2	
55-59	136.1	148.5	139.5	138.2	157.5	146.9	147.5	114.8	122.7	
60-64	189.1	189.1	189.1	189.1	215.0	234.0	240.5	189.6	207.5	
65-69	235.8	244.8	227.7	293.4	325.8	328.4	375.4	320.1	372.2	
70-74	355.5	387.9	390.0	402.3	459.6	432.2	506.7	513.3	630.0	
75-79	444.9	457.9	435.7	460.4	590.4	602.2	840.5	1082.1	1381.1	

年 齡 階 級	指 数									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 数	108.0	108.7	100.0	94.6	103.1	102.1	105.2	97.5	115.1	
0-4	121.3	108.7	100.0	54.3	54.8	74.8	26.1	17.8	20.0	
5-9	120.6	113.1	100.0	81.3	88.8	77.6	57.9	29.0	29.0	
10-14	103.8	102.7	100.0	80.8	79.7	65.4	57.1	36.8	34.6	
15-19	121.7	119.0	100.0	87.4	83.4	78.7	55.3	39.5	37.5	
20-24	111.6	107.0	100.0	81.3	78.6	83.2	62.1	45.9	42.5	
25-29	109.2	104.9	100.0	86.4	85.1	94.6	81.0	48.7	50.3	
30-34	118.0	106.8	100.0	92.1	88.7	93.7	77.7	52.7	54.1	
35-39	113.0	107.9	100.0	91.1	89.6	83.9	81.2	54.6	55.3	
40-44	118.5	117.1	100.0	101.6	94.5	95.4	94.1	62.3	65.3	
45-49	106.3	114.7	100.0	92.7	94.9	93.1	93.2	68.2	72.8	
50-54	108.4	115.9	100.0	106.3	105.3	106.5	98.1	77.8	81.2	
55-59	97.6	106.5	100.0	99.1	112.9	105.3	105.7	82.3	88.0	
60-64	103.6	107.5	100.0	83.0	94.2	102.5	105.6	83.3	91.1	
65-69	103.6	107.5	100.0	102.6	114.6	121.9	132.2	109.2	122.6	
70-74	91.2	99.5	100.0	128.9	143.1	144.2	164.9	140.3	165.5	
75-79	91.2	99.5	100.0	103.2	117.8	110.3	129.9	131.6	131.5	
80≤	102.1	105.1	100.0	105.7	124.1	119.6	144.0	157.6	193.4	

表69 年次別、男女、年齢（5歳階級）別全結核死亡率（大正9年-昭和32年）

年 齡 階 級	死 亡 率									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	208.8	185.1	182.6	193.6	227.8	208.9	159.5	60.7	56.2	
0-4	111.5	72.8	56.2	56.8	53.3	65.9	62.0	15.0	10.9	
5-9	59.1	44.5	42.0	43.2	41.1	37.3	28.9	6.0	3.7	
10-14	79.4	64.4	62.9	61.3	63.3	30.8	19.4	4.9	3.0	
15-19	343.1	313.1	318.9	323.0	425.0	179.7	95.4	15.3	10.2	
20-24	452.5	415.5	431.7	475.6	725.9	465.8	254.6	40.9	25.5	
25-29	342.8	320.7	330.3	376.5	477.8	461.7	315.8	72.7	47.6	
30-34	260.9	236.6	235.4	264.5	317.6	396.8	273.8	87.3	69.9	
35-39	215.1	200.6	190.0	203.0	232.8	327.7	259.6	87.9	79.6	
40-44	203.1	187.0	180.9	183.2	190.4	270.6	243.2	95.8	88.6	
45-49	201.4	182.1	177.8	187.4	174.8	245.2	229.9	112.7	102.9	
50-54	224.5	190.3	176.1	186.2	191.7	236.7	239.1	129.3	123.8	
55-59	230.6	206.4	177.9	180.1	184.2	233.5	254.4	148.7	159.3	
60-64	217.6	181.0	168.2	172.1	187.1	226.8	258.9	184.1	197.1	
65-69				166.3	160.0	189.2	242.5	213.3	228.0	
70-74	135.5	111.5	99.0	109.5	114.3	129.8	182.7	215.7	251.2	
75-79				100.5	92.9	125.1	168.7	219.9		
80≤	73.2	46.7	53.0	47.9	46.9	28.4	89.3	100.0	141.6	

年 齡 階 級	指 数									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	114.3	101.4	100.0	106.0	124.8	114.4	87.3	33.2	30.8	
0-4	198.4	129.5	100.0	101.1	94.8	117.3	110.3	26.7	19.4	
5-9	119.8	150.5	100.0	146.1	139.0	126.1	97.7	20.3	12.5	
10-14	126.2	102.4	100.0	97.5	100.6	49.0	30.8	7.8	4.8	
15-19	107.6	98.2	100.0	101.3	133.3	56.3	29.9	4.8	3.2	
20-24	104.8	96.2	100.0	110.2	168.1	107.9	59.0	9.5	5.9	
25-29	103.8	97.1	100.0	114.0	144.7	139.8	98.6	22.0	14.4	
30-34	110.8	100.5	100.0	112.4	134.9	168.6	116.3	37.1	29.7	
35-39	113.2	105.6	100.0	106.8	122.5	172.5	136.6	46.3	41.9	
40-44	112.3	103.4	100.0	101.3	105.3	149.6	134.4	83.0	49.0	
45-49	113.3	102.4	100.0	105.4	98.3	137.9	129.3	63.4	57.9	
50-54	127.5	108.1	100.0	105.7	108.9	134.4	135.8	73.4	70.3	
55-59	129.6	116.0	100.0	101.2	103.5	131.3	143.0	83.6	89.5	
60-64	129.4	107.6	100.0	102.3	111.2	134.8	153.9	109.5	117.2	
65-69				101.0	104.8	125.1	150.1	115.6	124.0	
70-74	136.9	112.6	100.0	98.9	95.1	112.5	144.2	126.8	135.6	
75-79				115.5	131.1	164.5	217.9	253.7		
80≤	138.1	88.1	100.0	90.4	88.5	53.6	168.5	138.7	267.2	

表 6 6 と同様

表 6 9 年次別、男女、年齢（5 歳階級）別全結核死亡率
（大正 9 年—昭和 3 2 年）

(2) 女		死 亡 率								
年 齡 階 級	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	238.6	203.2	188.7	188.0	198.5	166.6	133.7	44.3	37.9	
0-4	104.1	65.0	49.2	53.4	51.5	63.1	64.4	16.3	11.3	
5-9	83.2	62.3	54.4	49.4	45.5	42.6	33.3	5.7	3.7	
10-14	200.1	161.5	143.0	138.3	127.8	52.8	36.5	7.6	4.5	
15-19	539.9	475.6	442.9	434.7	475.8	226.8	132.3	21.5	12.5	
20-24	505.3	453.9	453.6	459.9	472.3	386.1	254.0	46.7	30.9	
25-29	403.8	351.2	339.4	344.9	376.3	342.6	273.9	70.8	51.3	
30-34	302.1	258.5	236.3	237.1	254.0	272.0	223.2	75.8	62.4	
35-39	232.9	202.5	171.9	174.7	178.4	197.3	183.9	68.2	59.9	
40-44	195.5	160.7	149.1	140.7	141.5	164.4	152.5	62.0	58.6	
45-49	158.7	139.7	125.9	132.8	118.4	141.3	138.9	63.1	57.8	
50-54	159.2	130.2	119.1	117.7	124.2	137.2	136.5	65.1	56.5	
55-59	140.2	127.1	104.0	102.2	107.0	135.9	140.2	74.1	66.3	
60-64	121.2	99.2	84.9	88.2	99.6	110.9	131.1	86.2	84.0	
65-69				71.3	77.3	82.3	111.0	92.5	93.4	
70-74	74.7	60.2	52.7	43.7	66.2	56.0	78.6	85.8	100.0	
75-79				53.6	46.3	61.7	70.6	79.3		
80≦	43.1	33.2	28.0	26.5	26.3	16.7	35.6	43.6	52.9	

		指 数								
年 齡 階 級	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	126.4	107.7	100.0	99.6	105.2	88.3	70.9	23.5	20.1	
0-4	211.6	132.1	100.0	108.5	104.7	128.3	130.9	33.1	23.0	
5-9	152.9	114.5	100.0	90.8	83.6	78.3	61.2	10.5	6.8	
10-14	139.9	112.9	100.0	96.7	89.4	36.9	25.5	5.3	3.1	
15-19	121.9	107.4	100.0	98.1	107.4	51.2	30.0	4.9	2.9	
20-24	111.4	100.1	100.0	101.4	104.1	85.1	56.0	10.3	6.8	
25-29	119.0	103.5	100.0	101.6	110.9	100.9	80.7	20.9	15.1	
30-34	127.8	109.4	100.0	100.3	107.5	115.1	94.5	32.1	26.4	
35-39	135.5	117.8	100.0	101.6	103.8	114.8	107.0	39.7	34.8	
40-44	131.1	107.8	100.0	94.4	94.9	110.3	102.3	41.6	39.3	
45-49	126.1	111.0	100.0	105.5	94.0	112.2	110.3	50.1	45.9	
50-54	133.7	109.3	100.0	98.8	104.3	115.2	114.6	54.7	47.4	
55-59	134.8	122.2	100.0	98.3	102.9	130.7	134.8	71.2	63.7	
60-64	142.8	116.8	100.0	84.8	95.8	106.6	126.1	82.9	80.8	
65-69				95.4	106.2	115.1	143.8	104.0	103.1	
70-74	141.7	114.2	100.0	103.9	117.3	130.6	154.4	101.5	98.9	
75-79				84.0	91.0	96.9	130.7	109.0	110.0	
80≦	153.9	118.6	100.0	82.9	125.6	106.3	149.1	162.3	52.7	
				116.9	116.9	100.2	137.6	152.4	173.4	
				101.7	93.9	87.9	117.1	134.0	150.5	
				94.6	93.9	89.6	127.1	155.7	188.9	

表70. 年次別、男女、年齢(5歳階級)別肺病死亡率(大正9年~昭和32年)

(1) 男 年 齡 階 級	死 亡 率									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	315.8	225.4	166.6	163.2	173.5	146.1	68.8	41.0	52.1	
0-4	1,203.3	1104.6	777.2	773.9	687.2	596.0	311.8	206.5	239.6	
5-9	86.0	54.4	38.2	35.9	38.1	34.1	13.0	7.9	10.0	
10-14	34.7	21.2	15.3	13.3	20.0	13.6	6.1	3.2	4.4	
15-19	116.8	34.4	30.9	28.8	41.2	20.8	6.5	3.5	5.3	
20-24	161.1	35.9	35.0	34.6	51.9	35.3	8.6	4.0	5.9	
25-29	227.5	37.4	32.4	34.2	55.3	41.7	7.9	3.9	5.4	
30-34	261.3	42.1	35.7	40.0	60.3	45.4	8.2	3.9	6.5	
35-39	226.4	53.8	43.0	44.5	74.2	54.0	10.7	4.8	7.5	
40-44	203.0	69.3	51.1	56.0	84.9	69.3	13.1	5.4	9.0	
45-49	196.1	88.1	76.6	68.0	106.6	79.4	19.7	10.0	14.4	
50-54	217.2	112.8	98.5	102.6	139.9	118.4	29.2	14.8	25.1	
55-59	231.3	186.7	144.4	145.7	222.0	179.1	53.0	29.0	46.4	
60-64				214.1	315.2	296.8	91.5	56.8	89.3	
65-69	350.7	321.2	253.1	339.7	436.2	443.1	185.2	117.5	175.6	
70-74					614.3	583.0	296.7	233.2	359.0	
75-79	532.3	607.1	481.1	499.2	747.2	713.4	452.0	410.1	635.9	
80≦	567.8	760.1	622.6	631.5	840.5	877.3	703.7	686.8	1053.8	

年 齡 階 級	指 数									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	189.6	135.3	100.0	98.0	104.1	87.7	41.3	24.6	31.3	
0-4	154.8	142.1	100.0	99.6	88.4	76.7	40.1	26.6	30.8	
5-9	225.1	142.4	100.0	94.0	99.7	89.3	34.0	20.7	26.2	
10-14	226.8	137.9	100.0	86.9	130.7	88.9	39.9	20.9	28.8	
15-19	378.0	111.3	100.0	93.2	133.3	67.3	21.0	11.3	17.2	
20-24	460.3	102.6	100.0	98.9	148.3	100.9	24.6	11.4	16.9	
25-29	474.7	78.0	100.0	71.4	115.4	87.0	16.5	8.1	11.3	
30-34	731.9	117.9	100.0	112.0	168.1	127.2	23.0	10.9	18.2	
35-39	526.5	125.1	100.0	103.5	172.6	125.6	24.9	11.2	17.4	
40-44	397.3	135.6	100.0	109.6	166.1	135.6	25.6	10.6	17.6	
45-49	256.0	115.0	100.0	88.8	139.2	103.7	25.7	13.1	18.8	
50-54	220.5	114.5	100.0	104.2	142.0	120.2	29.6	15.0	25.5	
55-59	160.2	129.3	100.0	100.9	153.7	124.0	36.7	20.1	32.1	
60-64				84.6	124.5	117.3	36.2	22.4	35.5	
65-69	138.6	126.9	100.0	104.8	113.7	142.4	51.3	32.3	49.4	
70-74				134.2	172.3	175.1	72.4	46.4	69.4	
75-79					127.7	121.2	61.7	43.5	74.5	
80≦	91.2	122.0	100.0	101.4	138.0	140.9	113.0	110.3	169.2	

表66と同様

表70 年次別、男女、年齢(5階級)別肺炎死亡率(大正9年—昭和32年)

(2) 女	死 亡 率									
	年 齡 階 級	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年
總 數	312.1	206.8	146.8	140.2	136.0	114.8	61.5	36.0	44.1	
0-4	135.2	101.7	69.7	70.9	61.2	54.1	30.3	19.5	21.2	
5-9	12.2	6.3	4.3	4.1	3.7	3.5	1.5	0.8	1.1	
10-14	6.8	2.2	2.1	2.1	2.3	1.5	0.7	0.3	0.5	
15-19	18.1	4.3	4.0	3.3	3.9	2.3	0.7	0.5	0.6	
20-24	28.1	6.1	4.8	4.3	5.1	3.3	1.0	0.6	0.8	
25-29	31.3	6.1	4.5	4.5	5.8	3.6	1.3	0.9	0.8	
30-34	26.8	6.6	4.8	4.4	5.9	4.1	1.7	0.9	0.9	
35-39	19.3	5.9	4.7	3.9	5.6	4.3	1.3	0.5	0.6	
40-44	15.6	6.2	4.1	3.9	5.4	4.1	1.5	0.8	0.8	
45-49	12.6	5.9	4.5	4.1	5.1	4.2	1.6	0.7	1.1	
50-54	14.0	6.2	5.3	4.9	7.1	5.7	2.1	1.2	1.7	
55-59	15.3	10.3	7.6	7.2	10.6	9.3	3.4	2.0	2.6	
60-64	21.2	18.3	12.9	10.1	14.8	15.4	5.7	3.7	4.8	
65-69				15.1	20.5	21.9	10.1	6.9	10.4	
70-74	31.0	34.5	25.4	24.3	29.2	31.0	17.2	13.2	20.3	
75-79				39.5	39.8	25.1	23.0	36.5		
80≤	37.1	45.2	36.6	36.5	51.7	51.7	43.9	45.2	68.2	

年 齡 階 級	指 数									
	大 正 9 年	大 正 1 4 年	昭 和 5 年	昭 和 1 0 年	昭 和 1 5 年	昭 和 2 2 年	昭 和 2 5 年	昭 和 3 0 年	昭 和 3 2 年	
總 數	212.6	140.9	100.0	95.5	92.6	78.2	41.9	24.5	30.0	
0-4	162.7	145.7	100.0	100.4	87.8	77.6	43.4	28.0	30.7	
5-9	280.3	145.1	100.0	95.9	88.6	81.9	36.4	20.1	25.2	
10-14	314.2	133.3	100.0	96.3	109.1	69.9	30.6	15.1	22.8	
15-19	452.8	115.8	100.0	86.3	99.8	58.3	18.5	8.8	15.0	
20-24	579.9	127.3	100.0	89.4	103.7	68.9	20.9	9.5	17.2	
25-29	696.0	135.5	100.0	101.1	128.6	81.6	25.1	13.1	19.5	
30-34	558.4	138.9	100.0	91.7	123.3	85.7	24.3	12.3	18.7	
35-39	406.5	125.0	100.0	82.6	118.7	90.8	27.7	13.7	20.2	
40-44	373.7	149.8	100.0	95.5	130.4	100.0	36.4	16.3	21.1	
45-49	281.6	132.2	100.0	92.0	122.4	94.2	56.4	16.4	25.3	
50-54	254.6	119.7	100.0	89.7	129.7	103.4	39.1	22.4	30.7	
55-59	204.3	136.6	100.0	95.0	140.7	129.3	45.4	27.2	34.2	
60-64	163.9	141.7	100.0	78.4	114.6	119.3	44.5	29.7	37.4	
65-69				94.9	132.9	142.2	59.6	39.7	56.1	
70-74	12.2	136.0	100.0	95.7	117.7	122.9	67.9	51.9	80.1	
75-79				131.6	155.7	79.1	67.9	106.3		
80≤	100.7	122.8	100.0	99.2	140.4	140.4	119.2	122.8	185.1	

表71 年次別、男女、年齢(5歳階級)別自殺死亡率(大正9年-昭和32年)

男

年 齡 階 級	大 正 9年	大 正 14年	昭 和 5年	昭 和 10年	昭 和 15年	昭 和 22年	昭 和 25年	昭 和 30年	昭 和 32年
総 数	23.3	25.1	27.2	25.1	16.5	18.6	24.1	31.6	29.7
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	0.3	-	0.1	0.0
10-14	2.0	1.7	1.5	1.3	0.8	1.3	-	1.1	1.1
15-19	18.1	19.2	22.0	25.0	11.7	9.6	17.5	37.6	31.8
20-24	37.4	42.1	44.3	47.8	24.6	19.7	44.9	84.8	74.5
25-29	35.8	33.0	34.6	36.3	27.1	23.2	36.0	54.9	50.8
30-34	26.1	26.9	27.4	24.8	17.9	18.3	24.4	30.3	27.3
35-39	27.9	28.7	30.0	25.8	18.2	16.0	22.4	24.3	22.8
40-44	30.0	34.0	34.9	26.1	19.5	20.8	24.3	23.6	22.2
45-49	31.9	39.6	47.6	36.6	22.5	28.7	32.5	32.3	29.2
50-54	37.6	47.6	53.2	45.4	30.5	38.3	39.7	37.5	37.2
55-59	51.7	54.8	62.6	52.7	37.7	48.6	56.1	48.1	48.3
60-64	-	-	-	65.1	45.6	66.4	67.7	55.7	53.9
65-69	65.3	70.8	81.4	80.5	62.8	85.6	85.1	68.9	64.4
70-74	-	-	-	-	79.1	112.3	105.3	86.5	90.2
75-79	98.0	103.5	115.9	108.2	106.5	127.2	121.0	110.4	102.2
80≦	107.6	139.1	131.2	134.9	101.2	151.4	136.7	123.0	119.3

女

年 齡 階 級	大 正 9年	大 正 14年	昭 和 5年	昭 和 10年	昭 和 15年	昭 和 22年	昭 和 25年	昭 和 30年	昭 和 32年
総 数	14.7	15.9	16.0	15.8	11.0	12.9	15.3	19.0	19.1
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
10-14	1.6	1.6	1.2	0.7	0.5	0.5	0.0	0.7	0.5
15-19	24.0	24.8	21.4	20.9	7.4	8.7	13.0	26.4	23.2
20-24	27.0	30.3	31.3	31.3	17.8	20.5	27.8	47.2	48.3
25-29	19.5	22.8	22.3	21.0	15.2	16.0	18.8	28.0	26.2
30-34	14.8	17.9	18.3	19.7	13.4	12.3	16.1	18.0	17.8
35-39	17.1	16.2	16.7	15.6	11.3	10.6	14.4	15.9	14.8
40-44	16.2	17.9	16.5	16.7	14.2	12.1	14.4	14.8	14.7
45-49	15.8	19.0	20.2	19.1	14.9	14.5	19.0	16.7	16.6
50-54	16.7	21.2	19.1	23.0	19.6	16.8	20.2	18.6	21.3
55-59	22.2	19.5	24.1	21.7	18.1	21.5	24.1	22.7	25.6
60-64	-	-	-	29.2	21.6	35.2	33.4	30.9	28.1
65-69	30.2	35.4	37.6	37.8	28.5	46.9	53.8	40.9	40.4
70-74	-	-	-	-	53.2	64.9	59.5	57.0	61.1
75-79	51.6	54.2	58.0	61.8	54.8	89.9	83.3	65.2	70.9
80≦	91.2	56.0	50.8	83.4	84.0	108.5	105.7	91.8	79.3

死因分類による死因名は自殺および自傷、その他については表66の注参照

表7.2 職業(大分類別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(昭和30年)

職業	年齢											
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳+	
総数	55.4	6.9	19.4	37.2	50.6	52.2	59.1	74.2	84.9	98.1	121.6	138.2
専門的技術的職業	53.0	7.1	15.0	27.8	43.7	51.4	46.1	81.9	86.4	118.8	112.8	143.2
管理職務	3.88	-	14.3	27.9	23.3	25.5	23.7	30.1	42.2	50.5	86.6	112.7
事務	56.2	16.1	18.4	44.5	58.9	62.0	68.3	91.5	86.5	98.5	152.1	201.7
販売	59.2	5.4	13.7	28.7	49.6	52.5	71.5	72.8	98.9	112.5	122.6	156.0
農林、漁業、類似職業	64.3	8.3	25.9	47.4	67.4	58.6	66.5	70.0	78.1	80.3	110.8	122.2
採鉱	71.3	-	19.7	37.2	46.7	39.1	76.5	125.4	190.2	233.3	500.0	923.1
運送	36.5	2.4	16.1	32.5	36.5	50.8	42.7	68.8	56.7	141.7	166.7	187.5
技能工生産従事者他	47.7	5.9	18.0	31.6	38.0	47.2	54.0	78.1	94.9	131.0	151.1	195.5
(再掲)他に分類されな	46.3	4.1	18.1	30.8	42.6	40.1	47.0	75.3	79.4	96.6	91.1	170.8
い、単純労働者	40.8	3.2	9.0	24.8	41.5	40.9	47.5	80.5	73.2	88.3	119.3	168.2
サービス職												
総数	23.7	6.6	14.9	24.1	27.4	26.6	26.2	28.2	29.2	40.6	40.6	49.5
専門的技術的職業	20.7	6.3	7.4	20.3	20.0	25.6	39.4	26.2	43.3	20.7	80.0	47.6
管理職務	40.4	-	-	133.3	38.5	-	21.3	46.5	64.5	111.1	-	-
事務	19.3	6.0	10.8	31.5	48.0	25.1	53.1	30.5	22.2	35.7	-	62.5
販売	14.3	5.9	8.2	13.9	16.9	13.9	18.5	18.0	15.0	21.8	14.0	19.3
農林、漁業、類似職業	31.9	10.1	20.5	27.6	31.5	34.8	31.3	34.4	35.5	49.5	46.4	56.2
採鉱	35.6	-	-	125.0	43.5	28.6	27.0	31.3	-	-	1000.0	-
運送	12.2	6.1	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技能工生産従事者他	13.8	5.1	17.7	19.4	18.3	16.3	10.6	15.3	14.3	17.4	18.3	29.0
(再掲)他に分類されな	17.7	3.5	22.8	19.7	21.9	21.9	16.2	11.2	15.8	32.7	17.4	59.7
い、単純労働者	9.6	3.1	6.3	10.6	16.5	11.9	17.0	16.9	12.0	16.3	24.6	9.5
サービス職												

各職業および年齢階級別職業人口10万について、分業および不詳の職業および不詳の業計算も省略されている。死亡率には年齢不詳があるが、計算から除外されている。また、分類不能の職業および不詳の業計算も省略されている。厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計、人口動態統計特殊報告」昭和34年3月刊による。

式/2. 産業別、主要死因別、男女、年齢別死亡率（昭和30年）

職業	疾患	年齢										
		15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳
総数	63.7	5.4	9.2	11.5	14.4	21.2	31.8	49.4	83.8	131.9	212.7	552.1
専門的職業者	51.6	7.1	11.6	8.9	10.6	24.4	31.7	41.0	75.8	124.3	218.0	593.2
管理業務者	47.9	-	-	8.4	5.5	11.2	15.8	32.2	60.4	70.0	117.5	289.0
事務従業者	34.6	8.1	9.7	10.8	16.7	22.6	31.5	59.8	90.6	155.3	226.8	351.9
販売従業者	59.5	5.4	8.7	7.4	17.9	22.6	36.0	48.0	84.8	149.7	200.9	419.7
農林、漁業、採石、類似職業者	10.62	8.2	11.6	15.9	17.7	23.1	34.0	50.3	85.0	131.6	218.7	595.1
採掘従業者	32.9	14.1	4.4	8.1	7.8	25.3	28.1	50.7	97.6	88.9	269.2	1,461.5
運輸従業者	19.3	4.7	7.8	7.8	7.6	13.6	19.0	29.2	127.7	100.0	309.5	500.0
技能工程従業者	39.4	3.2	8.0	9.8	12.4	20.4	33.9	52.4	84.2	136.2	207.9	503.2
（再掲）他に分類されな	41.1	1.2	5.2	8.2	13.5	16.1	27.6	56.8	86.4	124.7	279.8	378.9
い単一労働者	37.0	1.1	5.3	13.5	15.7	14.0	18.3	51.2	63.2	111.9	164.7	392.5
サ												
総数	37.7	3.9	8.2	11.5	14.8	18.1	23.2	32.5	47.2	83.1	133.3	411.2
専門的職業者	19.9	8.4	8.1	8.0	8.2	5.5	23.1	26.2	60.6	62.1	90.0	369.0
管理業務者	49.3	-	-	-	-	38.5	42.6	23.3	-	222.2	181.8	375.0
事務従業者	82	2.8	4.8	10.2	13.7	21.3	14.0	26.7	7.4	71.4	111.1	62.5
販売従業者	18.7	1.8	2.7	4.8	7.6	7.9	14.6	18.0	30.8	46.8	80.7	124.6
農林、漁業、採石、類似職業者	61.0	7.4	13.1	15.8	19.2	23.7	30.2	41.2	57.5	100.6	155.6	487.9
採掘従業者	22.2	-	26.3	-	43.5	-	27.0	51.3	-	333.3	-	-
運輸従業者	6.1	-	-	-	-	-	-	1,000.0	-	-	-	-
技能工程従業者	10.5	2.0	5.8	7.5	9.8	11.6	13.2	15.9	20.9	38.0	45.9	96.8
（再掲）他に分類されな	19.5	-	4.6	16.4	7.3	11.0	17.6	20.4	23.7	56.1	104.3	179.1
い単一労働者	9.2	1.9	5.2	4.5	6.0	12.7	9.0	19.7	25.8	25.6	44.3	85.3
サ												

(3) 悪性新生物

職業	総数	年齢										
		15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上
総数	112.2	3.6	4.8	8.1	15.2	30.2	59.8	116.4	196.0	341.3	449.1	675.8
専門的職業	82.4	7.1	5.5	6.6	10.1	14.2	48.9	94.4	159.0	294.3	428.6	800.0
管理事務	113.1	-	-	-	6.9	20.4	31.7	87.4	123.3	181.4	348.5	635.8
販売従事者	71.3	12.1	6.6	9.6	18.1	38.3	80.4	142.8	244.1	367.5	587.6	660.9
販売者	108.6	1.6	4.8	6.8	13.4	30.0	44.5	102.6	196.4	281.3	473.0	719.6
農林、漁業、類似職業	179.6	4.1	4.8	9.4	17.9	35.6	71.3	133.0	210.8	333.1	504.5	769.4
採掘従事者	63.2	7.0	2.2	4.9	13.6	34.5	53.6	134.3	258.5	244.4	807.7	1,153.8
運輸従事者	38.1	11.8	3.9	11.0	14.4	34.7	60.0	100.0	145.4	408.3	619.0	750.0
技能工生産従事者	71.0	2.4	3.9	6.3	15.2	25.7	58.9	107.8	189.3	302.5	482.9	757.7
(再掲)他に分類されな												
い単一労働者	70.7	0.6	1.3	4.6	14.2	31.3	54.5	100.1	158.1	245.0	381.8	472.0
サイバース職業	70.1	3.2	7.4	11.3	10.1	25.9	43.1	108.3	145.1	296.1	477.1	715.0

女

総数	59.0	1.7	3.7	8.7	14.6	26.4	53.2	81.9	129.8	190.6	261.6	434.1
専門的職業	43.7	2.1	8.1	8.7	22.3	21.9	76.4	96.9	125.5	213.8	300.0	547.6
管理事務	98.7	-	-	66.7	-	-	42.6	116.3	129.0	353.3	181.8	625.0
販売従事者	16.1	4.6	3.2	11.6	20.6	38.7	83.8	91.6	163.0	214.3	444.4	62.5
販売者	35.6	0.6	1.4	2.4	9.3	16.3	35.0	50.8	67.5	108.9	107.0	215.8
農林、漁業、類似職業	91.2	1.6	5.6	10.1	16.6	33.4	62.4	99.3	155.7	225.1	304.4	495.0
採掘従事者	31.1	-	-	41.7	-	-	54.1	-	125.0	-	-	-
運輸従事者	12.2	-	-	-	-	14.29	142.9	500.0	500.0	-	-	-
技能工生産従事者	19.1	1.8	1.6	8.3	8.9	15.4	34.4	48.2	75.2	87.0	110.1	141.9
(再掲)他に分類されな												
い単一労働者	34.9	1.7	2.3	9.9	4.9	9.4	35.2	59.5	63.3	116.8	139.1	268.7
サイバース職業	17.3	0.3	1.9	3.3	8.2	11.9	38.1	39.5	75.7	100.0	123.2	146.9

各職業および年齢階級別就業人口10万について、死亡実数には年齢不詳があるが計算から除外され、また、分類不能の職業および不詳の率計算も省略されている。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計」昭和34年3月刊による。

表7.2. 年次別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(昭和30年)

職業	中枢神経系の血管損傷											
	総数	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上
総数	147.6	1.4	2.3	3.1	5.8	16.5	43.6	102.0	202.3	353.0	610.6	1,471.3
専門的技術的職業	101.1	7.1	2.1	2.3	3.7	14.2	42.0	80.5	164.4	363.8	501.3	1,345.5
事務的職業	106.1	-	-	-	2.7	10.2	55.3	60.1	135.8	143.5	369.1	635.8
販売業務	56.3	1.0	1.8	2.8	7.6	16.1	41.7	106.8	227.8	353.7	510.3	759.7
農林、漁業、採掘	131.8	0.8	0.9	2.4	6.3	14.0	49.3	116.2	214.7	346.9	545.2	1,088.2
採石、採掘	269.5	1.9	3.4	3.8	5.3	14.6	40.7	97.0	202.1	373.1	655.5	1,646.6
運輸	66.0	-	2.2	1.6	3.9	13.8	48.5	125.4	161.0	500.0	1,192.3	2,538.5
運輸、採石、運輸	37.8	-	3.9	4.1	5.3	17.3	45.8	120.8	227.0	366.7	881.0	1,187.5
技能工、生産工程、從事者他(再掲)	81.9	1.2	1.8	3.0	6.3	19.7	44.7	108.1	210.6	362.3	602.2	1,197.1
単一労働者	90.3	1.2	0.4	4.1	10.0	22.5	45.5	104.9	209.8	326.3	605.5	897.2
その他	79.8	2.2	2.1	1.5	4.6	20.0	48.5	123.0	209.7	329.9	445.7	854.0
男												
女												
総数	84.8	0.6	1.1	2.6	5.7	9.9	25.9	66.5	136.3	240.3	387.9	1,168.0
専門的技術的職業	34.6	2.1	1.5	2.2	4.7	9.1	13.9	78.5	121.2	165.5	340.0	833.3
事務的職業	71.7	-	-	-	-	-	-	46.5	161.3	555.6	181.8	250.0
販売業務	3.6	0.5	0.6	0.9	1.1	11.6	16.8	19.1	59.3	89.3	111.1	125.0
農林、漁業、採掘	36.0	-	1.4	-	2.7	5.0	13.1	43.4	59.3	116.6	168.4	342.1
採石、採掘	145.4	0.9	1.8	3.7	7.4	13.0	34.1	83.4	171.6	302.1	462.5	1,392.6
運輸	31.1	-	-	-	4.35	-	54.1	62.5	-	333.3	100.0	-
運輸、採石、運輸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技能工、生産工程、從事者他(再掲)	114.3	0.3	0.6	1.6	4.5	6.4	15.3	30.6	72.3	64.9	110.1	254.8
単一労働者	29.1	-	-	9.9	12.2	11.0	19.1	29.7	76.5	70.1	139.1	343.3
その他	15.0	0.6	0.5	1.7	2.2	4.2	18.0	28.2	63.7	79.1	152.7	289.1

(5) 肺炎及び気管支炎

職業	業 総 数										
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳
総数	21.5	2.1	2.9	3.2	4.2	4.9	10.1	13.8	26.4	57.8	275.8
専門的職業者	17.1	14.3	2.1	4.0	2.0	2.1	8.8	16.0	25.6	55.1	304.5
事務従事者	9.5	-	-	2.8	-	1.4	7.0	5.8	8.0	26.8	95.4
販売従事者	5.7	1.0	2.0	2.2	3.8	2.9	6.7	4.9	26.4	38.7	150.2
農林、漁業、類似職業者	14.1	1.9	2.1	2.7	3.9	3.7	9.1	12.8	15.7	47.8	166.2
採石従事者	43.4	2.5	4.6	4.5	6.5	7.9	13.2	16.9	29.8	68.3	315.7
運輸従事者	10.8	-	6.6	6.5	6.9	-	17.9	4.9	66.7	153.8	384.6
技能工生産従事者	3.1	-	1.1	1.8	2.5	3.2	6.3	7.1	25.0	23.8	93.8
技能工生産従事者他	10.0	1.9	2.8	2.8	2.4	5.6	8.4	15.0	27.1	46.7	205.2
(再掲)他に分類されな	3.7	1.7	2.6	2.6	1.6	9.0	11.2	13.8	29.4	36.8	133.5
い単一労働者	7.7	1.1	-	0.8	8.0	-	7.3	6.7	33.8	36.7	144.9
サ - ビス職											
総数	12.3	1.7	3.0	4.7	5.3	5.3	5.3	10.1	17.3	36.7	174.6
専門的職業者	4.9	-	5.9	2.9	3.7	-	2.6	-	-	30.0	119.0
事務従事者	13.5	-	-	-	-	-	23.3	32.3	-	-	125.0
販売従事者	1.8	0.5	1.6	2.3	1.9	-	3.8	-	17.9	55.6	125.0
農林、漁業、類似職業者	4.2	1.8	2.3	0.6	3.0	2.9	1.2	3.8	4.4	14.0	43.7
採石従事者	21.2	2.5	3.9	7.7	8.0	8.1	7.3	14.0	23.1	45.0	211.5
運輸従事者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技能工生産従事者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技能工生産従事者他	2.1	2.0	1.9	1.6	1.7	1.3	2.4	2.9	1.6	6.1	19.4
(再掲)他に分類されな	2.6	-	2.3	-	3.1	1.5	3.7	2.6	4.7	-	29.9
い単一労働者	1.8	0.6	2.7	1.1	-	1.0	2.8	-	4.7	4.9	19.0
サ - ビス職											

各職業および年齢階級別職業人口10万について、死亡実数には年齢不詳があるが計算から除外され、また、分類不能の職業および不詳の率計算も省略されている。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計」昭和34年3月刊による。

表7.2. 職業別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(昭和30年)

職業	(6) 不慮の事故											
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上	
総数	62.0	45.7	63.5	61.2	53.0	52.8	56.1	65.2	68.9	73.1	76.5	103.4
専門的職業者	32.3	85.7	28.7	28.5	23.0	23.0	25.5	35.1	33.1	56.7	42.6	102.3
管理的職業者	24.9	-	28.6	36.3	21.9	15.3	18.0	20.3	27.3	19.5	49.5	63.6
事務従事者	55.3	59.4	35.3	31.7	24.4	30.6	31.0	46.4	50.6	56.9	67.0	73.0
販売従事者	42.3	26.4	43.9	35.8	33.6	34.3	38.5	48.0	36.5	60.3	68.7	85.4
農林、漁業、類似職業者	57.8	35.5	54.8	52.2	49.1	48.9	50.4	53.3	60.8	64.3	64.8	100.4
採石従事者	319.6	218.3	328.9	299.4	301.6	301.1	334.2	355.2	326.8	366.7	653.8	923.1
運輸従事者	124.1	244.7	133.0	104.9	80.6	96.7	118.5	141.7	212.8	183.3	381.0	512.5
技能工生産従事者	72.4	43.1	68.7	75.0	68.2	63.0	69.6	83.1	99.0	103.6	108.9	138.1
(再掲)他に分類されな	123.3	71.9	118.4	136.2	127.2	107.5	121.6	135.3	142.5	147.2	145.3	192.5
い、単純労働者	382	23.7	38.1	38.3	29.5	30.9	34.5	54.2	43.3	41.6	78.0	84.1
サ												
総数	9.4	6.3	7.1	5.9	7.2	7.7	9.3	8.4	11.0	13.0	17.3	44.8
専門的職業者	12.2	16.8	14.8	5.8	10.6	7.3	20.8	7.9	8.7	13.8	10.0	83.3
管理的職業者	9.0	-	-	-	38.5	-	-	-	-	-	9.0	-
事務従事者	6.5	8.4	6.0	6.0	4.6	7.7	5.6	11.5	7.4	-	-	-
事務従事者	5.5	4.2	5.0	1.8	6.0	4.0	8.3	4.3	5.3	5.4	10.5	15.8
農林、漁業、類似職業者	10.0	5.8	6.6	4.6	5.8	6.6	7.5	6.9	10.1	13.3	19.0	50.5
採石従事者	93.3	125.0	52.6	-	173.9	57.1	135.1	93.8	187.5	-	-	-
運輸従事者	42.6	30.5	31.0	-	100.0	-	142.9	50.0	-	-	-	-
技能工生産従事者	8.4	4.4	4.5	6.7	9.4	12.0	11.9	14.7	20.0	15.8	12.2	9.7
(再掲)他に分類されな	27.5	10.4	9.1	32.9	29.2	26.6	35.2	39.0	42.2	28.0	26.1	14.9
い、単純労働者	7.5	4.3	7.9	7.3	6.7	9.3	9.0	8.5	6.9	18.6	-	23.7
サ												

各職業および年齢階級別人口10万について、死亡英数には年齢不詳があるが計算から除かれ、また分類不能の職業および不詳の計算も省略されている。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計」昭和34年3月刊による。

表 7.3 産業(大分類)別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率(昭和30年)

産 業 核 心	年 齢										
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳+
総 数	55.4	37.2	50.6	52.2	59.1	74.2	84.9	98.1	121.6	138.2	
農 業	6.6	19.4	72.4	62.6	70.0	70.8	78.0	80.7	108.0	121.2	
林 業	8.6	27.8	32.8	15.5	26.8	38.0	34.3	44.9	69.4	69.5	
狩 猟	-	3.2	46.3	48.6	58.4	90.7	105.8	86.1	215.9	174.8	
水 産	10.1	27.3	42.1	38.9	60.0	105.6	132.8	223.0	217.4	451.6	
養 殖	-	20.1	46.5	44.8	52.3	80.5	96.0	112.3	134.0	238.8	
製 業	5.3	18.7	37.0	47.2	53.6	79.3	93.1	139.9	162.4	204.6	
設 業	6.8	16.7	31.7	47.9	61.6	65.8	87.1	101.4	117.5	144.3	
卸 業	4.0	11.5	44.6	47.5	30.1	52.6	104.8	84.7	94.3	144.1	
小 売	5.7	13.0	56.8	67.5	44.6	52.9	61.9	97.7	156.6	233.0	
金 融	4.3	21.1	40.2	46.6	48.1	73.4	72.4	88.0	110.1	130.6	
保 險	9.7	14.0	46.5	52.7	48.1	73.4	72.4	88.0	110.1	130.6	
通 信	4.3	21.1	40.2	46.6	48.1	73.4	72.4	88.0	110.1	130.6	
公 益 事 業	5.0	13.5	43.5	43.6	57.0	72.3	62.5	63.3	98.6	152.4	
サ ー ビ ス	9.7	14.0	46.5	52.7	48.1	73.4	72.4	88.0	110.1	130.6	
公 務	2.5	13.5	43.5	43.6	57.0	72.3	62.5	63.3	98.6	152.4	
総 数	23.7	14.9	27.4	26.6	26.2	28.2	29.2	40.6	40.6	49.5	
農 業	32.5	20.9	32.3	35.3	32.0	34.9	35.7	50.4	46.8	56.9	
林 業	5.7	-	23.5	7.2	-	8.6	10.3	-	-	-	
狩 猟	9.2	-	5.4	22.4	7.6	16.0	29.4	-	22.2	19.6	
水 産	29.1	9.3	75.0	32.8	15.6	21.7	-	-	33.33	-	
養 殖	23.3	11.1	23.3	40.5	25.3	40.3	24.4	-	58.8	333.3	
製 業	13.9	16.8	20.9	11.6	13.7	16.0	12.2	17.5	23.5	28.7	
設 業	12.2	6.4	15.7	11.4	16.9	17.5	13.6	21.4	13.2	18.4	
卸 業	17.0	8.9	14.3	44.6	18.0	28.3	29.9	35.7	-	-	
小 売	19.4	13.8	26.0	22.9	23.3	27.8	37.0	50.0	-	-	
金 融	13.7	7.7	19.8	17.7	22.1	17.4	21.3	17.9	39.2	18.7	
保 險	22.0	17.1	53.5	20.5	30.0	11.2	-	15.6	-	-	
通 信	22.0	17.1	53.5	20.5	30.0	11.2	-	15.6	-	-	
公 益 事 業	22.0	17.1	53.5	20.5	30.0	11.2	-	15.6	-	-	
サ ー ビ ス	22.0	17.1	53.5	20.5	30.0	11.2	-	15.6	-	-	
公 務	22.0	17.1	53.5	20.5	30.0	11.2	-	15.6	-	-	

産業および年齢階級別人口10万について、死亡実数には年齢不詳があるが、これは計算から除外され、また分類不能の産業および不詳の率計算も省略されている。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計、人口動態統計特殊報告」昭和34年3月刊による。

表7 3. 産業別、主要死因別、男女、年齢別死亡率（昭和30年）

産業	疾患	年齢											
		15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳	
男	総数	63.7	9.2	11.3	14.4	21.2	31.8	49.4	83.8	131.9	212.7	552.1	
	農業	8.6	12.0	18.0	18.8	24.0	36.0	52.0	88.2	134.2	225.5	608.2	
	林業	5.7	6.4	4.8	10.9	5.2	20.8	22.2	34.3	28.6	75.1	203.2	
	狩猟	2.9	16.2	4.7	8.9	24.3	16.4	48.7	86.4	144.4	163.0	458.0	
	水産	8.9	7.2	5.6	12.6	23.4	21.7	43.8	95.1	100.7	202.9	612.9	
	殖産	4.1	6.4	10.1	14.7	22.8	37.2	42.6	90.9	146.8	192.2	656.7	
	建設	4.2	9.8	9.9	11.9	20.5	30.5	49.3	75.5	134.7	222.4	510.2	
	製造	4.5	7.2	7.9	16.5	19.2	31.4	41.6	80.6	135.2	186.2	373.0	
	小売業	-	-	12.1	8.7	22.5	16.4	44.3	80.6	153.2	119.5	359.0	
	金融、保険、不動産業	5.8	7.0	7.9	10.7	16.1	22.0	43.2	74.9	114.6	212.1	634.0	
	運輸、通信、公益事業	1.9	7.5	11.5	12.0	23.4	32.7	51.5	68.1	109.0	216.6	457.2	
	サービス	2.5	6.7	7.9	13.3	14.8	19.6	47.8	84.9	59.0	132.7	219.5	
	公務												
	女	総数	37.7	8.2	11.5	14.8	18.1	23.2	32.5	47.2	83.1	133.3	411.2
		農業	7.6	13.2	15.8	19.6	23.9	30.7	42.0	58.5	102.2	157.9	493.4
林業		-	-	23.5	55.9	14.4	-	-	30.9	16.7	25.6	-	
狩猟		-	4.5	5.5	-	7.5	7.6	8.0	-	-	22.2	39.2	
水産		-	9.3	-	25.0	-	15.6	21.7	-	100.0	-	-	
殖産		-	-	21.0	7.8	23.1	44.3	40.3	61.0	52.6	117.6	500.0	
建設		2.3	6.0	4.7	10.5	10.3	10.5	11.5	19.8	37.6	29.4	94.3	
製造		1.4	3.4	5.5	7.0	8.6	13.5	19.2	30.7	43.7	74.5	122.3	
小売業		-	3.8	12.2	7.1	17.9	9.0	37.7	-	35.7	166.7	90.9	
金融、保険、不動産業		-	4.3	9.0	32.5	22.9	31.0	27.8	18.5	100.0	-	90.9	
運輸、通信、公益事業		2.5	4.9	6.9	7.5	11.6	14.1	20.7	31.9	37.4	61.6	155.8	
サービス		11.5	9.3	11.6	5.3	20.5	8.6	-	8.1	31.3	83.3	-	
公務													

(3) 産 業 生 産 性 別

業 種	総 数										55-59歳	60-64歳	65歳+
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳+			
総 計	112.2	4.8	8.1	15.2	30.2	59.8	116.4	196.0	311.5	491.6	758.6		
農 業	189.6	5.3	10.4	18.3	37.3	72.6	136.1	216.5	341.0	508.3	776.2		
林 業	46.2	1.6	3.2	13.1	10.4	20.8	91.8	96.6	122.4	185.0	229.9		
狩 猟	132.5	2.9	7.0	17.8	44.2	98.1	130.5	222.5	350.0	647.6	856.6		
水 産	63.7	4.4	5.6	14.0	37.4	56.7	129.5	216.1	251.8	449.3	871.0		
殖 産	81.2	1.8	5.9	17.1	26.6	55.4	101.8	179.3	283.4	510.7	1,018.7		
業 業	69.6	3.6	6.3	13.6	23.9	57.0	114.1	204.4	308.2	540.4	822.3		
設 業	92.5	1.1	5.3	11.4	26.8	43.2	95.8	189.9	270.0	438.2	654.9		
造 業	84.2	11.4	10.6	17.5	25.0	57.4	91.4	150.5	278.2	415.1	593.2		
小 売 業	56.7	13.0	10.0	17.8	32.6	59.5	107.1	162.9	341.8	510.1	776.7		
保 險	83.8	1.9	6.5	10.9	20.1	47.7	89.3	136.7	245.3	385.8	690.0		
公 益 事 業	61.4	10.1	10.5	12.1	28.0	62.4	121.2	192.3	240.2	346.9	451.2		
通 信													
サ ー ビ ス													
公 務													
教 育	59.0	1.7	8.7	14.6	26.4	53.2	81.9	129.8	190.6	261.6	434.1		
業 業	92.9	1.7	10.5	17.9	34.3	63.9	101.4	158.6	227.8	308.5	500.6		
業 業	9.0	-	-	-	-	-	172	30.9	50.0	25.6	60.6		
業 業	14.1	5.8	-	10.8	-	15.2	24.0	39.2	62.5	66.7	19.6		
業 業	29.1	-	27.0	-	-	31.3	43.5	166.7	100.0	-	/*...*		
業 業	31.1	6.9	-	15.5	23.1	50.6	56.5	122.0	78.9	17.6	333.3		
業 業	16.1	2.4	9.4	10.5	20.1	35.9	39.1	86.6	95.2	12.3	127.1		
業 業	28.7	0.4	4.7	9.1	14.7	33.4	53.6	63.4	109.9	104.3	201.0		
業 業	20.0	3.4	3.1	-	53.6	45.0	28.3	149.3	107.1	111.1	454.5		
業 業	19.4	4.2	9.0	32.5	38.2	85.3	27.8	129.6	350.0	181.8	181.8		
業 業	26.7	0.6	6.3	14.5	13.2	49.2	66.3	88.5	130.1	162.5	280.4		
業 業	20.2	5.7	8.7	10.7	15.4	42.9	44.9	48.8	15.6	250.0	200.0		

産 業 および 年 齢 階 級 別 就 業 人 口 10 万 につ いて、死 亡 数 には 年 齢 不 詳 が あ る が、計 算 か ら 除 か れ て い る。ま た、分 類 不 能 の 産 業 お よ び 不 詳 の 率 計 算 も 省 略 さ れ て い る。* 就 業 人 口 が 不 明。

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 調 査 部 「昭 和 2 9 年 ~ 昭 和 3 1 年 職 業 別 ・ 産 業 別 死 亡 統 計」 昭 和 3 4 年 3 月 刊 に よ る。

表7 3. 産業別、主要死因別、男女、年齢別死亡率（昭和30年）

産 業 数	男											65歳
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳	
総数	147.6	23	3.1	5.8	16.5	43.6	102.0	202.3	353.0	610.6	1,471.3	
農業	290.0	3.7	3.8	6.1	15.7	43.4	99.4	211.8	383.9	674.9	1,687.2	
林業	62.3	-	1.6	-	5.2	32.7	94.9	90.3	187.8	289.0	438.5	
狩猟	118.2	1.4	4.7	3.6	19.9	18.7	90.7	146.9	32.22	506.6	1,104.9	
水産	62.3	1.4	2.3	5.6	9.3	46.7	113.5	144.1	424.5	637.7	1,645.2	
建設業	100.9	0.9	2.4	9.8	18.2	47.2	118.4	244.9	358.3	619.4	1,604.5	
製造業	72.0	2.2	3.2	5.8	16.7	42.0	99.4	194.8	338.6	615.2	1,166.2	
卸売業	110.4	1.3	1.9	6.0	12.8	42.9	101.0	203.6	321.2	515.5	992.6	
小売業	72.2	-	1.5	2.2	5.0	35.5	80.3	137.1	237.9	352.2	703.4	
金融業	50.6	3.7	3.8	4.3	19.2	43.5	94.9	173.5	299.4	606.1	1,126.2	
運輸業	101.9	1.8	1.1	3.9	16.7	40.6	87.1	170.7	284.3	471.0	1,052.3	
通信業	54.3	1.6	3.1	4.8	18.7	43.7	106.1	184.3	257.6	343.5	524.4	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	848	1.1	2.6	5.7	9.9	25.9	66.5	136.3	240.3	387.9	1,168.0	
農業	147.9	1.8	3.8	7.5	13.3	34.5	85.7	174.8	306.4	468.6	1,408.1	
林業	82	-	-	-	-	8.5	8.6	10.3	16.7	76.9	90.9	
狩猟	14.1	-	-	1.08	-	15.2	-	39.2	62.5	111.1	58.8	
水産	18.7	-	-	2.50	-	31.3	65.2	-	100.0	666.7	-	
建設業	35.0	-	7.0	31.0	17.3	44.3	48.4	109.8	78.9	294.1	1,166.7	
製造業	10.6	0.4	0.9	2.3	6.1	15.0	29.3	83.6	67.7	117.6	221.7	
卸売業	27.0	0.7	-	2.1	4.5	12.7	37.8	52.5	111.9	167.2	323.3	
小売業	9.5	2.5	3.1	-	8.9	9.0	18.9	74.6	71.4	111.1	272.7	
金融業	9.7	-	-	-	15.3	38.8	27.8	111.1	150.0	-	454.5	
運輸業	21.5	1.2	1.9	3.5	5.0	14.1	50.0	80.3	95.9	176.5	451.7	
通信業	7.8	-	-	-	5.1	12.9	11.2	24.4	46.9	83.3	200.0	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 肺炎および気管支炎

業	年齢										
	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上
総業	21.3	2.9	3.2	3.2	4.2	4.9	10.1	15.8	26.4	57.8	275.8
農業	46.6	4.8	4.6	4.0	6.9	8.0	14.0	17.5	30.0	69.5	323.3
林業	8.9	3.2	1.6	2.2	-	1.9	9.5	6.2	16.3	28.9	69.5
狩猟業	19.2	2.0	4.7	1.8	4.4	4.7	4.4	13.0	36.1	57.3	223.8
水産業	8.9	7.2	4.5	5.6	4.7	-	12.0	8.6	57.6	58.0	193.5
建設業	11.6	3.1	2.1	5.5	3.8	6.3	7.3	18.5	25.3	50.5	257.5
製造業	8.6	2.3	2.4	2.4	1.8	3.6	8.8	11.7	28.3	49.2	199.5
卸売業	11.9	1.9	2.6	2.4	2.6	3.6	7.5	11.7	15.9	46.4	150.8
小売業	8.1	-	3.0	2.2	2.5	-	-	8.1	16.1	25.2	144.1
金融業	4.9	2.2	1.9	2.1	1.6	5.5	6.1	5.7	12.7	35.4	203.9
保険業	3.2	2.5	4.1	4.6	5.4	2.8	10.1	12.1	19.5	36.7	215.0
運輸業	5.3	1.0	1.7	1.2	3.9	0.9	8.2	6.4	15.3	30.6	109.8
サービス業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

女

総業	12.3	3.0	4.7	4.9	5.3	5.5	5.3	10.1	17.3	36.7	174.6
農業	21.6	4.0	7.9	7.6	8.1	8.3	7.4	14.1	23.7	45.7	213.6
林業	2.4	-	-	-	-	-	-	10.3	-	-	60.6
狩猟業	3.5	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	58.8
水産業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設業	3.1	-	-	-	5.8	-	8.1	1.22	-	-	166.7
製造業	2.0	1.9	2.6	1.2	1.2	1.3	1.8	1.5	-	11.8	23.6
卸売業	3.1	1.5	0.8	1.2	2.4	2.5	1.1	3.4	4.1	11.6	43.6
小売業	2.5	3.8	3.1	-	-	-	-	-	-	55.6	-
金融業	1.6	-	2.3	6.5	7.6	-	-	-	-	-	-
保険業	2.8	3.6	1.6	1.3	1.1	1.2	3.3	1.2	3.3	14.0	40.5
運輸業	1.8	3.1	5.7	5.1	5.1	-	-	-	-	-	-
サービス業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

産業および年齢階級別就業人口10万について、死亡実数には年齢不詳があるが計算からは除かれている。また、分類不能の産業および不詳の率計算も省略されている。
厚生省大臣官房統計調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計」昭和34年3月刊による。

表 7 3. 産業別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(昭和30年)

(6) 不慮の事故

産 業	総 数	男										女											
		15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上
総 数	62.0	43.7	65.5	61.2	56.0	52.8	56.1	6.52	68.9	73.1	76.5	103.4	9.4	7.1	5.9	7.2	7.7	9.3	8.4	11.0	13.0	17.3	44.8
農 業	50.6	28.2	40.9	41.5	39.8	39.9	42.9	4.48	54.6	59.8	62.7	98.9	10.1	6.4	4.6	5.7	6.2	7.7	7.2	10.3	13.4	19.3	50.9
林 業	134.8	102.3	159.7	143.3	104.8	106.2	157.7	132.9	149.5	167.3	144.5	101.6	7.3	6.4	-	17.6	14.4	85	172	-	-	-	19.6
漁 業	105.6	88.3	118.3	105.0	112.1	119.2	93.5	110.6	103.7	77.8	83.7	136.4	6.4	4.5	10.9	5.4	14.9	-	-	-	15.6	-	-
水産	232.3	155.6	220.1	230.2	241.6	211.8	246.7	253.0	233.4	259.0	318.8	387.1	100.0	38.5	-	75.0	65.6	78.1	87.0	125.0	100.0	-	-
建設	120.6	84.4	125.0	125.9	116.8	114.0	98.9	120.4	143.9	125.5	135.9	272.4	51.3	11.1	49.0	46.5	52.0	88.6	64.5	122.0	105.3	5.88	-
製造	4.49	3.40	4.14	4.51	3.94	3.78	44.6	53.6	54.8	62.9	84.6	85.7	7.5	4.6	4.3	5.8	9.1	5.2	7.1	9.1	7.5	5.9	4.7
小売業	36.2	23.6	34.7	50.7	29.0	30.0	32.9	41.6	35.5	52.8	61.1	77.9	5.6	4.4	4.3	6.6	4.1	7.6	5.1	4.1	6.1	11.6	16.8
卸売業	25.5	5.7	2.21	2.12	2.84	1.00	24.6	38.8	24.2	44.4	25.2	67.8	6.0	5.1	3.1	7.1	8.9	9.0	18.9	14.9	35.7	-	-
金融業	96.3	195.1	124.7	86.1	61.9	73.5	78.2	99.1	107.5	148.6	181.8	203.9	15.0	12.8	9.0	26.0	7.6	15.5	37.0	18.5	50.0	-	-
運輸業	32.4	25.2	35.7	24.8	27.5	26.4	24.9	33.4	36.8	42.1	49.7	85.5	7.9	9.5	4.7	7.5	7.7	9.2	5.0	8.3	14.6	2.8	40.5
通信業	33.2	30.3	35.2	28.4	26.0	26.5	34.8	35.0	54.5	45.9	30.6	79.3	4.6	9.3	8.7	-	-	4.3	-	-	-	-	-
サービス業																							
公務																							

(7) 自殺および自傷

産業	総数	年齢										
		15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65歳以上
総数	41.6	42.9	77.3	47.4	24.4	21.2	20.5	29.3	32.2	40.6	44.6	67.1
農業	48.4	43.3	93.3	55.5	30.0	24.2	27.1	37.2	33.4	40.5	50.0	71.1
狩猟業	17.9	11.4	14.4	14.3	10.9	15.5	14.9	25.3	12.5	28.6	34.7	48.1
水産業	11.8	2.9	13.1	12.8	3.6	8.8	4.7	15.5	15.1	5.6	26.4	42.0
製造業	32.2	40.0	54.7	39.5	16.9	12.5	16.7	29.9	40.3	28.8	87.0	161.3
建設業	38.6	35.4	58.8	43.5	29.4	9.9	26.4	27.9	33.7	43.5	31.1	108.2
卸売業	39.6	45.6	71.4	48.5	21.5	18.9	12.4	24.9	34.8	39.3	44.3	66.5
小売業	31.3	30.7	56.2	31.2	22.8	21.1	16.9	24.6	29.8	34.8	31.7	39.3
金融業	31.1	22.9	45.6	40.9	21.8	17.5	21.9	24.9	29.6	24.2	31.4	42.4
保険業	32.3	57.8	81.8	32.6	17.8	12.9	16.0	9.1	18.7	38.2	50.5	58.3
運輸業	29.2	40.7	64.9	31.9	15.5	20.9	17.0	20.7	23.6	24.1	22.5	35.6
娯楽業	25.6	30.3	53.2	24.9	15.7	16.4	14.3	12.8	32.1	32.8	13.6	30.5
公務												
総数	23.9	28.6	40.0	25.1	15.4	13.4	11.4	12.4	14.1	20.4	24.7	53.3
農業	24.2	24.9	44.8	20.3	16.2	15.1	12.8	14.9	16.7	23.3	28.6	61.3
狩猟業	3.3	-	6.4	5.9	5.9	-	-	-	-	-	-	30.3
水産業	2.8	-	4.5	-	-	7.5	7.6	-	-	-	-	19.6
製造業	16.6	19.2	56.1	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
建設業	19.4	13.8	36.9	28.0	15.5	5.8	12.7	24.2	12.2	-	-	-
卸売業	18.2	20.0	28.8	21.8	8.1	7.3	7.2	7.1	7.6	10.0	23.5	9.4
小売業	16.4	26.5	28.1	20.3	11.1	8.6	7.6	10.7	6.8	13.2	8.3	15.1
金融業	10.5	10.3	11.5	13.3	-	-	18.0	9.4	-	-	-	-
保険業	29.9	42.4	38.3	18.1	19.5	30.5	15.5	-	18.5	-	-	-
運輸業	29.0	43.0	44.0	36.1	17.1	13.2	10.4	8.3	11.8	4.9	5.6	24.9
娯楽業	19.3	17.2	37.2	14.5	26.7	15.4	4.3	-	-	-	-	100.0

産業および年齢階級別就業人口10万について、死亡実数には年計不詳があるが、計算からは除かれ、また、分類不能の産業および不詳の率計算も省略されている。

厚生省大臣官房統計課 調査部「昭和29年～昭和31年職業別・産業別死亡統計」昭和34年5月刊による。

表74 主要国における年次別、主要死因別、男女、年齢(5歳階級)別死亡率

(1) 中枢神経系の血管損傷

(1950年~1955年)

イギリス		1950	1951	1952	1953	1954	1955
年齢階級							
		男					
総	数	128.4	137.8	138.1	135.6	143.3	145.4
0		5.9	2.9	4.0	2.6	2.9	4.1
1 - 4		0.6	0.3	0.4	0.6	0.1	0.1
5 - 9		0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4
10 - 14		0.6	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7
15 - 19		0.5	1.1	1.5	0.9	1.1	1.2
20 - 24		1.5	1.7	2.6	2.7	2.9	1.9
25 - 29		1.9	3.0	2.9	2.8	3.0	2.5
30 - 34		3.6	4.0	4.5	4.8	5.5	5.0
35 - 39		5.7	6.0	8.8	8.7	8.1	8.3
40 - 44		12.3	14.8	16.4	15.2	15.7	12.7
45 - 49		28.5	31.8	31.4	32.7	34.5	34.4
50 - 54		65.7	69.7	71.5	71.4	75.3	69.5
55 - 59		127.1	134.8	137.4	138.5	142.3	136.9
60 - 64		271.7	284.0	285.1	277.9	294.8	272.6
65 - 69		508.0	535.6	542.0	511.8	538.4	531.1
70 - 74		958.2	986.7	961.0	929.0	957.7	954.9
75≦		1,929.0	2,163.4	2,086.7	2,056.8	2,151.6	2,281.1
		女					
総	数	165.6	173.4	176.3	171.6	181.1	186.8
0		2.9	2.1	1.8	2.4	1.2	1.2
1 - 4		0.3	0.5	0.1	0.5	0.3	0.2
5 - 9		0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2
10 - 14		0.1	0.7	0.9	0.6	0.9	0.4
15 - 19		0.6	0.4	1.2	1.4	1.0	0.8
20 - 24		1.6	1.2	1.7	2.1	1.5	2.4
25 - 29		1.8	1.8	2.3	3.1	2.8	3.1
30 - 34		3.4	4.4	4.1	5.1	5.4	4.0
35 - 39		7.9	6.3	9.0	7.8	9.3	8.2
40 - 44		14.4	15.5	17.1	15.7	17.3	18.3
45 - 49		37.3	39.8	41.5	38.4	37.1	35.7
50 - 54		77.1	75.8	89.6	82.2	76.2	73.2
55 - 59		132.8	142.1	142.1	129.5	131.5	127.9
60 - 64		248.1	253.4	250.8	227.5	243.0	233.0
65 - 69		469.2	478.1	460.4	446.9	456.2	447.6
70 - 74		860.2	852.0	861.8	805.9	858.9	872.6
75≦		1,959.0	2,117.6	2,040.6	1,969.0	2,025.5	2,106.8

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について、ただし、1950年の0歳は資料の都合で人口10万についてのもの。
イギリスは、イングランド・ウェールズのみ。(次頁に)

表 7 4 (つづき)

(1) 中枢神経系の血管損傷

アメリカ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	105.4	102.5	104.8	105.4	102.2	104.0
0	6.1	5.6	5.1	6.2	4.9	5.5
1 - 4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
5 - 9	0.9	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
10 - 14	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	0.9
15 - 19	1.4	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4
20 - 24	2.8	2.4	2.1	2.7	2.4	2.1
25 - 29	3.6	3.0	3.7	3.6	3.3	3.9
30 - 34	6.2	5.6	5.8	6.6	5.7	6.2
35 - 39	11.7	11.8	12.7	12.4	11.9	11.7
40 - 44	24.5	23.8	24.8	24.9	23.3	21.1
45 - 49	48.0	48.1	46.7	45.4	41.8	39.8
50 - 54	90.2	89.7	91.8	88.5	82.0	75.0
55 - 59	158.2	155.2	155.4	147.2	137.2	131.3
60 - 64	260.6	266.9	266.4	262.6	245.4	240.5
65 - 69	461.0	457.0	464.3	464.3	447.7	442.7
70 - 74	750.6	776.2	785.0	753.2	729.0	758.5
75 ≤	1,748.0	1,750.7	1,775.0	1,774.6	1,734.1	1,819.0
女						
総 数	108.2	105.6	108.4	109.0	105.9	107.9
0	3.3	3.3	3.5	4.3	4.3	5.0
1 - 4	1.1	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7
5 - 9	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
10 - 14	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7
15 - 19	1.3	1.0	1.3	1.3	1.5	1.3
20 - 24	2.2	2.0	2.3	1.7	2.4	2.5
25 - 29	3.4	3.1	3.5	3.3	3.1	3.3
30 - 34	6.8	5.5	6.2	6.7	6.1	6.3
35 - 39	13.4	12.6	13.1	13.6	12.2	11.7
40 - 44	27.4	28.0	28.2	26.9	24.5	22.2
45 - 49	50.8	55.9	52.0	49.8	45.8	39.5
50 - 54	92.2	91.4	95.3	88.4	79.1	74.1
55 - 59	133.6	140.9	142.0	130.5	117.4	109.1
60 - 64	223.3	236.2	227.7	214.8	206.4	190.7
65 - 69	392.8	385.0	387.3	389.4	364.3	366.1
70 - 74	661.0	707.1	686.4	654.4	616.9	626.4
75 ≤	1,701.7	1,756.1	1,750.6	1,772.4	1,732.4	1,801.0

寿命学研究会「第3回寿命学研究会年報 1958」昭和34年10月刊によるも、W. H. O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1950-1955 の各年版より引用せるもの。

表74 主要国の年次別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(1950年-1955年)

(1) 中枢神経系の血管損傷

フランス		1950	1951	1952	1953	1954	1955
年齢階級							
男							
総数		132.2	137.5	131.9	136.7	136.3	136.3
0		27.8	23.9	20.2	24.5	26.8	28.8
1-4		1.9	1.7	1.7	1.5	1.2	1.7
5-9		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
10-14		0.9	0.7	0.5	1.1	0.5	0.8
15-19		1.6	1.6	1.5	1.2	1.2	1.7
20-24		2.4	2.3	2.0	2.2	1.9	1.8
25-29		3.4	3.6	3.1	2.7	3.4	3.2
30-34		4.2	6.0	5.7	6.6	5.9	5.7
35-39		10.6	10.5	10.0	8.0	10.5	11.0
40-44		19.9	21.5	21.2	20.4	21.9	19.1
45-49		39.8	43.7	41.2	46.6	46.0	43.5
50-54		85.6	89.8	84.2	87.5	85.1	86.5
55-59		156.1	153.7	151.0	163.9	153.6	151.9
60-64		286.2	287.3	267.0	275.2	283.9	271.9
65-69		493.7	500.4	496.8	506.3	499.2	484.4
70-74		887.6	914.8	865.9	891.7	880.7	872.2
75=		1,801.1	1,709.4	1,838.4	1,914.0	1,844.4	1,898.7
女							
総数		145.9	150.8	147.7	154.9	151.4	151.2
0		19.1	15.6	15.1	14.1	12.8	14.8
1-4		1.3	1.4	1.6	0.8	1.3	1.2
5-9		1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
10-14		0.4	1.3	0.6	0.4	0.8	0.3
15-19		1.2	1.0	0.5	1.0	0.8	0.9
20-24		1.4	1.7	1.5	1.8	1.4	1.4
25-29		2.2	2.6	1.8	1.8	2.0	1.6
30-34		3.8	4.3	3.8	3.5	4.5	3.4
35-39		8.0	7.5	7.0	8.3	5.3	6.7
40-44		18.3	17.4	16.5	15.8	16.1	14.2
45-49		36.1	38.9	37.6	34.8	34.0	30.9
50-54		71.7	72.8	69.4	71.2	65.8	63.4
55-59		124.4	122.9	109.2	122.3	114.8	111.3
60-64		210.7	210.9	198.5	203.8	197.7	186.8
65-69		364.2	380.9	366.8	373.1	359.3	334.2
70-74		683.9	677.4	661.9	690.0	653.7	632.6
75=		1,451.7	1,502.0	1,475.9	1,541.7	1,515.8	1,544.7

前頁の注参照。

表74 (つづき)

(1) 中枢神経系の血管損傷

オランダ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	73.2	75.7	78.6	84.3	85.6	92.1
0	1.7	0.8	2.5	2.5	2.5	4.2
1 - 4	0.4	0.8	0.2	0.2	1.3	-
5 - 9	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2
10 - 14	0.5	0.7	0.5	1.1	0.4	0.6
15 - 19	1.5	1.7	1.2	1.7	0.5	0.2
20 - 24	2.1	0.7	1.0	2.0	1.0	1.2
25 - 29	3.3	2.3	2.8	2.1	2.4	2.4
30 - 34	2.1	2.6	3.1	3.0	2.6	3.7
35 - 39	2.1	3.3	3.9	3.6	2.4	4.5
40 - 44	14.7	7.2	6.2	8.4	6.1	6.4
45 - 49	12.1	16.3	16.4	17.5	17.0	11.0
50 - 54	30.5	38.2	36.7	37.0	29.5	30.3
55 - 59	71.2	66.1	84.8	71.6	86.6	64.1
60 - 64	139.1	152.9	149.7	143.0	150.0	151.2
65 - 69	370.3	341.1	336.6	342.8	336.9	374.5
70 - 74	587.6	654.5	644.7	707.2	669.5	710.1
75≦	1,658.7	1,634.0	1,673.3	1,790.7	1,820.1	1,981.5
女						
総 数	97.0	96.7	98.4	105.2	109.2	110.3
0	1.8	1.8	0.9	1.8	2.7	1.8
1 - 4	0.4	0.2	0.2	-	0.2	0.5
5 - 9	0.2	0.2	-	0.2	0.5	0.3
10 - 14	0.2	0.7	1.7	0.5	0.2	0.7
15 - 19	0.3	1.0	0.3	-	1.5	1.0
20 - 24	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	0.8
25 - 29	0.2	1.0	2.3	1.0	0.3	0.8
30 - 34	1.7	1.4	1.6	3.2	2.3	0.8
35 - 39	3.7	3.7	3.7	3.2	3.6	3.5
40 - 44	6.6	7.5	7.4	8.9	6.5	7.3
45 - 49	22.3	20.0	22.8	22.9	18.9	15.6
50 - 54	44.0	46.4	49.8	44.5	48.0	39.2
55 - 59	89.3	100.9	91.1	96.9	79.4	78.6
60 - 64	170.7	190.9	170.9	173.9	183.2	158.6
65 - 69	393.6	356.3	369.3	390.7	377.0	364.3
70 - 74	794.4	745.5	721.0	795.0	828.1	774.3
75≦	1,955.9	1,914.5	1,936.2	1,982.0	2,086.4	2,171.6

表 74 主要国の年次別、主要死因別、男女、年齢別死亡率 (1950年~1955年)

(2) 悪性新生物
イギリス

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	205.8	212.0	215.1	216.6	222.3	225.2
0	6.4	9.2	10.4	5.4	6.6	7.3
1 - 4	11.5	11.2	13.5	11.4	11.5	11.3
5 - 9	7.0	7.7	7.7	7.0	8.7	7.3
10 - 14	5.3	7.0	6.1	6.6	6.0	6.2
15 - 19	8.5	7.4	8.7	10.5	9.1	8.9
20 - 24	11.3	10.9	11.8	10.3	11.8	10.9
25 - 29	15.0	14.0	15.5	15.5	13.7	14.8
30 - 34	20.7	21.8	21.0	20.6	20.4	22.6
35 - 39	36.8	42.5	38.3	40.4	38.3	35.3
40 - 44	43.1	75.1	73.6	73.1	76.1	72.2
45 - 49	156.2	146.0	144.6	145.6	145.4	143.3
50 - 54	266.1	276.2	278.5	278.4	279.5	275.2
55 - 59	431.4	442.3	460.1	461.5	470.3	474.8
60 - 64	637.6	655.7	657.2	678.9	693.3	709.5
65 - 69	888.9	934.1	939.7	940.8	975.3	973.8
70 - 74	1,221.1	1,235.8	1,214.8	1,217.8	1,244.1	1,268.1
75 ≤	1,582.0	1,654.1	1,660.5	1,651.2	1,672.1	1,706.0
女						
総 数	184.0	182.2	185.0	183.3	186.1	187.3
0	8.2	7.3	7.3	9.3	7.9	6.5
1 - 4	9.9	10.9	10.9	10.8	8.0	11.1
5 - 9	6.7	5.5	6.4	5.5	5.7	5.5
10 - 14	4.5	4.2	4.7	5.4	4.6	4.4
15 - 19	6.7	4.6	6.4	4.5	6.6	6.1
20 - 24	5.4	8.4	6.7	7.3	7.7	6.6
25 - 29	13.7	12.9	12.8	12.9	12.5	13.9
30 - 34	25.7	25.5	21.3	26.8	26.0	25.7
35 - 39	47.1	52.5	45.4	47.7	49.0	44.5
40 - 44	89.9	88.9	95.0	90.8	90.2	89.1
45 - 49	150.9	145.4	148.4	150.1	150.1	148.8
50 - 54	224.8	221.9	222.6	216.2	226.8	225.5
55 - 59	316.3	311.4	316.4	307.2	303.7	305.9
60 - 64	431.0	417.3	427.2	413.5	414.0	410.5
65 - 69	578.3	569.9	562.9	547.8	555.3	549.0
70 - 74	785.1	748.9	743.7	720.8	723.3	731.0
75 ≤	1,130.8	1,140.3	1,121.1	1,092.4	1,081.9	1,076.4

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万、ただし、1950年の0歳は資料の都合で人口10万についてのもの。
イギリスは、イングランド・ウェールズのみ。(次頁に)

表74 (つづき)

(2) 悪性新生物

アメリカ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	1429	1451	1494	1523	1543	1558
0	8.6	7.6	7.3	7.7	8.5	7.8
1 - 4	12.5	13.1	12.3	11.7	12.0	12.2
5 - 9	8.1	7.6	8.1	8.5	7.8	9.2
10 - 14	6.6	6.5	5.8	6.3	6.8	6.9
15 - 19	9.1	9.9	9.6	8.4	9.4	9.1
20 - 24	10.2	12.7	12.5	12.9	12.4	13.0
25 - 29	14.9	14.8	14.6	15.1	15.2	14.8
30 - 34	20.7	20.1	20.7	19.8	20.9	20.0
35 - 39	33.4	32.1	31.4	34.8	33.8	34.3
40 - 44	58.9	58.5	61.2	62.1	61.2	58.3
45 - 49	113.7	112.7	116.5	119.2	117.9	119.1
50 - 54	202.7	207.8	205.2	211.6	212.6	214.4
55 - 59	335.0	344.2	350.7	358.1	346.6	348.2
60 - 64	510.3	506.8	524.4	535.7	540.0	548.5
65 - 69	676.8	701.2	737.2	751.0	779.3	802.4
70 - 74	947.9	919.9	938.2	944.2	977.0	995.0
75≦	1,951.7	1,369.3	1,404.2	1,421.1	1,429.0	1,435.4
女						
総 数	136.8	136.1	137.5	137.4	137.2	137.4
0	6.8	6.7	7.8	7.6	6.7	6.9
1 - 4	10.8	10.4	10.9	10.0	10.5	10.0
5 - 9	6.8	6.5	6.3	6.0	6.6	6.3
10 - 14	5.1	5.1	5.3	5.1	5.3	5.0
15 - 19	6.7	6.2	7.0	6.4	5.8	6.6
20 - 24	8.4	8.5	8.3	7.9	8.6	7.7
25 - 29	15.3	14.8	15.7	14.4	14.1	14.5
30 - 34	29.6	29.3	29.8	28.3	28.0	27.1
35 - 39	57.7	56.5	57.2	54.1	54.5	55.8
40 - 44	103.3	100.7	96.6	97.9	96.2	96.4
45 - 49	160.2	156.3	156.1	153.8	155.4	152.8
50 - 54	231.2	232.7	231.0	229.2	227.8	219.0
55 - 59	324.0	316.7	315.8	307.6	295.5	300.3
60 - 64	426.5	420.4	415.0	413.7	410.5	405.2
65 - 69	525.5	524.3	534.8	551.3	553.7	557.8
70 - 74	722.2	690.0	696.4	682.8	676.0	674.9
75≦	1,048.9	1,043.1	1,056.1	1,055.9	1,035.5	1,033.1

寿命学研究会「第3回寿命学研究会年報1958」昭和34年10月刊によるも、W.H.O. : Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1950-1955 の各年版より引用せるもの。

表74 主要国の年次別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(1950年-1955年)

(2) 悪性新生物

フランス

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	17.64	178.9	183.7	184.7	188.1	190.2
0	6.1	7.2	7.6	7.8	8.5	9.3
1 - 4	10.2	11.8	10.1	10.4	10.3	9.4
5 - 9	7.2	5.8	8.4	6.8	7.7	7.4
10 - 14	5.2	5.8	5.4	6.6	5.7	5.2
15 - 19	7.0	6.5	7.6	7.2	9.3	6.4
20 - 24	8.6	9.0	7.5	8.6	10.2	10.1
25 - 29	10.2	11.6	12.2	12.4	12.5	11.9
30 - 34	13.7	13.9	15.6	15.8	15.1	17.6
35 - 39	26.5	23.3	25.4	26.1	30.3	25.5
40 - 44	56.6	52.1	51.6	53.9	54.1	52.5
45 - 49	127.6	121.3	123.6	121.6	122.0	113.1
50 - 54	242.0	244.0	240.8	237.1	232.0	232.3
55 - 59	378.3	385.3	392.0	400.9	401.5	393.2
60 - 64	534.2	551.1	568.8	569.5	583.6	590.3
65 - 69	783.8	792.4	793.6	817.9	784.5	810.7
70 - 74	1,061.8	1,045.5	1,088.2	1,088.5	1,096.7	1,111.0
75 ≤	1,297.2	1,366.6	1,432.2	1,432.2	1,454.5	1,518.7
女						
総 数	170.1	173.5	175.9	174.4	175.9	177.9
0	5.4	6.8	7.4	7.3	8.1	7.4
1 - 4	8.1	9.7	8.9	8.2	8.6	9.9
5 - 9	4.4	4.2	5.0	4.9	4.9	6.0
10 - 14	3.0	3.7	4.8	4.3	4.9	3.5
15 - 19	5.0	5.3	6.9	4.6	6.0	5.4
20 - 24	5.7	5.2	5.3	7.4	6.4	7.4
25 - 29	9.5	11.5	10.5	10.6	11.3	9.7
30 - 34	19.0	22.2	21.3	21.4	22.8	20.9
35 - 39	41.8	45.2	44.3	46.3	40.2	39.4
40 - 44	72.1	73.7	75.6	78.2	76.9	76.5
45 - 49	121.3	123.0	120.0	122.2	121.9	120.8
50 - 54	183.5	187.1	187.7	179.1	182.0	180.7
55 - 59	265.5	272.2	261.6	261.4	255.3	257.0
60 - 64	369.1	377.2	367.7	366.4	367.5	357.9
65 - 69	517.3	510.6	522.8	496.0	497.9	501.3
70 - 74	696.8	700.7	724.8	713.9	699.4	710.1
75 ≤	995.3	1,008.2	1,030.0	1,024.7	1,047.6	1,070.5

前頁の注参照。

表74 (つづき)

(2) 悪性新生物
オランダ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
			男			
総 数	149.6	151.5	154.3	157.3	162.8	163.7
0	-	5.1	5.0	11.9	5.1	5.9
1 - 4	8.9	10.4	15.3	9.5	10.5	12.9
5 - 9	7.5	6.9	7.3	6.6	6.1	6.4
10 - 14	4.8	6.8	7.2	4.7	8.9	5.5
15 - 19	9.7	9.7	7.8	10.8	8.3	8.9
20 - 24	12.6	13.3	11.1	14.1	7.5	12.7
25 - 29	14.2	18.7	14.8	14.4	16.0	15.4
30 - 34	25.5	21.9	25.1	22.3	24.1	22.6
35 - 39	33.7	36.4	42.1	32.7	41.4	30.9
40 - 44	62.4	65.1	63.6	60.0	66.3	61.3
45 - 49	106.7	121.4	107.8	120.7	119.5	125.0
50 - 54	215.8	204.3	196.8	212.5	204.2	216.1
55 - 59	327.9	329.0	339.6	348.4	365.2	356.6
60 - 64	505.8	508.0	502.2	509.7	563.4	539.0
65 - 69	750.1	760.0	760.8	755.5	777.9	741.0
70 - 74	1,113.2	1,100.9	1,155.1	1,115.3	1,086.8	1,118.2
75≦	1,779.8	1,732.4	1,726.7	1,761.6	1,786.2	1,809.3
			女			
総 数	144.1	147.2	147.7	147.1	149.7	146.0
0	-	6.3	4.4	7.2	8.1	9.8
1 - 4	9.9	12.0	10.8	11.9	10.4	8.8
5 - 9	5.7	6.8	5.2	5.6	6.9	6.6
10 - 14	4.5	4.1	5.1	4.2	4.6	5.1
15 - 19	7.6	5.8	5.6	6.9	5.3	5.5
20 - 24	7.8	12.1	11.1	8.8	8.9	6.7
25 - 29	17.2	17.3	13.0	11.3	14.8	11.2
30 - 34	21.2	26.4	28.5	27.8	27.5	26.8
35 - 39	42.9	49.6	53.7	54.2	46.8	53.2
40 - 44	77.3	82.5	90.5	83.8	77.6	84.9
45 - 49	139.3	138.4	142.4	141.5	144.6	140.2
50 - 54	209.4	219.9	224.1	214.5	217.1	196.4
55 - 59	321.5	320.5	301.7	304.6	313.4	290.8
60 - 64	447.5	447.5	444.4	431.9	436.7	410.9
65 - 69	649.6	665.6	619.1	601.3	592.5	591.2
70 - 74	920.4	885.7	885.1	839.4	882.9	856.7
75≦	1,432.0	1,417.6	1,421.2	1,396.9	1,423.4	1,364.0

表74 主要国の年次別、主要死因別、男女、年齢別死亡率(1950年-1955年)

(3) 心臓の疾患

イギリス		1950	1951	1952	1953	1954	1955
年齢階級							
総数		355.9	381.9	362.5	354.4	366.2	373.3
0		3.1	2.0	2.3	4.5	1.7	-
1-4		0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.6
5-9		1.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3
10-14		3.5	2.0	1.6	1.8	1.4	1.0
15-19		5.3	3.9	3.7	3.8	3.8	4.6
20-24		8.6	7.7	6.8	6.5	5.9	6.5
25-29		12.4	10.4	10.0	9.7	10.3	8.3
30-34		17.4	18.9	17.5	18.2	18.3	14.9
35-39		32.3	34.7	33.6	34.9	36.3	35.9
40-44		64.6	67.5	65.6	61.8	71.7	72.8
45-49		140.7	138.6	140.9	134.1	141.1	144.1
50-54		259.6	271.7	269.2	266.7	282.8	282.8
55-59		460.6	470.1	472.8	461.2	478.3	482.7
60-64		832.0	838.9	800.6	785.7	807.5	834.1
65-69		1,343.9	1,443.3	1,335.5	1,319.1	1,348.7	1,333.2
70-74		2,189.1	2,360.9	2,220.6	2,158.5	2,189.2	2,207.4
75≧		5,175.9	5,693.0	5,165.7	4,976.9	5,022.0	5,163.8
				女			
総数		334.5	353.0	318.3	317.1	317.0	327.1
0		0.9	0.9	2.1	2.1	3.0	-
1-4		0.3	0.4	0.7	0.2	-	0.4
5-9		1.2	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5
10-14		2.8	2.7	1.7	1.6	1.5	1.2
15-19		5.8	4.9	2.9	2.5	3.8	2.3
20-24		7.9	7.4	6.7	5.2	4.9	4.9
25-29		12.6	10.8	12.2	10.1	9.6	8.0
30-34		18.5	17.5	15.6	15.3	15.7	11.8
35-39		27.3	25.8	23.3	23.4	22.7	18.6
40-44		38.1	39.7	33.5	34.6	35.4	33.9
45-49		65.9	63.1	58.3	58.1	54.3	58.0
50-54		107.8	110.9	100.1	94.8	92.9	98.0
55-59		194.6	196.2	181.7	174.3	171.7	174.8
60-64		390.2	391.3	353.7	354.3	344.7	338.3
65-69		759.0	798.2	719.0	681.4	675.1	673.6
70-74		1,510.1	1,555.2	1,345.5	1,327.5	1,308.0	1,308.6
75≧		4,594.4	4,977.6	4,284.3	4,148.3	4,028.8	4,140.3

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について、ただし、1950年の0歳は、資料の都合で人口10万についてのもの。
イギリスは、イングランド・ウェールズのみ。

(次頁に)

表74 (つづき)

(3) 心臓の疾患
アメリカ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
	男					
総 数	370.2	373.6	376.1	384.0	374.2	384.2
0	3.5	7.6	8.8	9.0	8.4	1.3
1 - 4	1.3	1.0	1.5	1.2	1.3	1.3
5 - 9	1.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6
10 - 14	2.5	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
15 - 19	5.6	5.6	5.3	4.3	5.0	3.8
20 - 24	7.2	8.6	9.4	8.0	6.7	5.8
25 - 29	13.7	13.7	13.1	12.8	12.9	12.9
30 - 34	28.6	29.3	29.6	29.2	26.8	26.3
35 - 39	65.9	66.9	67.6	68.6	66.6	66.8
40 - 44	152.0	153.4	154.3	151.6	141.6	145.4
45 - 49	291.8	291.5	289.5	291.1	284.4	280.5
50 - 54	502.2	505.7	502.9	506.0	494.1	491.8
55 - 59	797.5	807.4	811.8	797.0	763.8	773.3
60 - 64	1,188.6	1,168.8	1,187.9	1,213.6	1,174.0	1,187.0
65 - 69	1,685.7	1,687.1	1,716.5	1,779.3	1,745.6	1,790.6
70 - 74	2,447.7	2,398.3	2,359.3	2,420.0	2,375.1	2,481.0
75 ≤	4,716.8	4,726.4	4,654.9	4,782.6	4,607.7	4,820.6
	女					
総 数	228.6	228.2	230.9	236.1	229.7	239.7
0	2.6	5.9	6.9	7.0	6.8	1.4
1 - 4	1.2	1.0	1.0	1.3	1.1	1.4
5 - 9	1.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.5
10 - 14	3.0	1.7	1.6	1.4	1.0	1.0
15 - 19	5.2	4.3	4.3	4.0	3.2	3.0
20 - 24	7.2	7.4	6.6	6.4	6.2	5.9
25 - 29	10.7	10.4	10.3	10.0	8.1	8.4
30 - 34	16.8	16.3	16.1	15.6	13.7	13.6
35 - 39	30.0	29.9	28.6	27.6	24.5	23.0
40 - 44	54.0	52.7	51.0	48.1	44.5	43.2
45 - 49	96.7	89.7	88.9	84.3	81.2	80.3
50 - 54	163.3	165.7	159.6	159.0	151.9	144.7
55 - 59	286.4	278.2	274.5	275.9	254.6	254.6
60 - 64	514.0	507.6	496.2	489.5	469.2	471.4
65 - 69	849.9	844.2	870.9	895.2	864.9	886.4
70 - 74	1,509.1	1,434.3	1,427.7	1,438.4	1,384.1	1,413.4
75 ≤	3,799.6	3,767.5	3,787.8	3,857.5	3,703.7	3,895.3

寿命学研究会「第3回寿命学研究会年報1958」昭和34年10月刊によるも、W.H.O. : Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1950-1955の各年版より引用せるもの。

表74 主要国の年次別、主要死因別、男女年齢別死亡率(1950年-1955年)

(3) 心臓の疾患

フランス

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
男						
総 数	219.0	228.6	209.6	219.5	213.5	215.0
0	18.6	15.9	13.3	16.3	13.3	12.5
1 - 4	1.8	3.0	3.4	2.9	3.0	3.1
5 - 9	3.0	2.4	2.0	1.9	1.4	1.2
10 - 14	4.0	3.1	2.8	2.7	2.5	2.7
15 - 19	6.8	5.2	5.0	4.9	4.0	4.1
20 - 24	7.9	6.1	5.4	5.6	6.1	6.0
25 - 29	8.8	9.4	7.2	8.2	6.6	7.2
30 - 34	13.9	11.7	12.3	11.8	13.0	13.4
35 - 39	22.4	24.6	22.0	19.8	21.5	22.2
40 - 44	44.9	44.7	38.6	39.4	39.3	39.0
45 - 49	86.1	88.3	76.6	79.5	81.6	78.8
50 - 54	170.4	172.3	155.2	166.8	161.6	151.2
55 - 59	300.5	301.4	285.4	283.8	274.7	281.2
60 - 64	512.8	517.6	483.4	479.1	481.4	477.8
65 - 69	851.8	869.9	786.2	836.6	798.1	777.9
70 - 74	1,356.9	1,422.9	1,321.2	1,356.8	1,289.9	1,330.9
75 ≤	2,759.9	2,964.0	2,712.1	2,922.1	2,730.5	2,797.7
女						
総 数	216.5	226.4	206.1	219.1	203.4	208.6
0	14.7	18.8	16.7	11.5	10.7	9.4
1 - 4	2.0	3.1	3.5	3.2	2.2	4.2
5 - 9	2.5	2.5	1.6	1.4	1.4	1.3
10 - 14	5.1	2.9	2.3	3.2	2.4	2.4
15 - 19	4.1	3.8	3.4	4.6	3.9	3.5
20 - 24	6.9	5.7	6.2	6.2	5.4	3.6
25 - 29	11.2	8.4	7.0	7.5	8.1	7.2
30 - 34	12.7	12.3	10.3	10.8	9.8	9.4
35 - 39	19.9	20.3	18.2	18.8	17.0	15.8
40 - 44	30.7	28.1	29.3	25.4	24.5	22.0
45 - 49	51.7	51.2	46.8	43.0	42.9	42.7
50 - 54	91.1	87.4	71.9	78.5	72.1	69.8
55 - 59	148.9	149.0	132.0	133.0	123.6	118.4
60 - 64	277.7	287.9	246.5	247.6	218.9	225.1
65 - 69	527.8	520.8	467.4	486.5	434.0	439.3
70 - 74	944.2	963.6	882.8	906.3	817.7	819.1
75 ≤	2,277.8	2,418.1	2,185.6	2,365.7	2,199.8	2,257.7

前頁の注参照。

表74 (つづき)

(3) 心臓の疾患

オランダ

年齢階級	1950	1951	1952	1953	1954	1955
	男					
総 数	1674	1677	1724	1815	1945	2018
0	6.0	8.4	5.0	4.2	9.3	-
1 - 4	1.4	0.4	1.6	0.4	1.5	0.6
5 - 9	0.6	1.0	0.2	0.4	0.6	1.0
10 - 14	1.0	2.1	1.8	2.1	1.5	1.3
15 - 19	3.6	4.3	3.2	2.4	2.2	1.4
20 - 24	4.9	3.2	3.6	5.2	2.4	3.4
25 - 29	7.1	8.0	6.5	5.4	5.2	6.0
30 - 34	9.1	12.0	7.0	11.1	7.3	10.0
35 - 39	13.7	13.7	16.3	17.7	16.0	10.8
40 - 44	32.5	38.8	36.8	38.1	39.0	38.1
45 - 49	70.3	67.5	73.0	66.5	91.4	95.3
50 - 54	153.1	137.2	161.6	152.8	173.7	183.3
55 - 59	228.8	229.0	266.2	260.9	301.0	297.1
60 - 64	436.5	425.9	429.5	442.0	489.0	573.3
65 - 69	734.5	733.6	742.2	754.3	819.8	860.8
70 - 74	1,342.9	1,242.3	1,290.3	1,379.7	1,419.5	1,397.5
75=	3,233.8	3,248.9	3,123.6	3,274.1	3,334.7	3,417.3
	女					
総 数	1553	1520	1529	1624	1633	1671
0	6.3	4.5	1.8	5.4	5.4	1.8
1 - 4	1.3	1.5	2.4	2.3	2.3	1.6
5 - 9	1.8	1.2	0.2	0.4	0.8	0.9
10 - 14	1.7	4.9	0.7	1.2	1.1	0.8
15 - 19	2.0	1.6	2.1	2.6	2.8	3.5
20 - 24	4.8	2.1	2.4	1.6	2.1	2.6
25 - 29	6.2	6.3	2.4	6.7	4.9	5.7
30 - 34	8.3	7.2	7.8	8.5	4.6	6.2
35 - 39	10.6	8.6	11.5	10.2	9.8	9.9
40 - 44	15.6	17.7	18.8	13.9	20.9	19.0
45 - 49	28.3	30.2	30.8	32.9	27.0	33.1
50 - 54	62.6	60.3	55.9	54.4	70.6	57.9
55 - 59	115.3	116.4	115.1	122.0	118.9	121.6
60 - 64	286.6	246.0	255.1	267.6	254.9	252.2
65 - 69	608.0	569.5	510.5	550.1	594.2	553.5
70 - 74	1,238.4	1,126.8	1,110.3	1,086.4	1,093.0	999.3
75=	3,161.6	3,146.0	3,148.9	3,271.9	3,178.6	3,226.8

表75 諸外国における主要死因別、男女、年齢（5歳階級）別死亡率（1955年）

(1) 全死因

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	ニュージー ランド
総数	8.3	10.7	12.5	12.9	11.9	8.1	9.2	9.8	10.7	9.9
0 - 4	4.23	26.7	28.1	43.6	45.9	22.7	27.6	19.4	29.0	23.3
5 - 9	4.1	1.1	1.0	1.9	1.8	1.4	1.3	1.2	1.7	1.3
10 - 14	1.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.8	0.5
15 - 19	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
20 - 24	1.5	1.3	0.9	1.0	1.3	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3
25 - 29	2.7	1.8	1.2	1.6	2.1	1.0	1.2	1.2	1.9	1.7
30 - 34	2.9	1.6	1.1	1.9	1.9	1.0	1.3	1.2	1.7	1.3
35 - 39	2.9	1.8	1.4	2.3	2.0	1.2	1.4	1.4	2.0	1.5
40 - 44	3.4	2.6	1.9	3.1	2.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2
45 - 49	4.7	4.2	3.1	4.7	3.5	2.4	2.5	2.6	3.3	2.8
50 - 54	7.2	7.1	5.4	7.5	5.7	4.4	4.4	4.1	5.5	5.0
55 - 59	11.0	11.4	10.1	11.9	9.7	7.1	7.6	6.7	9.3	8.8
60 - 64	17.0	17.5	17.1	17.7	16.0	11.4	12.1	11.7	14.6	15.1
65 - 69	27.4	27.0	28.0	26.0	24.5	18.2	18.7	18.6	23.6	23.0
70 - 74	44.1	41.1	44.0	38.2	37.4	28.6	30.9	29.1	37.6	37.2
75 - 79	69.7	58.1	67.7	60.2	45.8	47.0	47.2	48.4	57.3	57.4
80 - 84	104.3	88.2	109.1	96.0	99.8	80.3	79.7	80.0	99.1	90.4
	150.5	133.9	168.0	152.5	162.2	131.3	130.5	131.9	154.0	129.6
85≦	243.1	200.6	256.2	260.7	276.7	242.1	225.8	236.6	265.6	222.3

表 7 5 (1) 全死因 (つづき)

女

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	ニユー ゼーランド
総 数	7.2	7.8	10.9	11.5	9.9	7.1	8.2	9.1	9.6	8.0
0 - 4	37.1	20.3	21.5	33.5	36.9	17.3	22.6	15.4	23.9	16.6
5 - 9	3.9	0.9	1.0	1.7	1.4	1.1	0.7	0.8	1.5	1.2
10 - 14	1.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3
15 - 19	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
20 - 24	1.1	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
25 - 29	1.9	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7
30 - 34	2.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6
35 - 39	2.5	1.0	1.1	1.4	1.4	0.9	1.2	0.8	1.1	0.8
40 - 44	3.0	1.6	1.5	1.9	1.9	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4
45 - 49	3.8	2.4	2.3	2.8	2.5	1.9	2.3	2.1	2.3	2.1
50 - 54	5.3	3.7	3.7	4.2	3.8	3.0	3.4	3.2	3.9	3.7
55 - 59	7.7	5.6	5.7	6.1	5.7	4.6	5.2	5.2	5.7	6.3
60 - 64	11.3	8.6	8.7	8.9	8.8	7.4	8.3	7.9	8.8	8.3
65 - 69	17.6	14.1	14.3	13.6	14.5	12.2	13.8	12.7	14.4	14.0
70 - 74	29.1	24.2	24.3	22.0	26.0	21.9	23.1	22.5	25.0	24.4
75 - 79	48.0	37.1	42.2	37.4	48.2	40.4	39.8	40.1	43.6	38.1
80 - 84	77.2	64.3	72.4	66.8	86.4	69.8	70.8	69.8	77.4	69.7
85 以上	121.0	110.1	125.6	114.0	145.5	120.9	119.2	120.3	128.8	108.9
85 以下	221.3	191.6	222.9	212.6	247.5	220.3	205.9	216.9	239.3	204.1

各年齢階級人口 1,000.0 につき、0 歳のみに出生 1,000.0 について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和 32 年人口動態統計上巻」昭和 34 年 3 月刊による。

W. H. O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955 より引用されたもの。

表 7 5 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率（1955年）
 (2) 伝染病および寄生虫病

男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イギリス ・ウェールズ	フランス	ドイツ （西）	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ユージン ランド
総 数	85.1	18.4	30.0	57.5	36.6	15.4	11.8	17.7	39.0	46.8	26.1
0 歳	148.9	36.7	40.2	150.5	72.6	36.5	30.2	21.7	45.7	137.4	85.7
1 - 4	94.3	8.5	13.1	22.9	26.3	14.0	2.6	3.2	17.0	41.6	19.5
5 - 9	34.2	3.6	4.2	4.5	7.3	5.9	1.4	1.3	8.4	14.8	3.7
10 - 14	12.0	2.6	2.1	2.1	3.4	2.1	1.5	1.4	5.6	8.0	3.5
15 - 19	20.5	3.1	3.9	4.9	3.4	1.9	1.9	4.0	5.5	10.2	1.5
20 - 24	45.4	2.8	6.5	9.4	7.5	3.7	1.4	3.7	13.5	15.4	7.7
25 - 29	76.5	4.8	10.9	20.7	14.2	4.2	2.8	5.9	15.2	26.4	6.7
30 - 34	93.1	6.4	15.6	33.0	21.4	7.6	7.7	10.5	22.0	36.6	13.6
35 - 39	96.3	8.6	18.4	43.0	21.7	9.3	5.3	13.8	25.1	41.6	22.5
40 - 44	110.7	12.9	23.2	62.2	28.1	14.3	9.7	12.4	33.1	49.3	16.3
45 - 49	133.0	20.4	31.1	82.7	43.1	15.8	8.8	20.4	41.9	67.5	24.2
50 - 54	155.3	30.9	48.3	106.7	58.5	16.7	13.8	29.5	63.9	90.1	37.3
55 - 59	182.9	39.0	65.3	126.4	84.5	36.0	24.5	31.2	72.6	112.1	44.3
60 - 64	228.1	53.2	83.4	147.5	94.1	43.7	37.0	49.4	84.2	119.6	64.7
65 - 69	267.6	69.6	106.8	144.4	109.9	51.7	42.9	46.1	142.1	114.4	83.3
70 - 74	273.6	76.3	102.7	155.0	115.4	52.6	37.3	62.2	147.2	104.6	119.7
75 - 79	241.9	79.1	92.7	157.5	123.0	81.5	71.2	60.4	146.6	95.3	133.1
80 - 84	185.8	91.7	71.4	142.2	112.2	53.8	56.4	66.5	196.9	70.2	85.3
85 歳以上	160.0	85.7	46.2	132.6	80.3	92.0	82.4	100.4	181.3	64.2	86.0

表 7 5 (2)伝染病および寄生虫病(つづき)
女

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総 数	64.7	8.8	14.2	27.9	18.8	11.9	11.4	11.6	25.0	26.8	12.7
0 歳	138.6	30.3	40.4	127.2	68.4	33.0	43.1	15.4	55.4	119.6	57.8
1 - 4	101.5	8.4	13.6	22.4	23.1	14.8	6.2	8.1	14.0	44.1	13.6
5 - 9	35.4	3.1	3.4	3.6	6.5	5.2	0.5	2.0	5.4	14.0	2.9
10 - 14	13.9	2.5	2.6	2.1	2.7	1.3	1.1	2.9	3.7	7.1	2.5
15 - 19	25.2	2.2	3.2	4.6	3.8	2.2	2.6	1.4	5.0	11.2	4.5
20 - 24	50.6	3.2	7.5	11.0	9.0	5.1	2.8	3.7	7.8	19.5	4.9
25 - 29	75.0	4.6	13.7	17.9	12.5	4.4	4.1	9.8	11.4	21.0	5.9
30 - 34	80.2	5.1	15.2	22.9	12.9	7.6	5.0	9.6	13.2	24.2	8.4
35 - 39	74.4	6.7	14.8	24.6	14.3	8.2	7.8	8.4	16.6	25.2	8.8
40 - 44	70.0	7.4	12.5	26.2	13.2	8.2	10.2	9.7	21.0	21.4	10.5
45 - 49	73.4	8.6	13.1	25.1	14.1	8.6	8.5	11.4	23.9	21.9	15.1
50 - 54	76.8	8.1	14.2	25.1	17.9	8.7	31.8	11.7	24.4	25.6	25.2
55 - 59	89.7	10.3	15.1	30.2	22.3	18.0	21.7	13.6	31.9	31.2	6.6
60 - 64	110.8	13.5	21.1	36.5	31.0	24.1	22.1	20.0	33.2	37.1	22.3
65 - 69	124.8	18.4	23.8	48.3	41.2	40.5	22.0	28.0	56.2	50.8	27.3
70 - 74	125.1	26.6	28.2	68.9	57.8	39.3	43.6	23.4	90.7	58.6	39.5
75 - 79	118.8	35.8	30.7	83.1	68.1	64.8	55.0	53.2	112.4	60.5	29.8
80 - 84	111.6	44.7	35.0	89.1	78.3	55.2	58.3	62.2	164.9	44.9	29.6
85 ≧	122.7	54.9	49.7	89.7	74.0	44.8	81.8	35.7	218.1	67.7	41.2

各年齢階級人口10万について、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W. H. C.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用されたもの。

表 7 5 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(3) 呼吸器系の結核
男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イギリス ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	ス イ ス	イタリヤ	ニュージーランド
総 数	53.8	10.5	19.5	40.8	26.5	6.6	5.5	12.0	21.8	27.4	13.5
0 - 歳	4.9	0.7	0.3	7.1	2.7	1.7	-	-	2.3	8.3	-
1 - 4	4.5	0.2	0.3	1.3	1.1	0.2	0.6	-	0.6	2.3	-
5 - 9	1.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	-	-	0.5	0.8	-
10 - 14	2.2	-	0.1	0.1	0.6	-	-	-	-	0.8	-
15 - 19	11.9	0.2	0.8	1.3	0.8	0.2	-	2.2	-	3.0	-
20 - 24	35.2	0.7	3.0	4.9	4.2	0.5	0.7	2.3	5.3	8.9	3.1
25 - 29	65.1	1.9	7.1	16.5	11.0	1.8	2.1	4.6	7.6	20.7	2.7
30 - 34	79.2	3.5	11.3	26.3	16.8	4.5	5.8	8.0	14.1	30.0	6.8
35 - 39	80.3	5.4	13.2	33.8	19.3	6.3	4.6	10.1	18.8	33.1	15.0
40 - 44	88.1	8.8	16.9	51.5	23.1	8.5	7.1	9.8	21.7	38.3	11.9
45 - 49	104.1	14.5	24.2	69.4	36.0	9.4	6.1	13.2	23.0	53.2	17.7
50 - 54	121.4	22.1	37.8	89.5	49.1	11.0	7.6	22.2	38.4	67.5	24.2
55 - 59	138.1	25.8	49.0	102.3	70.0	19.4	8.7	25.7	43.6	75.6	32.7
60 - 64	172.2	36.0	59.0	114.5	76.8	18.7	13.7	33.9	49.3	74.8	39.4
65 - 69	200.3	46.1	73.9	108.0	87.7	23.1	19.5	29.5	86.5	67.4	58.6
70 - 74	202.0	51.5	66.1	110.3	89.0	27.5	15.3	40.2	93.8	52.9	82.3
75 - 79	156.7	51.0	52.7	107.4	94.7	42.6	30.5	47.7	85.9	48.9	57.9
80 - 84	97.0	60.8	32.3	83.2	82.7	29.3	46.2	44.3	147.7	29.5	60.9
85 ≧	70.0	54.1	12.8	82.7	39.4	57.5	35.3	62.8	136.0	28.5	28.7

表 7 5 (3)呼吸器系の結核(つづき)
女

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総数	36.4	3.7	7.2	15.2	10.0	4.5	4.7	7.1	13.5	11.7	5.9
0 歳	4.6	0.7	1.9	6.9	2.1	-	-	-	-	7.3	8.3
1 - 4	4.7	0.5	0.2	0.8	1.2	0.5	0.7	0.5	-	2.6	-
5 - 9	2.0	-	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.5	0.6	-
10 - 14	4.7	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	-	0.7	-	1.6	-
15 - 19	17.3	0.4	1.2	2.1	1.5	-	0.7	-	-	5.0	1.5
20 - 24	40.0	0.8	5.6	7.2	5.3	1.5	2.1	2.8	4.5	13.5	-
25 - 29	62.1	2.1	10.8	13.0	8.8	3.1	2.7	7.2	6.2	15.2	2.9
30 - 34	66.3	2.9	11.8	17.0	9.6	4.3	4.4	8.1	9.0	16.3	2.8
35 - 39	57.9	4.4	11.2	19.4	11.5	4.4	5.9	7.2	9.9	16.9	5.9
40 - 44	51.8	5.2	9.0	20.6	8.5	5.0	8.3	7.8	13.8	13.0	7.5
45 - 49	52.1	4.8	8.1	17.9	9.4	3.1	2.6	6.8	12.5	12.5	11.7
50 - 54	55.2	4.4	8.6	15.6	9.6	4.7	5.1	7.5	13.4	12.7	15.5
55 - 59	62.7	14.9	8.1	17.2	11.8	5.4	4.8	7.5	16.4	13.1	6.6
60 - 64	75.7	6.5	11.2	22.0	16.7	8.2	7.7	10.8	20.5	18.7	12.4
65 - 69	80.5	9.8	10.4	27.4	27.0	16.3	8.1	17.2	34.9	23.0	16.4
70 - 74	74.8	14.0	11.9	39.5	37.2	19.3	18.0	14.2	63.8	29.0	19.7
75 - 79	57.5	20.8	13.6	50.5	44.0	34.1	22.9	38.7	73.7	27.8	29.8
80 - 84	36.4	25.9	8.2	50.2	47.0	36.1	31.4	41.5	101.7	20.0	9.9
85≧	27.3	23.1	10.2	41.7	25.0	17.9	54.5	13.4	105.0	14.0	20.6

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W. H. O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用されたもの。

表75 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(4) 悪性新生物(リンパ組織および造血組織の新生物を含む)

男		日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ニュージー ランド
年齢階級	数											
総数	94.0	160.1	225.2	190.2	195.3	163.7	191.1	162.6	206.3	134.8	160.5	
0歳	4.7	8.1	7.3	9.3	6.9	5.9	12.6	7.2	9.1	7.8	-	
1-4	7.3	13.1	11.3	9.4	11.2	12.9	12.3	8.6	6.7	13.2	14.1	
5-9	4.4	9.7	7.3	7.4	7.2	6.4	5.1	5.0	11.2	8.3	10.2	
10-14	3.9	7.0	6.2	5.2	5.9	5.5	6.6	6.8	5.6	6.0	10.6	
15-19	5.4	9.2	8.9	6.4	8.1	8.9	10.8	11.9	8.0	8.2	7.3	
20-24	5.8	13.3	10.9	10.1	9.8	12.7	14.6	11.6	11.7	8.5	10.8	
25-29	9.1	15.2	14.8	11.9	12.6	15.4	14.5	10.9	16.9	12.9	6.7	
30-34	17.3	19.8	22.6	17.6	18.6	22.6	18.6	20.7	19.7	18.7	21.7	
35-39	33.3	33.4	35.3	25.5	28.0	30.9	29.2	25.0	22.0	30.9	31.6	
40-44	65.1	55.4	72.2	52.5	52.1	61.3	56.3	42.6	54.9	60.3	43.0	
45-49	127.0	114.5	143.3	113.1	111.9	125.0	101.8	70.1	104.0	125.0	117.7	
50-54	218.2	207.2	275.2	232.3	220.8	216.1	204.1	139.7	232.1	225.5	218.0	
55-59	354.3	338.4	474.8	393.2	387.5	356.6	338.3	262.4	421.8	373.3	328.9	
60-64	573.4	541.4	709.5	590.3	601.4	539.0	538.1	431.3	677.3	508.2	506.5	
65-69	800.9	795.5	973.8	810.7	864.6	741.0	863.6	627.3	989.6	680.9	787.0	
70-74	972.1	1,002.7	1,268.1	1,110.0	1,227.2	1,118.2	1,159.3	966.9	1,295.5	909.4	1,040.0	
75-79	905.5	1,322.5	1,629.1	1,430.9	1,592.3	1,560.8	1,653.9	1,352.1	1,827.6	1,121.5	1,394.7	
80-84	717.2	1,645.1	1,852.4	1,665.7	1,869.0	1,992.7	2,292.3	1,770.1	2,204.6	1,067.7	1,741.8	
85≦	497.6	1,746.9	1,730.8	1,570.6	1,737.9	2,557.5	2,141.2	1,607.0	2,416.9	1,144.4	2,120.3	

表 7 5 (4) 悪性新生物 (つづき) 女

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イギリス ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総 数	80.3	141.0	187.3	177.9	184.2	146.0	190.2	165.6	174.0	121.8	146.1
0 歳	5.4	6.8	6.5	7.4	6.1	9.8	8.1	11.5	14.4	6.9	4.1
1 - 4	5.3	10.6	11.1	9.9	9.6	8.8	6.8	13.9	10.8	10.4	10.2
5 - 9	3.0	6.6	5.5	6.0	6.7	6.6	8.8	8.0	4.4	5.5	4.8
10 - 14	3.3	5.1	4.4	3.5	3.5	5.1	3.7	2.9	4.8	4.2	3.7
15 - 19	3.5	6.7	6.1	5.4	5.7	5.5	6.5	7.2	8.2	5.8	7.5
20 - 24	5.4	7.9	6.6	7.4	6.7	6.7	7.7	9.3	7.8	7.1	8.1
25 - 29	11.8	13.9	13.9	9.7	13.3	11.2	15.7	14.0	13.5	12.2	10.3
30 - 34	23.5	25.6	25.7	20.9	30.9	26.8	35.0	22.9	17.9	24.1	16.8
35 - 39	49.6	52.2	44.5	39.4	54.7	53.2	57.5	47.6	46.8	47.1	50.0
40 - 44	91.6	91.1	89.1	76.5	94.1	84.9	105.2	81.5	73.1	79.6	89.7
45 - 49	139.1	145.9	148.8	120.8	148.5	140.2	160.4	131.3	137.9	118.9	158.9
50 - 54	201.6	209.4	225.5	180.7	215.0	196.4	233.7	192.3	197.5	182.5	242.2
55 - 59	275.1	292.2	305.9	257.0	304.2	290.8	341.4	285.7	314.3	254.1	241.3
60 - 64	368.5	402.3	410.5	357.9	432.6	410.9	679.5	397.5	421.1	354.1	369.0
65 - 69	491.9	552.7	549.0	501.3	627.7	591.2	665.9	536.3	557.0	496.5	557.4
70 - 74	573.4	678.5	731.0	710.1	903.8	856.7	900.8	746.9	806.9	670.8	707.0
75 - 79	596.3	916.9	929.8	966.4	1,239.4	1,153.8	1,302.8	934.6	1,148.4	838.2	1,082.4
80 - 84	529.8	1,165.7	1,209.7	1,162.0	1,495.6	1,552.0	1,852.0	1,182.3	1,529.3	947.8	1,332.9
85 ≦	403.4	1,357.6	1,355.1	1,247.4	1,466.7	1,820.6	1,918.2	1,406.2	1,688.2	1,033.8	1,360.8

各年齢階級別人口 10 万につき、0 歳のみに出生 10 万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和 34 年人口動態統計上巻」昭和 34 年 3 月刊による。

W. K. O. : Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955 より引用せるもの。

表 7 5 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(5) 消化器及び腹膜の悪性新生物

男

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総数	75.4	59.3	90.9	93.6	103.6	77.3	95.9	86.3	104.9	71.2	67.8
0 歳	0.3	1.5	0.3	1.2	0.5	0.8	2.5	-	-	1.1	-
1 - 4	0.4	0.3	0.1	0.6	0.3	0.2	0.6	-	-	1.0	-
5 - 9	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	-	0.5	0.6	-	0.7	-
10 - 14	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	-	-	0.3	-	0.2	-
15 - 19	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4	-	0.4	-
20 - 24	1.5	1.1	1.0	0.8	0.7	1.0	1.4	0.5	1.2	0.9	1.5
25 - 29	4.5	1.8	2.1	1.7	1.8	1.0	2.1	2.9	1.2	2.9	-
30 - 34	10.5	3.6	5.7	4.0	4.6	2.4	4.5	5.4	2.3	5.1	4.1
35 - 39	24.7	7.6	10.8	7.5	9.8	10.2	6.0	10.5	6.9	11.4	6.0
40 - 44	51.4	15.7	23.3	18.9	22.8	19.5	20.7	15.7	20.6	25.9	20.7
45 - 49	103.9	34.7	47.8	46.4	51.1	48.1	45.2	30.9	35.6	55.1	43.5
50 - 54	180.7	67.7	92.8	97.0	97.6	77.3	81.0	71.3	87.0	104.5	82.0
55 - 59	298.9	115.1	154.8	174.4	174.6	141.9	140.7	130.2	196.4	181.4	142.3
60 - 64	482.5	198.3	265.8	292.6	296.5	252.8	248.4	224.3	328.0	281.7	199.8
65 - 69	671.9	319.7	393.9	425.1	484.2	368.4	446.8	362.3	562.1	407.3	354.9
70 - 74	803.0	424.1	569.8	625.5	732.6	604.0	669.5	559.1	739.1	570.4	490.1
75 - 79	750.0	565.8	823.4	805.0	993.5	890.5	921.1	758.2	1069.3	677.1	596.1
80 - 84	573.1	710.4	984.7	893.5	1,184.3	1,136.9	1,369.2	1,019.4	1,329.3	603.7	913.5
85≧	382.5	709.2	888.5	750.6	1,024.2	1,442.5	1,588.2	897.7	1,465.3	531.2	974.2

表 7 5 (5) 消化器及び腹膜の悪性新生物 (つづき)
女

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージーランド
総 数	49.0	48.2	79.5	82.2	88.5	66.7	76.1	69.6	75.3	57.1	608
0 歳	0.5	0.4	0.6	0.3	1.1	0.9	-	-	2.4	0.7	-
1 - 4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7	-	-	-	0.9	-
5 - 9	-	0.1	-	0.3	0.2	-	-	-	-	0.3	-
10 - 14	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	-	-	-	0.2	-
15 - 19	0.3	0.2	0.3	0.2	-	0.2	-	-	-	0.3	-
20 - 24	1.8	0.7	0.9	0.7	0.7	-	0.7	0.9	-	1.1	-
25 - 29	4.4	1.6	2.5	1.1	1.5	0.5	2.7	3.0	2.1	2.0	-
30 - 34	11.6	3.2	4.7	2.7	4.3	3.1	3.8	4.1	3.7	4.2	4.2
35 - 39	24.5	8.6	8.6	6.6	9.9	7.0	11.1	12.2	8.6	9.2	8.8
40 - 44	45.1	15.2	19.2	14.4	19.4	17.3	20.4	14.1	17.7	17.7	35.9
45 - 49	67.2	28.1	32.3	29.9	34.7	27.9	25.6	32.2	29.9	32.0	41.8
50 - 54	106.9	49.5	64.0	51.8	65.7	62.7	45.7	53.7	50.0	62.8	73.6
55 - 59	164.0	85.9	96.2	93.6	117.6	101.6	96.4	92.1	99.1	107.3	73.0
60 - 64	241.1	132.6	155.8	150.3	208.0	175.5	164.6	133.6	173.8	176.7	118.9
65 - 69	349.6	210.8	242.8	241.1	341.1	286.0	303.9	236.6	246.1	269.8	226.8
70 - 74	411.4	288.9	371.9	378.8	546.1	480.3	473.7	372.2	430.4	397.5	361.7
75 - 79	443.2	414.4	526.4	576.6	797.1	706.6	676.6	556.2	674.3	521.4	571.0
80 - 84	592.1	570.7	718.2	690.7	986.3	1,044.6	1,053.8	742.1	901.4	560.1	847.3
85以上	278.4	661.9	810.8	676.7	894.8	1,242.2	1,290.9	852.7	977.4	540.3	742.3

各年齢階級人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和34年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W. H. O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用せるもの。

表 7.5. 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(6) 呼吸器系の悪性新生物
男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイ ス	イタリヤ	ニュージ- ランド
総 数	6.7	32.5	73.5	32.5	37.2	35.9	29.3	16.2	39.2	21.4	31.6
0 歳	-	0.2	0.3	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-
1 - 4	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2	-	-	-	0.1	-
5 - 9	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	0.3	-
10 - 14	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	-
15 - 19	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	-	-	0.4	-	0.3	-
20 - 24	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	0.7	-	-	-	0.6	-
25 - 29	0.3	0.8	1.5	0.6	1.2	0.5	0.7	0.4	-	0.8	1.3
30 - 34	0.9	1.9	3.5	1.8	1.9	2.9	1.9	1.5	1.7	1.4	1.4
35 - 39	1.6	5.2	8.6	4.2	3.4	4.5	2.0	2.6	2.5	4.6	1.5
40 - 44	3.7	12.7	26.5	12.6	9.2	16.2	8.4	2.2	10.9	13.5	7.4
45 - 49	8.2	33.4	60.6	30.6	26.9	41.0	20.9	10.6	33.3	33.2	33.9
50 - 54	16.0	62.8	128.6	65.6	66.5	87.6	65.0	23.1	78.6	63.5	57.7
55 - 59	25.4	103.8	231.6	104.6	127.4	130.3	97.9	49.5	116.9	99.0	98.0
60 - 64	43.7	152.4	305.5	129.7	171.0	171.3	132.1	76.1	165.5	99.0	160.4
65 - 69	61.7	182.2	353.1	142.9	174.3	189.1	144.2	55.5	194.0	92.3	191.4
70 - 74	79.3	169.8	351.8	145.4	174.3	190.3	125.4	91.9	205.4	83.7	175.8
75 - 79	56.4	164.9	286.5	139.2	149.9	195.9	134.9	80.0	204.8	87.1	185.2
80 - 84	40.3	143.3	213.2	116.0	118.3	158.9	128.2	58.2	213.3	57.8	146.2
85 ≤	25.0	105.1	150.0	71.8	93.9	166.7	105.9	31.4	136.0	48.1	171.9

表 7 5 (6)呼吸器系の悪性新生物(つづき)

女

年齢階級	日 本	アメリ カ (白人)	イン グ ラ ン ド ・ ウ ェ ー ル ズ	ブラ ジ ル	ポ ー ツ 国	オ ラ ン ダ	デン マ ーク	ス ウェ ー デン	ス イ ス	イ タ リ ア	ニュ ー ジ ー ラ ン ド
総 数	2.9	5.7	12.1	7.0	6.9	4.2	7.6	5.8	5.4	5.4	4.7
0 歳	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2	-
1 - 4	-	0.1	-	0.1	0.2	-	0.7	0.5	-	0.1	-
5 - 9	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	-	-	0.3	-	-	-
10 - 14	-	0.1	-	-	-	-	-	0.7	-	0.1	1.2
15 - 19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	0.2	-
20 - 24	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	0.3	-
25 - 29	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5	-	0.7	0.4	1.0	0.5	-
30 - 34	0.9	0.7	1.7	0.8	1.2	0.8	1.3	1.5	1.1	1.2	-
35 - 39	1.8	1.8	3.2	1.5	1.4	1.5	2.0	0.8	1.2	2.0	1.5
40 - 44	3.4	3.4	5.5	2.6	3.0	3.5	3.2	1.9	2.2	3.7	3.0
45 - 49	5.0	5.5	10.5	5.1	6.5	2.4	3.3	3.0	2.7	5.8	8.4
50 - 54	6.9	8.2	16.5	7.5	7.9	4.4	6.5	6.2	6.4	9.1	1.9
55 - 59	10.2	12.3	25.4	12.1	14.5	10.7	14.5	13.2	13.1	12.8	6.6
60 - 64	14.5	17.6	33.2	17.3	17.3	12.3	26.0	18.4	13.4	16.9	17.3
65 - 69	20.6	25.6	41.6	23.8	27.9	24.2	40.6	19.7	20.3	24.7	24.6
70 - 74	21.3	29.7	47.8	30.3	32.8	27.5	33.1	30.1	24.5	29.8	19.7
75 - 79	18.4	38.2	47.6	33.4	40.7	37.4	43.6	33.9	33.4	31.1	34.8
80 - 84	14.9	43.0	52.6	31.8	27.7	23.4	85.2	23.0	42.1	26.4	29.6
85≦	10.2	42.7	34.7	23.2	40.6	31.4	36.4	26.8	32.3	35.0	41.2

各年齢階級人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W. H. O. : Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用のもの。

表 7 5 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率（1955年）

(7) 中枢神経系の血管損傷および循環器系疾患

年齢階級	男											
	日	本	アメリカ (白人)	イギリス ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総数	2208		577.0	597.9	397.0	433.3	330.7	436.0	486.8	442.2	372.5	483.4
0 歳	85		12.3	7.0	46.6	5.7	12.7	15.1	9.1	9.1	10.1	3.9
1 - 4	5.5		2.4	1.0	5.5	2.7	1.5	0.6	0.5	1.8	4.0	3.2
5 - 9	4.5		1.8	0.9	2.3	2.0	1.5	1.4	0.9	1.9	6.8	-
10 - 14	7.5		3.1	2.8	4.8	2.8	2.3	2.0	1.4	1.0	9.4	1.2
15 - 19	11.6		5.7	16.9	7.4	6.1	2.2	1.9	7.5	7.4	12.0	8.8
20 - 24	14.4		9.4	9.4	9.6	8.1	5.7	1.4	6.0	4.1	11.4	10.8
25 - 29	18.2		17.1	12.6	13.8	13.2	8.6	13.8	8.0	7.6	16.9	10.7
30 - 34	25.2		33.4	23.0	23.5	21.5	14.7	12.2	17.4	29.9	27.1	16.3
35 - 39	44.5		79.1	49.4	41.0	36.9	17.1	28.5	27.2	37.6	45.6	45.1
40 - 44	87.5		171.0	96.3	70.9	67.8	47.3	52.5	59.8	76.6	72.2	115.6
45 - 49	175.4		337.1	196.7	142.1	140.7	113.7	151.0	128.2	145.3	146.3	214.5
50 - 54	344.4		598.4	389.4	272.7	280.9	228.9	295.1	261.9	276.8	273.9	394.9
55 - 59	613.1		975.6	694.7	488.6	545.5	396.8	528.0	539.2	492.9	504.9	809.4
60 - 64	1,090.5		1,563.7	1,251.9	839.4	966.1	728.0	861.5	918.5	941.5	904.4	1,263.4
65 - 69	1,858.8		2,478.4	2,143.3	1,424.4	1,630.2	1,359.2	1,583.1	1,623.5	1,670.4	1,550.6	2,030.9
70 - 74	2,937.8		3,706.6	3,658.7	2,469.3	2,877.6	2,543.3	2,591.5	2,785.8	2,922.5	2,872.1	3,374.5
75 - 79	3,985.5		5,895.0	6,393.8	4,066.3	4,949.2	4,310.2	4,737.9	4,817.5	5,487.9	5,120.9	5,318.3
80 - 84	4,868.7		9,331.6	10,387.3	6,140.3	7,571.1	7,300.7	7,984.6	8,072.0	9,157.5	8,203.7	7,856.3
85 =	5,830.0		14,510.2	16,094.9	9,040.1	11,134.8	13,080.5	14,411.8	13,659.8	15,649.5	14,385.0	13,209.2

表 7 5 (7) 中枢神経系の血管損傷および循環器系疾患 (つづき)

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ヨーロッパ 平均
総 数	204.5	431.0	601.4	401.0	407.7	320.2	399.9	484.4	481.3	386.9	429.4
0 - 歳	9.6	9.9	3.4	28.3	5.3	3.6	5.4	13.4	4.8	11.6	4.1
1 - 4	4.2	2.0	1.1	6.1	2.0	2.3	0.7	1.4	5.1	4.1	3.4
5 - 9	4.0	1.6	1.2	2.4	2.0	1.6	0.5	1.7	1.0	7.2	1.9
10 - 14	8.3	3.1	3.7	3.5	2.7	2.5	1.6	1.4	2.1	10.5	2.5
15 - 19	11.6	4.7	4.6	5.9	5.2	5.0	3.3	2.3	3.8	11.0	1.5
20 - 24	18.2	8.7	9.0	7.4	7.5	4.4	2.1	6.0	4.5	12.8	9.8
25 - 29	23.6	11.3	13.2	12.9	11.3	7.3	6.1	9.3	6.8	20.0	7.3
30 - 34	31.4	18.0	18.5	18.3	18.5	7.6	7.5	7.4	11.1	28.9	9.8
35 - 39	47.1	31.2	30.9	31.2	25.9	15.8	20.9	19.0	25.9	39.9	28.0
40 - 44	78.7	61.1	59.2	47.5	41.3	29.0	31.9	40.2	37.6	62.1	56.8
45 - 49	154.0	112.5	107.0	88.2	79.6	56.0	54.6	92.3	95.0	105.2	113.7
50 - 54	272.2	210.5	194.4	152.8	151.2	113.3	132.1	161.9	165.6	185.9	242.2
55 - 59	437.4	378.1	347.3	260.0	287.5	227.8	239.4	300.7	298.6	325.7	400.6
60 - 64	739.4	723.1	666.8	462.0	589.7	467.3	557.3	599.7	629.6	652.0	695.9
65 - 69	1,290.1	1,415.7	1,319.1	860.7	1,246.8	1,034.9	1,197.2	1,267.8	1,289.4	1,300.5	1,390.7
70 - 74	2,118.5	2,403.6	2,556.9	1,604.0	2,557.7	2,178.2	2,305.3	2,477.4	2,583.7	2,622.7	2,367.6
75 - 79	3,043.2	4,493.3	4,714.4	2,975.2	4,642.4	4,085.7	4,412.8	4,524.2	4,921.9	4,817.0	4,592.9
80 - 84	3,879.8	8,096.0	8,388.4	4,754.5	7,310.8	7,384.3	7,650.2	7,990.3	8,484.7	7,748.5	7,241.4
85 -	4,969.3	14,460.0	14,847.9	7,321.2	10,395.8	12,932.7	13,536.4	12,776.8	14,806.1	13,019.8	13,546.4

各年齢階級人口10万につき、0歳のみ出生10万について。
 厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。
 W. H. O. : Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用せるもの。

表75 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(B) 中枢神経系の血管損傷

男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージー ランド
総 数	143.1	102.3	145.4	136.3	160.4	92.1	113.6	123.3	120.3	126.9	92.8
0 歳	1.1	4.6	4.1	28.8	0.7	4.2	7.6	1.8	2.3	3.1	-
1 - 4	0.6	1.0	0.1	1.7	0.3	-	-	-	0.6	0.3	-
5 - 9	0.4	0.6	0.4	0.4	0.1	0.2	0.9	0.3	0.9	0.2	-
10 - 14	0.5	1.0	0.7	0.8	0.4	0.6	1.0	0.7	-	0.6	-
15 - 19	1.5	1.2	1.2	1.7	0.7	0.2	-	0.4	1.2	0.9	2.9
20 - 24	2.7	1.8	1.9	1.8	1.4	1.2	-	2.8	0.6	1.1	3.1
25 - 29	3.6	3.4	2.5	3.2	2.1	2.4	4.1	1.7	1.8	1.4	2.7
30 - 34	6.2	4.9	5.0	5.7	2.7	3.7	1.3	5.4	3.4	2.7	5.4
35 - 39	17.7	8.2	8.3	11.0	5.6	4.5	3.3	6.0	3.8	7.3	9.0
40 - 44	46.7	15.2	12.7	19.1	10.9	6.4	5.8	11.3	9.7	11.6	23.7
45 - 49	111.5	31.8	34.4	43.5	23.9	11.0	16.2	26.4	25.8	33.3	25.8
50 - 54	232.1	60.6	69.5	86.5	56.5	30.3	48.2	53.0	51.8	67.0	46.6
55 - 59	425.9	109.2	136.9	151.9	132.2	64.1	78.7	96.0	90.2	144.5	112.0
60 - 64	769.8	213.9	272.6	271.9	288.7	151.2	149.0	202.3	229.5	301.1	174.5
65 - 69	1,282.9	409.6	531.1	484.4	601.0	374.5	426.0	390.4	488.0	578.2	361.1
70 - 74	1,973.9	733.2	954.9	872.2	1,184.3	710.1	708.5	764.9	902.5	1,134.4	733.3
75 - 79	2,570.1	1,308.7	1,743.1	1,497.0	2,183.5	1,403.9	1,463.1	1,352.1	1,592.2	1,983.8	1,128.5
80 - 84	3,075.4	2,157.7	2,781.0	2,213.5	3,274.1	2,339.9	2,456.4	2,235.5	2,560.2	2,866.5	1,802.7
85≦	3,300.0	3,262.6	3,725.6	3,046.2	4,598.5	3,873.6	4,176.5	3,440.1	4,244.7	4,128.5	2,750.7

表75 (8) 中枢神経系の血損傷(つづき) 女

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ニュージー ランド
総数	129.4	106.2	186.8	151.2	173.9	110.3	130.6	155.9	148.0	123.6	134.9
0歳	1.5	3.8	1.2	14.8	0.8	1.8	-	-	-	4.5	-
1-4	0.3	0.7	0.2	1.2	0.3	0.5	0.7	-	0.6	0.1	3.4
5-9	0.3	0.5	0.2	0.3	0.6	0.3	-	0.3	-	0.2	-
10-14	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.7	-	1.1	0.5	0.1	1.2
15-19	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	1.0	1.3	0.9	-	0.7	-
20-24	2.1	2.0	2.4	1.4	1.3	0.8	-	1.4	0.6	1.1	-
25-29	3.3	2.4	3.1	1.6	1.5	0.8	1.4	0.8	1.0	1.6	2.9
30-34	6.2	4.5	4.0	3.4	2.6	0.8	1.3	1.8	1.6	1.7	1.4
35-39	14.1	7.4	8.2	6.7	4.4	3.5	4.6	5.7	4.3	5.4	14.7
40-44	35.6	15.8	18.3	14.2	9.8	7.3	7.6	14.1	7.7	9.6	25.4
45-49	93.6	28.1	35.7	30.9	23.7	15.6	11.8	34.1	25.0	27.2	51.8
50-54	186.1	54.0	73.2	63.4	53.5	39.2	47.2	72.8	58.1	60.6	98.8
55-59	303.7	84.8	127.9	111.3	109.5	78.6	57.0	113.7	96.5	110.4	139.4
60-64	514.2	160.2	233.0	186.8	240.6	158.6	191.5	215.2	214.9	233.4	245.2
65-69	889.3	328.5	447.6	334.2	539.3	364.3	391.0	423.7	413.6	469.9	420.8
70-74	1,446.4	598.1	872.6	652.6	1,160.0	774.3	798.5	815.5	863.3	925.6	759.6
75-79	1,984.4	1,158.3	1,506.5	1,153.7	2,097.1	1,451.6	1,561.9	1,476.2	1,611.9	1,630.5	1,454.8
80-84	2,433.9	2,118.1	2,445.9	1,749.4	3,153.8	2,600.8	2,502.2	2,613.5	2,500.9	2,365.7	2,059.1
85≦	2,883.0	3,470.8	3,656.9	2,484.7	4,399.0	4,197.3	3,963.6	3,174.1	3,643.0	3,319.7	3,732.0

各年齢階級人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和34年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W.H.O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用せるもの。

表 7.5. 諸外国の主要死因別，男女、年齢別死亡率（1955年）

(9) 心臓の疾患

男

年齢階級	日 本	アメリ カ (白人)	イン グ ラ ン ド ウ ェ ー ル ズ	フ ラ ン ス	ド イ ツ (西)	オ ラ ン ダ	デン マ ーク	ス ウェ ー デン	ス イ ス	イ タ リ ア	ユ ー ロ ー プ
総 数	62.2	401.5	373.3	215.1	223.2	201.8	277.6	294.1	265.2	194.0	336.7
0 歳	6.4	5.9	1.5	12.2	4.5	7.6	7.6	3.6	6.8	4.7	3.9
1 - 4	4.3	1.0	0.6	3.1	2.1	0.6	0.6	0.5	1.2	2.3	2.2
5 - 9	3.2	0.6	0.3	1.2	1.7	1.0	0.5	0.3	0.9	2.8	-
10 - 14	6.0	0.8	1.0	2.7	2.1	1.3	-	0.3	1.0	4.5	1.2
15 - 19	9.4	3.2	4.6	4.1	5.0	1.4	1.2	3.0	2.4	8.4	4.4
20 - 24	11.0	6.0	6.5	5.9	6.1	3.4	0.7	2.3	3.5	8.4	7.7
25 - 29	13.2	11.6	8.3	7.2	9.6	6.0	7.7	4.7	5.2	13.1	8.0
30 - 34	17.0	25.2	14.9	13.4	17.2	10.0	7.8	9.0	23.1	21.1	9.6
35 - 39	25.2	64.5	35.9	22.1	28.2	10.8	20.6	17.1	27.6	32.9	33.0
40 - 44	36.3	143.1	72.8	38.9	50.3	38.1	40.1	41.2	52.6	51.9	84.4
45 - 49	56.3	279.6	144.1	78.7	103.3	95.3	127.5	90.5	102.2	97.8	167.7
50 - 54	96.7	490.0	282.8	151.1	202.3	183.3	219.4	181.9	188.7	178.3	331.6
55 - 59	161.2	776.1	482.7	284.2	367.7	297.1	411.7	384.2	330.1	307.9	634.5
60 - 64	266.1	1,194.4	834.1	477.8	594.1	573.3	644.8	612.1	601.8	507.3	976.3
65 - 69	457.4	1,798.6	1,333.2	777.8	884.4	860.8	1,032.4	1,050.8	1,045	789.0	1,456.8
70 - 74	743.2	2,515.5	2,207.4	1,331.0	1,400.6	1,397.5	1,674.5	1,688.7	1,686.9	1,387.2	2,225.9
75 - 79	1,032.0	3,738.1	3,722.7	2,129.0	2,166.6	2,422.2	2,824.4	2,823.6	3,116.8	2,416.2	3,564.9
80 - 84	1,245.5	5,637.9	6,088.9	3,231.5	3,131.5	3,936.3	4,569.2	4,482.0	5,361.1	3,977.8	4,945.2
85 ≦	1,622.5	8,350.3	10,035.9	4,939.2	4,295.4	6,908.0	7,647.1	6,968.0	8,716.0	7,287.0	8,961

表 7 5 (9) 心臓の疾患(つづき) 女

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ユーゴスラ ビア
総 数	59.6	24.81	327.1	208.7	17.85	167.1	214.4	248.5	264.1	206.9	228.5
0 歳	6.1	5.2	1.5	9.2	4.2	1.8	27	13.4	4.8	5.0	4.1
1 - 4	3.6	1.0	0.4	4.2	1.4	1.6	-	1.0	2.5	2.6	-
5 - 9	3.1	0.5	0.5	1.3	1.0	0.9	-	0.7	0.5	3.9	1.0
10 - 14	6.7	0.9	1.2	2.4	2.0	0.8	1.0	-	1.0	5.7	-
15 - 19	10.0	2.4	2.3	3.5	4.0	3.5	1.3	0.5	1.9	8.2	1.5
20 - 24	15.0	4.6	4.9	3.6	5.5	2.6	2.1	2.4	2.3	9.6	4.8
25 - 29	19.0	6.7	8.0	7.2	8.2	5.7	1.4	5.5	2.6	16.2	-
30 - 34	23.4	10.5	11.8	9.3	13.7	6.2	4.4	3.3	3.7	23.8	5.6
35 - 39	31.1	18.4	18.6	15.7	17.0	9.9	13.0	8.8	16.1	30.6	10.3
40 - 44	39.3	35.9	33.9	22.0	26.1	19.0	17.2	18.2	18.3	44.7	23.9
45 - 49	53.3	67.9	58.0	42.7	44.7	33.1	33.5	45.5	45.5	67.7	45.2
50 - 54	75.9	123.4	98.0	69.8	78.1	57.9	7.25	6.99	82.5	104.0	110.5
55 - 59	114.8	232.1	174.8	118.3	142.2	121.6	147.0	141.9	153.0	176.5	190.4
60 - 64	189.7	450.5	338.3	225.1	278.0	252.2	294.5	297.4	312.1	338.2	366.5
65 - 69	320.0	865.1	673.6	439.3	558.3	553.5	655.5	661.6	711.1	667.5	743.2
70 - 74	513.0	1,411.5	1,308.6	819.1	1,096.3	1,130.7	1,231.6	1,304.8	1,402.8	1,347.9	1,243.0
75 - 79	754.7	2,541.3	2,494.2	1,536.5	1,933.2	2,088.0	2,309.6	2,343.1	2,704.1	2,511.6	2,482.6
80 - 84	991.8	4,445.3	4,718.0	2,558.9	3,034.2	3,757.9	4,067.2	4,097.7	4,728.2	4,124.5	3,960.6
85	1,332.9	7,924.4	9,084.5	4,142.5	4,031.2	6,744.4	7,218.2	6,633.9	8,772.2	7,039.7	7,773.2

169

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W.H.O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用せるもの。

表 7 5. 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(10) 心臓疾患を伴う高血圧症

男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ユーゴ ランド
総 数	2.4	36.4	26.5	5.9	10.1	7.2	14.6	18.6	14.8	18.9	26.6
0 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.1	-
15 - 19	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.6	-	-
20 - 24	-	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-	0.4	-
25 - 29	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	-	0.7	-	-	0.5	-
30 - 34	0.1	1.0	0.5	-	0.1	-	1.3	0.4	0.6	0.5	-
35 - 39	-	2.3	0.9	0.4	0.5	-	1.3	0.4	2.5	1.3	-
40 - 44	0.6	6.6	2.0	0.3	1.1	0.3	1.3	1.8	2.9	2.2	3.0
45 - 49	1.2	13.6	4.2	1.8	3.7	1.0	2.0	3.4	4.6	4.4	11.3
50 - 54	3.3	27.5	11.9	2.9	6.6	3.9	11.5	12.4	12.1	11.4	7.5
55 - 59	5.5	54.5	30.3	5.1	13.6	13.7	21.0	29.2	19.1	22.5	44.3
60 - 64	12.1	95.0	59.8	11.8	30.2	13.3	42.3	52.3	46.4	46.0	61.9
65 - 69	21.1	160.0	117.1	19.1	45.1	32.2	62.3	90.8	68.0	92.7	129.6
70 - 74	38.3	252.7	189.4	36.3	74.8	53.4	89.8	124.4	111.6	163.0	205.8
75 - 79	54.1	431.1	308.6	68.1	114.8	104.6	147.6	160.1	164.3	282.8	329.9
80 - 84	56.0	666.0	441.3	112.2	125.9	146.7	266.7	193.9	180.5	428.3	535.9
85 ≦	55.0	964.3	466.7	170.3	145.5	241.4	235.3	263.7	332.3	586.5	458.5

表 7 5 (10) 心臓疾患を伴う高血圧 (つづき) 女

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ニュージー ランド
総数	2.1	4.44	3.08	5.6	15.9	12.6	23.4	27.0	23.8	25.6	36.3
0 歳	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-	-	0.1	-
15 - 19	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.1	-
20 - 24	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.6	0.2	-
25 - 29	-	0.3	0.2	0.1	0.2	-	0.7	0.4	-	0.3	1.5
30 - 34	0.1	0.6	0.4	0.1	-	-	-	-	0.5	0.6	-
35 - 39	0.1	2.1	0.5	0.4	0.3	0.3	1.3	0.4	2.5	0.6	-
40 - 44	0.2	4.8	1.1	0.5	0.8	0.3	1.3	1.9	2.2	2.5	4.5
45 - 49	1.5	10.7	3.1	1.3	3.4	3.4	3.3	5.7	7.1	4.4	8.4
50 - 54	2.2	2.29	6.8	1.8	6.4	7.0	8.7	9.2	11.0	10.1	19.4
55 - 59	3.2	4.4.1	1.6.5	2.8	13.9	1.0.7	1.9.3	2.4.0	25.6	20.8	46.5
60 - 64	6.6	8.21	3.8.7	5.8	28.5	21.8	4.8.1	4.9.2	42.7	4.6.9	4.9.5
65 - 69	1.6.2	15.7.5	9.0.9	1.2.4	63.4	55.2	10.0.9	9.8.0	67.8	9.9.1	14.7.5
70 - 74	2.3.4	2.6.7.9	15.7.5	2.2.6	11.4.0	10.2.4	15.7.9	17.4.0	13.6.1	20.2.5	20.7.2
75 - 79	3.8.0	4.8.6.1	2.8.0.2	4.5.9	181.8	175.8	27.0.6	25.8.7	2.5.1.1	34.1.0	37.2.4
80 - 84	5.1.7	8.2.6.0	4.0.0.9	7.0.2	20.7.2	23.9.9	3.5.4.3	3.0.6.5	3.9.9.9	4.7.8.5	6.7.0.0
85 ≤	6.0.2	1.2.3.0.6	4.6.2.9	10.0.7	22.5.0	2.6.0.1	3.4.5.5	3.9.7.3	3.2.3.1	6.9.8.9	8.6.6.0

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W.H.O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用したもの。

表 75. 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)
(11) 肺炎および気管支炎

男

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イングランド ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリヤ	ニュージ ランド
総 数	45.9	288	9.7	53.6	58.3	36.2	23.7	45.3	32.9	73.2	54.3
0 歳	710.0	178.0	323.9	553.0	458.6	106.8	211.5	146.7	187.2	877.1	171.5
1 - 4	57.6	14.2	18.4	22.3	18.7	11.6	11.0	19.9	15.8	55.9	10.8
5 - 9	8.6	2.9	2.9	1.5	2.2	1.3	1.4	3.5	3.3	5.7	0.9
10 -14	3.5	1.8	1.9	0.7	1.8	0.9	0.5	3.4	1.0	3.3	-
15 -19	3.9	2.7	2.9	1.8	1.7	1.4	1.3	2.2	1.2	3.5	1.5
20 -24	4.3	2.3	2.6	1.5	2.0	0.7	-	2.8	4.1	3.9	1.5
25 -29	4.4	2.3	3.2	2.1	2.0	1.8	-	2.1	1.2	3.4	2.7
30 -34	4.5	2.6	5.1	2.4	2.4	1.5	0.6	1.8	1.7	4.6	1.4
35 -39	5.7	4.9	8.3	4.9	3.3	3.3	0.7	4.8	1.3	5.0	-
40 -44	6.3	7.8	17.7	5.5	6.2	4.6	-	4.0	6.2	8.6	3.0
45 -49	12.0	12.8	39.5	10.5	11.5	14.2	7.4	9.1	11.4	19.1	6.4
50 -54	18.0	18.3	98.2	19.5	25.0	27.4	10.7	10.7	19.1	42.2	26.1
55 -59	36.8	30.8	197.5	32.7	53.1	38.9	19.2	25.8	21.4	68.8	44.3
60 -64	76.2	48.7	343.0	60.4	85.2	75.1	23.3	51.1	36.8	109.4	95.7
65 -69	166.9	79.8	563.7	114.6	150.6	94.8	52.0	80.0	90.1	178.6	197.5
70 -74	359.2	128.2	825.7	255.3	278.8	191.1	89.8	204.9	132.6	317.5	314.3
75 -79	652.7	233.1	1,255.1	479.7	580.3	409.9	183.2	442.3	331.2	689.6	525.0
80 -84	1,032.1	452.3	1,892.6	989.1	1,126.9	709.0	389.8	880.9	760.4	1,355.1	864.8
85 ≦	1,527.5	852.5	2,979.5	1,935.6	2,107.6	1,827.6	1,211.8	1,914.7	1,601.2	2,987.5	2,492.9

表 7 5 (11) 肺炎および気管支炎(つづき) 女

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ヨーロッパ ラント
総数	40.6	21.2	8.63	53.2	43.6	27.7	22.5	45.3	28.7	63.1	34.0
0 歳	64.41	1432	239.4	293.9	3898	938	1966	111.4	156.5	805.6	1322
1 - 4	64.0	12.5	15.6	20.8	18.2	12.5	8.2	11.9	12.0	58.9	13.6
5 - 9	9.4	2.5	2.7	1.6	1.8	1.6	0.5	3.0	3.4	6.0	3.9
10 - 14	3.6	1.9	2.5	1.0	1.5	1.5	1.1	2.1	2.6	2.0	3.7
15 - 19	3.8	1.7	2.5	1.4	1.9	1.0	2.0	1.0	3.1	2.7	1.5
20 - 24	5.2	2.0	2.0	1.3	1.8	1.3	-	1.4	0.6	3.2	-
25 - 29	6.6	1.7	3.8	1.4	2.1	2.1	0.7	1.2	0.5	3.1	-
30 - 34	6.9	1.9	3.8	1.4	2.6	0.8	1.9	2.2	2.6	3.1	-
35 - 39	7.4	3.4	6.3	1.6	3.3	2.3	1.3	2.7	1.8	4.5	-
40 - 44	7.9	4.3	8.1	2.7	4.7	2.7	3.8	3.7	2.8	5.3	3.0
45 - 49	8.7	5.6	16.1	3.5	6.0	3.0	2.0	6.1	3.8	7.7	1.7
50 - 54	15.4	8.1	24.6	6.7	9.2	7.4	5.8	12.0	7.0	12.9	5.8
55 - 59	25.7	11.0	46.2	12.9	17.6	15.3	16.1	16.5	7.9	24.6	15.5
60 - 64	50.6	20.0	92.1	27.4	37.2	25.0	18.3	30.8	21.4	57.3	32.2
65 - 69	101.5	38.2	177.1	56.3	78.7	61.3	33.6	75.1	49.4	110.9	62.9
70 - 74	200.1	71.4	326.6	136.7	198.9	141.1	60.1	189.0	105.4	261.3	115.0
75 - 79	364.3	147.0	607.9	332.0	420.3	308.8	155.9	423.1	219.5	552.3	312.8
80 - 84	620.6	328.7	1,118.2	706.9	835.4	603.0	376.7	749.0	498.1	1,111.2	620.7
85 ≤	1,171.6	758.6	2,239.5	1,553.8	1,521.9	1,318.4	1,181.8	1,624.9	1,300.5	2,406.1	1,608.2

各年齢階級別人口10万につき、0歳のみ出生10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計」上巻「昭和34年3月刊による。

V. H. O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用したもの。

表 7.5. 諸外国の主要死因別、男女、年齢別死亡率(1955年)

(12) 自殺および自傷

男

年齢階級	日本	アメリカ (白人)	イングランド・ ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ニュージー ランド
総数	31.6	17.2	14.3	24.7	26.0	7.5	32.0	27.2	31.4	9.8	12.9
0 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
10 - 14	1.1	0.4	0.4	0.4	2.4	0.2	1.0	0.7	2.5	1.0	-
15 - 19	37.6	3.9	2.6	4.4	12.5	1.2	1.4	4.8	12.3	2.6	2.9
20 - 24	84.8	8.6	5.4	7.7	24.8	4.5	16.7	11.1	27.5	7.2	6.2
25 - 29	54.9	12.6	10.3	13.2	23.8	5.2	29.0	23.1	27.5	7.3	18.8
30 - 34	30.3	12.8	9.2	16.1	20.6	3.7	34.0	18.9	28.2	6.7	13.6
35 - 39	24.3	16.4	11.5	22.8	27.3	4.8	38.4	26.1	34.5	8.5	10.5
40 - 44	23.6	23.2	14.3	28.2	32.1	8.8	47.9	37.9	35.4	11.3	20.7
45 - 49	32.3	28.3	18.0	41.1	40.5	12.9	56.0	45.6	43.7	17.6	25.8
50 - 54	37.5	35.7	24.8	50.0	47.6	17.4	66.5	48.7	60.1	22.3	22.4
55 - 59	48.2	41.5	29.8	55.9	50.6	17.4	73.4	60.4	54.3	22.9	39.7
60 - 64	55.7	45.0	35.1	52.6	48.8	14.7	67.7	58.3	67.7	26.7	28.1
65 - 69	68.9	46.7	41.7	57.0	42.5	23.7	66.2	54.7	68.0	25.7	29.3
70 - 74	86.6	47.0	43.0	63.5	47.1	34.0	49.2	58.4	76.0	28.1	37.4
75 - 79	110.5	54.2	45.7	82.6	53.6	29.2	35.6	54.8	78.4	28.7	34.7
80 - 84	121.6	58.2	50.3	96.1	80.7	58.7	51.3	69.3	103.9	31.4	48.7
85 ≦	127.5	61.2	39.7	125.3	97.0	51.7	141.2	56.5	90.6	37.4	28.7

表 7 5 (1 2) 自殺および自傷 (つづき) 女

年齢階級	日 本	アメリカ (白人)	イギリス ・ウェールズ	フランス	ドイツ(西)	オランダ	デンマーク	スウェーデン	スイス	イタリア	ニュージー ランド
総 数	19.0	4.9	8.4	7.8	13.0	4.6	14.8	8.5	12.4	3.8	5.1
0 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	0.7	0.2	0.1	0.1	0.5	-	-	0.4	0.5	0.2	-
15 - 19	2.6A	1.4	0.7	2.9	7.3	1.0	4.6	0.9	3.8	3.1	1.5
20 - 24	4.72	2.6	1.9	3.6	10.1	2.1	9.8	5.1	8.9	4.8	6.5
25 - 29	28.0	3.9	4.0	3.4	9.7	1.8	10.2	8.5	8.3	2.9	5.9
30 - 34	18.0	5.8	4.9	5.1	10.6	3.1	21.3	7.0	8.4	3.5	1.4
35 - 39	15.9	5.8	6.2	5.4	12.9	4.1	15.7	11.4	9.2	3.5	1.5
40 - 44	14.8	7.4	8.6	6.4	15.9	4.7	17.8	15.3	15.5	4.6	6.0
45 - 49	16.7	9.6	13.1	11.0	20.4	7.7	30.9	9.8	27.1	4.2	5.0
50 - 54	18.6	10.9	16.6	14.2	23.5	9.0	28.3	15.4	31.4	7.0	13.6
55 - 59	22.7	10.7	17.9	14.8	23.5	12.7	28.9	18.3	24.9	7.6	15.5
60 - 64	30.9	10.1	20.2	16.1	20.7	14.1	22.1	16.8	22.1	7.7	17.3
65 - 69	40.9	10.7	21.0	18.7	23.5	16.9	23.2	14.0	13.6	7.0	21.9
70 - 74	56.9	8.3	19.0	16.7	21.6	17.1	42.1	10.9	27.0	7.1	9.9
75 - 79	65.2	8.4	13.9	19.5	20.8	11.0	18.3	13.3	21.1	7.4	5.0
80 - 84	77.3	8.6	12.8	20.3	26.1	12.7	31.4	11.5	14.0	9.8	-
85 ≧	131.8	72	72	17.9	21.9	9.0	9.1	8.9	-	9.3	-

各年齢階級別人口10万について。

厚生省大臣官房統計調査部「昭和32年人口動態統計上巻」昭和34年3月刊による。

W.H.O.: Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1955より引用したもの。

表 76. 優生保護法による年次別、男女、理由別優生手術件数
(昭和24—32年)

年次	総数	当事者の同意によるもの 1)						医師の申請によるもの		
		総数	当業者 遺伝 2)	近 遺 3)	親 伝 3)	ら い 4)	母体の生 命危険 5)	母体の健 康低下 6)	遺伝性 疾 患 7)	非遺伝 性疾 患 8)
総 数										
昭 24	5,695	5,565		174		95	5,296	130	-	
25	11,403	11,130		235		103	10,792	273	-	
26	16,233	15,753		237		107	15,409	480	-	
27	22,424	21,848		340		237	21,241	560	46	
28	32,552	31,622		344		116	31,162	832	98	
29	38,056	37,056	226	107		122	13,572	23,029	840	160
30	43,255	41,893	305	186		129	15,640	25,633	1,260	102
31	44,485	43,221	279	175		105	16,197	26,465	1,208	56
32	44,400	43,296	189	123		89	16,485	26,410	1,029	75
男										
昭 24	78	40		13		27	-	38	-	
25	130	45		8		37	-	85	-	
26	239	69		21		48	-	170	-	
27	389	149		26		45	-	235	5	
28	641	320		17		33	270	311	10	
29	957	564		30		28	506	380	13	
30	1,528	971	34	52		14	255	616	534	23
31	1,774	1,281	36	70		17	283	875	482	11
32	1,864	1,429	27	30		7	335	1,030	419	16
女										
昭 24	5,617	5,525		161		68	5,296	92	-	
25	11,273	11,085		227		66	10,792	188	-	
26	15,994	15,684		216		59	15,409	310	-	
27	22,035	21,669		314		192	21,163	325	41	
28	31,911	31,302		327		83	30,892	521	88	
29	37,099	36,492		303		94	36,095	460	147	
30	41,727	40,922	271	134		115	15,385	25,017	726	79
31	42,711	41,940	243	105		88	15,914	25,590	726	45
32	42,536	41,867	162	93		82	16,150	25,380	610	59

優生保護法において1)第3条、2)第3条第1号、3)第3条第2号、4)第3条第3号、5)第3条第4号、6)第3条第5号、7)第4条、8)第12条にそれぞれ該当するもの。
厚生省公衆衛生局精神衛生課調による。

表 77. 優生保護法による男女、年齢（5歳階級）別、理由別優生手術件数（昭和32年、31年）

年齢階級	総数	当事者の同意によるもの						医師の申請によるもの	
		総数	当事者 遺伝	近 遺	親 伝	らい疾 命危険	母体の生 命危険	母体の健 康低下	遺伝性 疾患
昭和32年									
男									
総数	1,864	1,429	27	30	7	335	1,030	419	16
20 >	55	5	4	-	-	-	1	46	4
20-24	89	26	5	1	1	11	8	62	1
25-29	317	205	3	2	1	70	129	106	6
30-34	574	496	4	11	2	122	357	78	-
35-39	452	391	6	11	1	78	295	58	3
40-44	255	221	2	2	2	40	175	32	2
45-49	85	63	3	2	2	10	47	22	-
50 ≤	35	20	-	-	-	4	16	15	-
不詳	2	2	-	-	-	-	2	-	-
女									
総数	42,536	41,867	1,622	93	82	16,150	25,380	610	59
20 >	245	137	13	2	3	45	74	95	13
20-24	1,492	1,396	24	15	6	674	677	90	6
25-29	10,832	10,678	37	32	23	4,349	6,237	140	14
30-34	17,861	17,698	54	25	25	6,645	10,949	149	14
35-39	9,980	9,868	28	16	20	3,685	6,119	102	10
40-44	1,952	1,923	5	3	5	698	1,212	28	1
45-49	127	121	1	-	-	39	81	6	-
50 ≤	6	6	-	-	-	3	3	-	-
不詳	41	40	-	-	-	12	28	-	1
昭和31年									
男									
総数	1,774	1,281	36	70	17	283	875	482	11
20 >	59	3	1	1	-	-	1	54	2
20-24	110	16	4	-	-	4	8	91	3
25-29	282	165	9	9	4	32	111	116	1
30-34	522	426	8	31	6	114	267	93	3
35-39	482	414	9	17	5	83	300	67	1
40-44	218	186	2	7	1	37	139	31	1
45-49	77	58	2	5	1	12	38	19	-
50 ≤	23	12	-	-	-	1	11	11	-
不詳	1	1	1	-	-	-	-	-	-
女									
総数	42,711	41,940	2,432	105	88	15,914	25,590	726	45
20 >	147	54	14	5	1	25	9	85	8
20-24	1,513	1,378	22	21	3	616	716	128	7
25-29	10,922	10,744	62	33	24	4,216	6,409	171	7
30-34	17,561	17,376	80	22	35	6,522	10,717	173	12
35-39	10,298	10,172	58	15	22	3,738	6,339	117	9
40-44	2,073	2,028	5	8	3	733	1,279	43	2
45-49	124	117	-	1	-	41	75	7	-
50 ≤	7	7	-	-	-	4	3	-	-
不詳	66	64	2	-	-	19	43	2	-

優生保護法において 1) 第3条、2) 第3条第1号、3) 第3条第2号、4) 第3条第3号、5) 第3条第4号、6) 第3条第5号、7) 第4条、8) 第12条にそれぞれ該当するもの。厚生省公衆衛生局精神衛生課調による。

表 7 8 年次別妊産婦死亡(明治33年-昭和32年)

年次	死亡数	死亡率	率の指数	年次	死亡数	死亡率	率の指数
明 33	6,200	39.8	154.3	昭 4	5,867	26.7	103.5
34	6,671	40.3	156.2	5	5,681	25.8	100.0
35	6,556	39.3	152.3	6	5,667	25.5	98.8
36	6,071	36.9	143.0	7	5,530	24.0	93.0
37	5,742	36.2	140.3	8	5,763	25.8	100.0
38	6,185	38.8	150.4	9	5,709	26.5	102.7
39	6,237	40.4	156.6	10	5,698	24.7	95.7
40	6,628	37.4	145.0	11	5,384	24.3	94.2
41	7,091	38.8	150.4	12	5,444	23.7	91.9
42	6,399	34.5	133.7	13	4,877	24.1	93.4
43	6,228	33.3	129.1	14	4,818	24.1	93.4
44	6,192	32.5	126.0	15	5,070	23.0	89.1
45	5,770	30.6	118.6	16	4,929	20.7	80.2
大 2	5,900	31.0	120.2	17	4,586	19.7	76.4
3	6,418	32.8	127.1	18	4,542	19.2	74.4
4	6,452	33.2	128.7	19
5	6,337	32.6	126.4	20
6	6,368	32.6	126.4	21
7	6,812	35.2	136.4	22	4,488	16.0	62.0
8	5,910	30.9	119.8	23	4,437	15.7	60.9
9	7,158	33.0	127.9	24	4,601	15.9	61.6
10	7,118	33.7	130.6	25	4,117	16.1	62.4
11	6,565	31.2	120.9	26	3,691	15.5	60.1
12	6,899	31.7	122.9	27	3,417	15.5	60.1
13	6,273	29.5	114.3	28	3,373	16.4	63.6
14	6,309	28.5	110.5	29	3,262	16.7	64.7
昭 1	5,721	25.7	99.6	30	3,095	16.0	62.0
2	5,765	26.5	102.7	31	2,838	15.4	59.7
3	5,997	26.6	103.1	32	2,677	15.4	59.7

死亡率は出産10,000について、指数は昭和5年=100.0。

厚生省児童局「昭和32年(1957)母子衛生の主なる統計」によるも、資料は、厚生省大臣官房統計調査部「人口動態統計」による。

表 7.9. 年次別、死因別妊産婦死亡(昭和15年—32年)

死 因	昭 15	昭 23	昭 24	昭 25	昭 26	昭 27	昭 28	昭 29	昭 30	昭 31	昭 32
死 亡 数											
総 数	5,070	4,437	4,601	4,117	3,691	3,417	3,373	3,262	3,095	2,838	2,677
産 褥 熱	868	616	569	351	276	220	194	188	141	127	130
流産後産褥熱	29	128	174	104	89	62	49	54	47	28	54
血栓静脈栓塞		14	5	9	6	2	5	7	3	3	5
その他	839	474	390	238	181	136	140	127	91	96	91
妊娠中毒症	1,693	1,450	1,556	1,396	1,302	1,296	1,309	1,266	1,124	1,091	1,055
子 痙	791	749	715	713	703	463	447	450
悪 阻	27	22	29	21	17	24	16	10
その他	578	531	552	575	546	637	628	595
出 血	1,402	1,704	1,127	1,147	1,024	931	896	893	831	712	671
前置胎盤	187	208	202	135	139	133	110	109	103	95
胎盤早期剝離	358	348	361	298	265	235	209	209	146	128
停滞胎盤	529	571	129	111	110	101	121	102	88	77
その他	455	480	417	427	453	411	375	371
子宮外妊娠	321	347	366	474	353	363	404	368	373	358	297
流産後死亡	186	272	278	261	180	142	138	113	121	113	99
その他	600	678	705	588	556	465	432	444	505	437	425
死 因 別 割 合 (死 亡 総 数 1 0 0 0 に つ き)											
産 褥 熱	17.1	13.9	12.4	8.5	7.5	6.4	5.8	5.8	4.6	4.5	4.9
妊娠中毒症	33.4	32.7	33.8	33.9	35.3	37.9	38.8	38.8	36.3	38.4	39.4
出 血	27.6	38.4	24.5	27.9	27.7	27.2	26.6	27.4	26.8	25.1	25.1
子宮外妊娠	6.3	7.8	8.0	11.5	9.6	10.6	12.0	11.3	12.1	12.6	11.1
流産後死亡	3.7	6.1	6.0	6.3	4.9	4.2	4.1	3.5	3.9	4.0	3.7
その他	11.8	15.3	15.3	14.3	15.1	13.6	12.8	13.6	16.3	15.4	15.9
死 因 別 死 亡 率 (出 産 1 0, 0 0 0 に つ き)											
産 褥 熱	4.1	2.3	2.1	1.5	1.3	1.1	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7
妊娠中毒症	8.0	5.4	5.8	6.0	6.1	6.5	7.0	7.2	6.5	5.9	6.1
出 血	6.6	4.0	4.2	4.9	4.8	5.6	4.8	5.0	4.8	3.9	3.8
子宮外妊娠	1.5	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.2	2.1	2.2	1.9	1.7
流産後死亡	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
その他	2.8	2.5	2.6	2.5	2.6	2.3	2.3	2.5	2.9	2.4	2.4

厚生統計協会「厚生指標、特集国民衛生の動向」の昭和34年、33年分によるも、資料は、厚生省大臣官房統計調査部「人口動態統計」によるもの。

表 8 0. 児童、生徒における知能指数の分布（昭和 2 8 年）

I. Q.	小 学 校				中 学 校				
	徳 島 群	馬 大 阪	全 国	徳 島 群	馬 大 阪	全 国	徳 島 群	馬 大 阪	全 国
総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
141以上	-	-	1.0	0.4	-	1.5	1.0	1.1	
136-140	-	-	-	-	-	-	2.0	0.9	
131-135	-	-	1.0	0.4	-	3.0	1.0	1.8	
126-130	-	1.2	2.1	1.4	-	1.5	2.0	1.5	
121-125	4.1	4.5	4.4	4.4	-	3.0	3.1	2.7	
116-120	2.5	3.7	7.5	5.4	-	-	5.0	2.2	
111-115	13.1	5.8	9.7	8.8	3.3	-	7.9	3.9	
106-110	9.1	10.2	14.4	12.1	-	1.5	10.0	5.2	
101-105	12.3	12.9	13.6	13.2	3.3	6.0	17.3	10.8	
96-100	15.4	17.2	15.1	16.0	10.1	6.1	10.6	8.6	
91-95	13.2	13.5	10.0	11.8	17.5	18.9	7.7	13.7	
86-90	8.9	9.6	10.4	9.9	29.2	18.9	13.3	17.7	
81-85	9.2	8.4	3.3	6.0	11.7	12.3	7.3	10.0	
76-80	4.6	6.7	3.1	4.5	15.6	15.1	5.8	11.0	
71-75	3.3	2.9	2.1	2.6	3.6	4.2	3.2	3.7	
66-70	2.6	1.5	1.2	1.5	2.0	3.3	1.1	2.2	
61-65	0.3	0.8	0.5	0.6	0.7	3.3	0.7	1.8	
56-60	0.6	0.4	0.4	0.5	1.0	1.0	0.4	0.7	
51-55	0.3	0.2	0.0	0.1	0.7	0.4	0.1	0.3	
46-50	0.1	0.1	0.0	0.1	1.0	-	-	0.1	
41-45	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	
36-40	0.2	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	-	
31-35	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
26-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	-	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-
16-20	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
15以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75% 以下	8.2±2.6	6.2±1.6	4.5±1.3	5.6±1.1	7.7±4.8	14.6±3.4	5.7±2.2	9.4±2.1	

昭和 2 8 年 9 月現在の全国小学校児童、中学校生徒からサンプリングにより大阪府、群馬県、徳島県の直接調査対象児 2,539 人（精神薄弱児とともに正常児を含む）を選んで調査したもの。国立精神衛生研究所「精神衛生資料第 5 号、昭和 3 2 年」に引用のもの。

表 8 1. 精神科医の診断による精神薄弱児の割合（昭和 2 8 年）（%）

診 断 別	小 学 校				中 学 校				
	徳 島 群	馬 大 阪	全 国	徳 島 群	馬 大 阪	全 国	徳 島 群	馬 大 阪	全 国
白 痴	0.02	0.05	0.05	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
痴 愚	1.0	0.5	0.2	0.6	1.4	0.2	0.2	0.5	0.5
魯 鈍	6.1	2.2	4.1	3.9	6.0	6.5	7.7	6.7	6.7
境 界 線	14.7	4.7	8.8	8.9	14.6	8.5	12.5	11.4	11.4

上表と同様調査による結果。

表 8 2. 精神衛生実態調査による精神障害者 (昭和 29 年)

(1) 男女年齢階級別有病率、全国推計数

年齢区分	有効率 (人口 1,000 につき)			全国推計数 (単位 1,000 人)		
	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数	14.8	15.3	14.4	1,302	660	642
0-9	5.7	5.8	5.5	114	59	55
10-19	15.5	16.4	14.7	282	150	132
20-29	16.3	15.5	17.9	257	121	136
30-39	21.1	21.8	20.5	22.7	106	121
40-49	19.4	22.6	16.3	176	99	77
50-59	18.1	21.2	14.9	124	73	51
60 ≦	17.2	16.2	18.0	121	51	70

厚生省：昭和 29 年精神衛生実態調査報告、昭和 34 年 3 月による。

厚生省公衆衛生局が昭和 29 年 7 月 1 日の事実について厚生行政基礎調査の標本地区より 100 地区を選び 4,895 世帯、世帯人員 23,993 人を対象として調査したもの。

(2) 男女別、年齢別有病率

診断別	男 女 別			年 齢 別		
	総 数	男	女	18歳未満	18-59歳	60歳以上
総 数	15	16	14	1.0	1.8	1.6
精神病 1)	5	5	5	1	7	10
精神薄弱 2)	7	7	7	8	6	1
その他 3)	3	4	2	1	5	5

1) 精神分裂病、躁うつ病、痙攣性疾患、梅毒性精神障害など

2) 白痴、痴愚程度 (I. Q. 50 程度以下) のもの。

3) 中毒性精神障害、その他診断の確定しないもの、上のいずれにも該当しないもの。

(3) 地域区分別、世帯業態別有病率

診断別	地域区分別 1)			世帯業態別 2)		
	総 数	農漁地区	住宅商工等地区	農業世帯	非農業世帯	日傭等世帯
総 数	15	16	13	13	10	33
精神病	5	5	5	5	3	11
精神薄弱	7	8	5	7	4	13
その他	3	3	3	1	3	9

1) 総理府統計局が国勢調査に採った 7 区分をまとめたもの、2) 厚生行政基礎調査に同じ

(4) 世帯種別、生活水準別有病率

診断別	世帯種別 1)			生活水準別 2)		
	被保護世帯	社会保険加入世帯	その他	2千円未満	2-3千円	3千円以上
総 数	76	12	15	21	15	11
精神病	32	4	6	6	6	4
精神薄弱	26	6	7	11	6	4
その他	18	3	3	3	3	3

1) 厚生行政基礎調査に同じ、2) 1) の調査の家計上の支出に同じ

(5) 自立程度別有病率、診断別割合、全国推計表

自立程度	有病率	診断別割合 (%)				全国推計数
		総 数	精神病	精神薄弱	その他	
総 数	15.9%	100	100	100	100	127万
常に周囲から監護されている	3	21	3.6	19	1	27
一応身の廻りのことはできるが就業はできない	6	41	3.4	5.0	3.1	52
その他	6	38	3.0	3.1	6.8	48

現在精神病院または精神病室に入院しているものを除き、在宅のもの。

表 8.3. 在院精神障害者実態調査による在院、退院精神障害者
(昭和31年)

(1) 在院、退院精神障害者の男女、年齢別割合と人口に対する率

年齢区分	年齢別割合(男女各総数=100.0)						在院精神障害者の人口10万に対する率	
	在院精神障害者			退院精神障害者			男	女
	総数	男	女	総数	男	女		
総数	9,066 100.0	5,565 100.0	3,501 100.0	4,651 100.0	2,809 100.0	1,842 100.0	127	7.7
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
10-14	0.8	0.6	1.1	1.1	1.2	0.9	0.7	0.8
15-19	5.4	5.0	6.1	9.7	8.4	11.7	6.4	5.0
20-24	14.1	14.6	13.3	17.8	18.0	17.5	19.6	11.2
25-29	19.7	21.9	16.1	18.8	20.3	16.5	32.4	14.8
30-34	16.5	16.9	15.9	12.7	12.9	12.4	33.5	16.7
35-39	11.8	11.2	12.8	9.1	8.9	9.3	26.6	15.9
40-44	9.9	9.2	10.9	7.7	7.2	8.4	22.1	14.6
45-49	7.6	7.4	7.9	7.2	7.3	7.1	19.4	12.5
50-54	5.5	5.4	5.8	5.7	5.8	5.5	15.4	10.6
55-59	3.7	3.6	3.8	4.3	4.6	3.8	12.4	8.4
60-64	2.2	2.1	2.4	2.6	2.1	3.4	9.5	6.6
65-69	1.3	1.0	1.6	1.5	1.4	1.7	6.3	5.5
70以上	1.4	1.0	2.1	1.6	1.5	1.7	5.2	4.4
不詳	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-

(2) 在院、退院精神障害者の診断別年齢別割合

診断名	総数	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60以上
在院精神障害者							
× 総数	100.0	6.3	33.8	28.3	17.5	9.2	4.9
× 精神分裂病	100.0	5.8	39.0	32.0	15.0	6.3	1.8
× 躁うつ病	100.0	8.7	24.7	18.5	19.9	14.6	13.7
× てんかん	100.0	20.2	40.1	25.6	10.4	3.2	0.6
× 梅毒性精神障害	100.0	1.1	4.1	17.2	42.1	26.2	9.2
× 中毒性精神障害	100.0	1.0	25.4	24.4	22.5	20.6	6.2
× その他の精神病	100.0	2.4	5.0	4.8	13.5	24.9	49.3
× 精神病質	100.0	7.1	40.9	25.2	15.7	8.7	2.3
× 精神経症	100.0	6.6	32.4	31.3	19.7	7.7	3.3
× 精神薄弱	100.0	19.0	42.9	22.3	11.4	2.6	0.4
× その他	100.0	11.6	23.3	32.6	25.6	2.3	4.7
退院精神障害者							
× 総数	100.0	10.9	36.6	21.8	14.9	10.0	5.8
× 精神分裂病	100.0	13.1	46.3	23.8	10.9	4.8	1.1
× 躁うつ病	100.0	12.5	30.1	17.2	18.7	15.5	5.9
× てんかん	100.0	20.9	41.0	25.4	7.5	3.7	1.5
× 梅毒性精神障害	100.0	1.8	4.7	17.8	36.4	29.8	9.1
× 中毒性精神障害	100.0	1.0	32.4	24.1	24.8	14.5	2.4
× その他の精神病	100.0	1.5	3.2	5.0	16.5	27.7	46.0
× 精神病質	100.0	9.7	45.8	25.0	13.9	2.8	2.8
× 精神経症	100.0	10.3	34.8	26.5	15.6	8.7	4.0
× 精神薄弱	100.0	24.4	51.2	18.6	3.5	2.3	-
× その他	100.0	20.5	28.2	28.2	15.4	7.7	-

× 年齢不詳を含む。

表 8.3. 在院精神障害者実態調査による在院、退院精神障害者(昭和31年)

(1) 在院、退院精神障害者の年齢階級別の診断別割合

診断名	総数	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 ≤
在院精神障害者							
総数	100.0	10.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
精神分裂病	70.0	64.0	80.8	79.1	60.2	48.0	26.3
躁うつ病	3.7	5.1	2.7	2.4	4.2	5.9	10.3
てんかん	3.8	11.8	4.5	3.5	2.3	1.3	0.4
梅毒性精神障害	8.3	1.4	1.0	5.0	20.0	23.6	15.5
中毒性精神障害	2.3	0.4	1.7	2.0	3.0	5.2	2.9
その他の精神病	4.2	1.6	1.0	0.7	3.2	11.3	41.8
精神病質	1.4	1.6	1.7	1.2	1.3	1.3	0.7
神経症	2.9	3.0	2.7	3.2	3.2	2.4	1.3
精神薄弱	3.0	9.1	3.8	2.4	2.0	0.8	0.2
その他	0.5	1.0	0.3	0.5	0.7	0.1	0.4
退院精神障害者							
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
精神分裂病	51.5	61.9	65.1	56.3	37.8	24.5	9.7
躁うつ病	10.1	11.7	8.3	8.0	12.7	15.7	10.4
てんかん	2.9	5.5	3.2	3.4	1.4	1.1	0.7
梅毒性精神障害	5.9	1.0	0.8	4.8	14.4	17.6	9.3
中毒性精神障害	6.2	0.6	5.5	6.9	10.4	9.0	2.6
その他の精神病	7.3	0.8	0.6	1.7	8.1	20.2	58.2
精神病質	1.5	1.4	1.9	1.8	1.4	0.4	0.7
神経症	11.8	11.3	11.3	14.4	12.4	10.3	8.2
精神薄弱	1.8	4.2	2.6	1.6	0.4	0.4	-
その他	0.8	1.6	0.6	1.1	0.9	0.6	-

(2) 在院精神障害者の男女、配偶関係別割合

診断名	男					女				
	未婚	有配偶	死別	離別	不詳	未婚	有配偶	死別	離別	不詳
総数	58.1	28.2	2.6	6.5	4.5	42.3	24.3	11.0	14.6	7.8
精神分裂病	69.1	18.4	1.3	6.5	4.7	45.0	22.8	8.3	16.5	7.4
躁うつ病	30.3	57.4	5.3	4.3	2.7	37.8	34.5	16.9	7.4	3.4
てんかん	77.1	16.2	1.6	3.2	2.0	77.7	1.1	7.4	8.5	5.3
梅毒性精神障害	9.6	71.8	4.8	8.6	5.2	7.1	42.4	23.5	16.5	10.6
中毒性精神障害	26.9	53.3	7.1	7.6	5.1	25.0	16.7	8.3	41.7	8.3
その他の精神病	14.4	54.9	14.9	7.7	6.2	8.8	29.1	40.7	4.9	16.5
精神病質	57.4	25.0	1.9	13.0	2.8	68.4	15.8	0.0	15.8	0.0
神経症	40.2	50.0	4.1	4.1	1.6	30.7	48.9	11.7	5.8	2.9
精神薄弱	91.4	3.1	0.0	0.6	4.9	75.5	1.8	3.6	5.5	13.6
その他	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	43.5	26.1	13.0	8.7	8.7

各診断別精神障害者100.0につき

厚生省：昭和31年在院精神障害者実態調査報告、昭和35年2月による。厚生省公衆衛生局が精神病院およびその他の病院等に併設された精神病室から約1/5の抽出率で層別無作為に抽出し、昭和31年7月15日現在その施設に入院しているすべての精神障害者、および昭和31年1月1日から6月30日までの間にその施設から退院した精神障害者について調査したもの。

表 8.4. 年次別刑法犯発生、検挙数および青少年犯罪者の
検挙数（昭和 8 年 - 33 年）

年次	全 刑 法 犯				青少年犯罪者検挙件数				
	発生件数	検挙件数	検挙人員	検挙率	総 数	少 年			青 年
						総 数	14年以上 18年未満	18年以上 20年未満	
昭 8	1552039	1502661	-	97%	-	-	-	-	-
9	1566435	1531540	-	98	-	-	-	-	-
10	1528188	1464989	-	96	-	-	-	-	-
11	1306902	1212652	-	93	-	-	-	-	-
12	1221697	1094869	-	90	-	-	-	-	-
13	1243636	1122755	-	90	-	-	-	-	-
14	1027845	893001	-	87	-	-	-	-	-
15	1026955	862260	-	84	-	-	-	-	-
16	922526	771653	334417	84	-	42601	22731	19870	-
17	890331	691314	299395	78	-	55905	30256	25649	-
18	979336	786069	346709	80	87851	51543	28116	23427	36308
19	905836	709996	310951	78	100861	63358	36730	26628	37503
20	711596	472653	242645	66	72629	45778	30246	15532	27148
21	1387080	803264	445484	58	191835	99389	47479	51910	92446
22	1386020	697585	459339	50	193269	92551	45831	46720	100718
23	1603265	811907	550540	51	255345	113763	52453	61310	141582
24	1603048	925996	585328	58	249109	113531	60405	53126	135578
25	1469662	999709	616723	68	261928	128809	73075	55734	133119
26	1399184	974330	619035	70	270408	133656	75626	58030	136752
27	1395197	949734	575852	68	245372	114381	64976	49405	130991
28	1344482	954261	547550	71	230734	98604	54321	44283	132130
29	1360405	952797	539789	70	229571	94342	50467	43875	135229
30	1478202	1011086	558867	68	240589	96956	50490	46466	143633
31	1410441	898852	527950	64	245971	100758	52457	48301	145213
32	1426029	909603	544557	64	262509	114302	64532	49770	148207
33	1440259	904966	545272	63	270649	124379	73374	51005	146270

警察庁刑事局「犯罪統計書昭和 33 年」昭和 34 年 8 月刊による。

昭和 31 年以降は、解決事件の制限により 14 歳未満者のみによる触法行為数等が計上されていないので、昭和 30 年以前の数値とは条件を異にしている。

本資料に引用載録せる調査・統計報告書一覽

調査および統計の名称	調査時期(毎年)	結果掲載の主要刊行物の名称	左記刊行物中の本資料引用分	調査・発表の主管部局および団体の名称	本資料収録表番号
国民栄養調査	5, 8, 11 および翌年 2月	国民栄養の現状	昭和30年度~33 年度分	厚生省公衆衛 生局栄養課	1~9 17~24、 26~28
学校衛生統計	4月中	学校衛生統計報告書	昭和32年度および 33年度分	文部省調査局 統計課	10~16 32~36
-----	-----	社会保障資料第13, 児童の生計費に関する研究 【昭27.1刊】	-----	厚生大臣官房 総務課	25
学校基本調査	5月1日	学校基本調査報告書	昭和25年度~33 年度分	文部省調査局 統計課	29~31
厚生行政基礎 調査	4月15日	厚生行政基礎調査報告	昭和28年~33年分	厚生省大臣官 房統計調査部	37 42~46
国勢調査	10月1日	昭和22年臨時国勢調 査報告	(其の5)盲、おし及 びつんぼの数	総理庁統計局	38
伝染病簡速統 計	年間	伝染病簡速統計月報【 廃刊】 衛生統計月報 衛生年報	----- 特別号、第11巻、第 13号【昭34.6刊】 昭和32年分	厚生省大臣官 房統計調査部	39~41
人口動態調査	年間	人口動態統計毎月概数 人口動態統計【年報】 昭和29~昭和31年職業別・産業別死亡統計 人口動態統計特殊報告【昭34.3刊】 母子衛生の主なる統計 厚生省の指標・持康国民衛 生の動向	昭和33年年計分 昭和30年および32年分 昭和32年分 昭和33年および34 年分	厚生省大臣官 房統計調査部 【厚生省児童 局の刊行】 【財団法人厚 生協会の 刊行】	39~41 62 64~73 78, 79
国民健康調査	10月1日 および11月 中	国民健康調査	昭和28年11月~ 33年10月分	厚生省大臣官 房統計調査部	47~53
結核実態調査	-----	昭和28年結核実態調査、厚生省編【昭30.3刊】	-----	財団法人結核 予防会	54
伝染病精密調 査	年間	伝染病および食中毒精 密統計年報 衛生年報	昭和25年~32年分 昭和32年分	厚生省大臣官 房統計調査部	55
生命表	-----	第12回簡速停止人口表(生命表) 昭和33年4月1日【昭34.10刊】 (-34年3月31日) 第9回生命表【昭30.3刊】、第9回生命表(修正表)【昭31.12刊】 昭和16年1月第6回生命表【昭16.1刊】 昭和29~昭和31年職業別・産業別死亡統計 人口動態統計特殊報告	-----	厚生省人口問 題研究所 厚生省大臣官 房統計調査部 内閣統計局 厚生省大臣官 房統計調査部	56, 57 60, 61
優生保護法に よる	年間	優生手術及び人工妊娠中絶年次別実施状況【謄 写印刷、毎年7月頃刊】	-----	厚生省公衆衛 生局精神衛生 課	76, 77

【優生手術半年報】		衛生年報	昭和32年分	【厚生省大臣官房統計調査部の刊行】	
精薄児実態調査	昭和28年 9月	精神衛生資料	第5号、昭和32年分	国立精神衛生研究所(文部省の調査)	80、81
精神衛生実態調査	昭和29年 7月1日	昭和29年、精神衛生実態調査報告 【昭29.7.1刊】		厚生省公衆衛生局	82
在院精神障害者実態調査	昭和31年 7月15日	昭和31年、在院精神障害者実態調査報告 【昭31.7.15刊】		厚生省公衆衛生局	83
犯罪統計	年 間	犯罪統計書	昭和33年分	警察庁刑事局	84
国際統計	—	DEMOGRAPHIC YEARBOOK 寿命学研究会年報 ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL AND VITAL STATISTICS	1957および1958年分 第2回(1957)および 第3回(1958)分	UNITED NATIONS 寿命学研究会 W. H. O.	58、59 63 74、75